

Рожистое воспаление

Рожистое воспаление представляет собой инфекционное заболевание слизистых оболочек и кожи. Вызывает данное заболевание гемолитический стрептококк группы А, выделяющий ферменты, токсины, которые отрицательным образом воздействует на ткани человека и его органы. Предшественником этого недуга могут стать такие стрептококковые инфекции как ангина.



Рожистое воспаление это такое заболевание, которым заразиться можно при непосредственном контакте с людьми, страдающими разными формами стрептококковой инфекции.

Кроме того, заражение может произойти и от тех людей, которые являются просто носителями данной инфекции и не подозревающие о том, что у них имеется этот недуг.

Стрептококк передается от одного человека к другому воздушно-капельным, а также контактным путем, например через бытовые предметы или же руки.

На слизистые и кожу стрептококк попадает еще и при наличии инфекции, носящей хронический характер, например отит, насморк и т.п.

Что же касается проникновения инфекции, то этому способствуют такие повреждения кожи как, например трещины, ранения и даже опрелости. Провоцирующим фактором данного недуга является ослабленный иммунитет на фоне стрессовых ситуаций, переохлаждения и переутомления.



Процесс воспаления может проявляться на любом участке тела, но в большинстве случаев местом его локализации являются кожа голени и лица.

Что касается предрасполагающих факторов к возникновению рожистого воспаления лица, то ими являются хронические болезни рта, разные болезни лор-органов, а также кариес. Причинами рожистого воспаления грудной клетки, а также конечностей являются лимфопатическая недостаточность, различного рода отеки, лимфедема, микоз стоп, трофические нарушения. Восприимчивость к рожистому воспалению увеличивается во время продолжительного приема стероидов.

Если говорить о симптомах рожистого воспаления, то первыми признаками являются такие как: повышение до 40 градусов температуры тела, ломота в пояснице, мышцах, суставах, головная боль и озноб.

Тяжелая форма этого заболевания сопровождается бредом, рвотой и даже судорогами. Спустя некоторое время на определенном участке кожи появляется ощущение жжения, распирания, зуда. Данные ощущения характеризуются умеренной болезненностью, которая то ослабевает, то вовсе исчезает. В основном боль ощущается при рожистом воспалении в области лимфатических узлов и волосистой части головы.

При данном заболевании место поражения отличается от здоровой кожи красным, возвышающимся пятном, имеющим четкие границы. Это пятно относительно за короткий промежуток времени разрастается и становится на ощупь горячим и напряженным. После этого на этом участке кожи образуются кровоизлияния, пузыри, а также увеличиваются расположенные в непосредственной близости лимфатические



Рожистое воспаление характеризуется длительным периодом протекания, в течение которого возникают различные осложнения внутренних органов, например сердечные тоны, тахикардия и т.д.

Рожистое воспаление влечет за собой довольно серьезные последствия, приводящие к заражению крови, а также различных органов, тканей. Последствием этого недуга является **отечность ног**. Также могут возникать флегмоны, некрозы, абсцессы, тромбофлебиты и даже на месте пузырей — язвы.

Последствием рожистого воспаления может стать и закупорка лимфатических сосудов, а также нарушение лимфатического оттока, что в свою очередь влечет за собой такое заболевание как слоновость, иными словами прогрессирующее утолщение кожи, подкожной клетчатки.

Лечение рожистого воспаления напрямую зависит от той формы, в которой протекает заболевание, а также от степени его проявления. Лечение может осуществляться амбулаторно, но в некоторых случаях необходима госпитализация. Лечение в стационаре проводится в случае тяжелой формы болезни или же рецидивирующей.

Полный комплекс лечения рожистого воспаления составляет от одной недели до восьми. Главным средством лечения этого недуга являются антибиотики.

Помимо них применяются еще противоаллергические, противовоспалительные средства, а также препараты способствующие укреплению небольших кровеносных сосудов и, конечно же, витамины.

Кроме того больному назначается питье в большом количестве, а также лекарства, которые помогают уменьшить токсическое действие оказываемое возбудителями инфекции. В редких случаях необходимо хирургическое вмешательство, в ходе которого рассекаются пузыри, удаляется из них все содержимое. Затем накладываются стерильные повязки с антибиотиками.

После уменьшения очага воспаления больному прописываются лекарственные препараты, которые способствуют восстановлению тканей и назначаются физиотерапевтические процедуры, например электрофорез с хлористым кальцием, парафин и т.п.