## «РАССТРОЙСТВА АССОЦИАТИВНОГО ПРОЦЕССА МЫШЛЕНИЯ»

Ассистент кафедры психиатрии и наркологии Пешкова Т.Я.

AO «MYA»


## РАССТРОЙСТВА АССОЦИАТИВНОГО ПРОЦЕССА МЫШЛЕНИЯ

- Включают ряд нарушений способа мышления, выражающихся в изменении :
- 1. Темпа мышления
- 2. Стройности мышления
- 3. Целенаправленности мыслительного процесса

# РАССТРОЙСТВА АССОЦИАТИВНОГО ПРОЦЕССА МЫШЛЕНИЯ ПО ТЕМПУ:

• 1. Замедление мышления (заторможенность). Заключается в бедности ассоциаций. Такие больные самостоятельно не вступают в беседу, говорят всегда медленно, с трудом подбирают слова, долго думают перед тем, как ответить, на сложные вопросы могут не ответить. Ответы на вопрос односложные. Затруднен процесс формирования умозаключений, часто не могут решить логические задачи и производят впечатление человека с пониженным интеллектом. Наблюдается как временное явление при депрессивных состояниях, при легком расстройстве сознания (оглушении).

## ЗАМЕДЛЕНИЕ МЫШЛЕНИЯ



# РАССТРОЙСТВА АССОЦИАТИВНОГО ПРОЦЕССА МЫШЛЕНИЯ ПО ТЕМПУ:

- Ускорение мышления (возбужденность).
- Характеризуется ускорением течения мысли вплоть до скачки идей. В определенный промежуток возникает очень много идей, которые отличаются большой поверхностностью. Мышление при этом не лишено цели, но цель эта постоянно меняется. Важным признаком является отвлекаемость, вследствие чего внешние ассоциации значительно преобладают над внутренними. Речь приобретает непоследовательный, скачущий характер. Отмечается речевой напор, больные стремятся поскорее высказаться, не слушают ответов на задаваемые им же вопросы. Встречается при маниакальном синдроме, при приеме психостимуляторов.

## УСКОРЕНИЕ МЫШЛЕНИЯ




# РАССТРОЙСТВО АССОЦИАТИВНОГО ПРОЦЕССА МЫШЛЕНИЯ ПО СТРОЙНОСТИ

- 1. Разорванность
- 2. Бессвязность
- 3. Паралогичность
- 4. Вербигерация
- 5. Ментизм
- 6. Шперрунг (барраж, закупорка мыслей)

## РАЗОРВАННОСТЬ МЫШЛЕНИЯ

• Разорванность мышления характеризуется отсутствием в речи больного логических связей между словами; речь становится лишенной всякого смысла; грамматические связи в предложениях при этом могут быть сохранены. Если нарушается и логическая, и грамматическая связь, говорят о бессвязности мышления.

## РАЗОРВАНОСТЬ МЫШЛЕНИЯ



## БЕССВЯЗНОСТЬ МЫШЛЕНИЯ

• Бессвязность (инкогерентность)расстройство, проявляющееся полным
распадом в речи, когда исчезает не только
смысл, но и грамматическая конструкция фраз.
Встречается при аменции, шизофрении,
болезни Альцгеймера, а также причиной может
быть при острейшем маниакальном синдроме
(скачке идей)


## БЕССВЯЗНОСТЬ МЫШЛЕНИЯ



#### ПАРАЛОГИЧНОСТЬ МЫШЛЕНИЯ

Паралогическое мышление, игнорирующее фактические предпосылки и доказательства и приводящие к заключениям и выводам, лишенным логического обоснования, наблюдается при шизофрении, паранойе, и отчасти при психопатиях. Больные путем сложных рассуждений приходят к выводам, явно противоречащим действительности.

## ПАРАЛОГИЧНОЕ МЫШЛЕНИЕ



## ВЕРБИГЕРАЦИЯ

• Больные стереотипно, ритмически, иногда в рифму повторяют отдельные слова, поройбессмысленные сочетания звуков. Часто сопровождается ритмическими движениями: пациенты раскачиваются, вертят головой, размахивают руками и подкрепляют это бессмысленными словами. Чаще всего являются компонентом кататонического и гебефренического синдромов, характерных для шизофрении.

## ВЕРБИГЕРАЦИЯ



## МЕНТИЗМ (НАПЛЫВ МЫСЛЕЙ)

• Выражается тягостным для пациентов состоянием хаотичного потока проносящихся в голове мыслей, обычно возникающим в виде приступа. В этот момент больной не способен продолжать обычную работу, отвлекается от беседы. Болезненные мысли не представляют собой какого-либо логического ряда, поэтому человек не может связно их изложить, жалуется , что « мысли идут параллельными рядами», «скачут», «пересекаются», « цепляются одна за другую», «путаются» и пр.

## ШПЕРРУНГ

Вызывает ощущение, что «мысли улетели из головы», «голова пустая, думал-думал – и вдруг как будто в стену уткнулся».
 Насильственный характер этих симптомов может заронить в больном подозрение, ч то кто – то специально управляет его мышлением, мешает ему думать.


# РАССТРОЙСТВА АССОЦИАТИВНОГО ПРОЦЕССА МЫШЛЕНИЯ ПО ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОСТИ

- 1. Патологическая обстоятельность
- 2. Резонерство
- 3. Персеверации
- 4. Аутистическое мышление
- 5. Символическое мышление

#### ОБСТОЯТЕЛЬНОСТЬ МЫШЛЕНИЯ

• Обстоятельное мышление заключается в чрезвычайной вязкости, тугоподвижности мыслительных процессов, больному трудно переключаться с одной темы на другую, он не может выделить главного, основного, застревает на незначительных деталях, мелочах. Наиболее часто этот симптом встречается при эпилепсии.


### ОБСТОЯТЕЛЬНОСТЬ МЫШЛЕНИЯ



## РЕЗОНЕРСТВО (БЕСПЛОДНОЕ МУДРСТВОВАНИЕ)

• Мышление становится нецеленаправленным. Больной говорит много, склонен к рассуждательству. Его речь изобилует сложными логическими построениями, вычурными абстрактными понятиями, терминами, нередко употребляемые без понимания и истинного значения. Мышление аморфное, лишенное четкого содержания. Любой вопрос рассматривается с философских позиций, больные выражаются витиевато, пользуются терминами абстрактных наук.

## PE30HEPCTB0



## ПЕРСЕВЕРАЦИИ

• Персеверации выражаются в возвращении к мысли, которая уже была высказана раньше. Полагают, это связано с тем, что больные не могут осмыслить очередной вопрос и, не отвечая на него, повторяют предшествующий ответ. Связано с застоем ассоциативной деятельности. Несмотря на стремление врача переключить внимание пациента, это не удается. Встречается при органических заболеваниях, приводящих к снижению интеллекта (атеросклеротическая деменция, атрофические заболевания головного мозга).

## ПЕРСЕВЕРАЦИИ



## АУТИСТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

• Выражается в чрезвычайной замкнутости, погруженности в мир своих собственных фантазий, отрыве от реальности. Больные не интересуются практической значимостью своих идей, могут обдумывать мысль, противоречащую действительности, делать из нее выводы, такие же бессмысленные, как и исходная посыла. Больных не интересует мнение окружающих, они малоразговорчивы, скрытны, зато с удовольствием излагают мысли на бумаге, исписывая толстые тетради.

## АУТИСТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ



## СИМВОЛИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

• Характеризуется тем, что больные употребляют для выражения мыслей собственные, непонятные окружающим символы. Это могут быть хорошо известные слова, которые используются в необычном значении, из-за чего смысл сказанного становится непонятным. Нередко пациенты придумывают собственные слова (неологизмы).Понимание сказанного особенно затруднено из-за того, что смысл символических понятий может неоднократно меняться или повторяться в разных словах.

## СИМВОЛИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

