



ГЕПАТИТ

Презентацию подготовила:
Ларионова Елена

Гепатит – это вирусное инфекционное воспалительное заболевание печени. Вероятность выздоровления пациента зависит от формы и вида заболевания.



Признаки и симптомы



- **слабость и утомляемость**
- **потеря аппетита**
- **тошнота**
- **тяжесть или дискомфорт в животе (справа, где расположена печень)**
- **потемнение мочи**
- **изменение цвета кала (становится светлым)**
- **желтуха**

Формы гепатита

- Гепатит А
- Гепатит В
- Гепатит С
- Гепатит D
- Гепатит Е
- Гепатит G





Вирус гепатита А передается фекально-орально - водным и пищевым путем. Вирус попадает в организм человека с загрязненными продуктами питания, водой, предметами обихода.




Гепатит В провоцирует как острые, так и хронические формы гепатита.



Источниками инфекции служат больные с острыми и хроническими формами гепатита, а так же вирусоносители. Передача вируса осуществляется через кровь, естественными и искусственными путями.



Гепатит С передается при контакте с кровью. Гепатит С может приводить к развитию хронического гепатита, завершающегося циррозом печени и раком печени.




Источником вируса D служит больной человек или вирусоноситель. Заражение вирусом D происходит при попадании вируса непосредственно в кровь. Пути передачи схожи с таковыми при гепатитах В или С.



Гепатит Е провоцирует симптомы схожие с симптомами гепатита А, хотя иногда может принимать фульминантное развитие, в особенности у беременных женщин. Пути передачи те что и при гепатите А (то есть с загрязнёнными продуктами питания и водой).



Гепатит G был идентифицирован недавно. Возможны пути передачи с кровью и через половой контакт. Его первичное размножение в печени на данный момент не доказано.



Пути заражения

- Переливание донорской крови.
- Использование одной иглы разными людьми во много раз увеличивает риск заражения гепатитами В, С, D, G.
- Вирусы В, С, D, G могут передаваться при половом контакте.
- От матери к ребенку
- Вирусы гепатитов В, С D, G передаются при нанесении татуировки, иглоукалывании, прокалывании ушей нестерильными иглами.