СГБОУ ПО «СМК имени Жени Дерюгиной»

Понятие предела функции в точке. Теоремы о пределах

Преподаватель математики
С. А. Осетрова

http://aida.ucoz.ru

Предел функции

Предел *– одно из основных понятий математического анализа.* Понятие предела использовалось еще Ньютоном во второй половине XVII века и математиками XVIII века, такими как Эйлер и Лагранж, однако они понимали предел интуитивно. Первые строгие определения предела дали Больцано в 1816 году и Коши в 1821 году.

Ньютон

Эйлер


Лагранж

Больцано

Коши

РАЗЛИЧАЮТ – предел функции в точке И предел функции на бесконечности.

http://aida.ucoz.ru

Рассмотрим функции, графики которых изображены на следующих рисунках:







Во всех трех случаях изображена одна и та же кривая, но все же изображают они три разные функции, отличающиеся друг от друга своим поведением в точке $x = a$.

Рассмотрим каждый из этих графиков подробнее:



Для функции $y = f(x)$, график которой изображен на этом рисунке, значение $f(a)$ не существует, функция в указанной точке не определена.



Для функции $y = f(x)$ **график которой изображен на этом рисунке, значение** $f(a)$ **существует, но оно отличное от, казалось бы, естественного значения** b,

точка $(a,\ b)$ как бы **выколота.**



Для функции $y = f(x)$, **график которой изображен на этом рисунке, значение** $f(a)$ **существует и оно вполне естественное.**

Для всех трех случаев используется одна и та же запись:

$$\lim_{x \to a} f(x) = b,$$

которую читают: «предел функции $y = f(x)$ при стремлении x к a равен b ».

Опр. Число b называется пределом функции в точке a, если для всех значений x, достаточно близких к a и отличных от a, значение функции f (x) сколь угодно мало отличается от b .

ТЕОРЕМА 1.

Предел **СУММЫ** (разности) 2-х функций равен **СУММЕ** (разности) их пределов, если последние существуют

$$\lim_{x \to x_0} (f(x) \pm g(x)) = \lim_{x \to x_0} f(x) \pm \lim_{x \to x_0} g(x)$$

http://aida.ucoz.ru

ТЕОРЕМА 2.

Предел константы равен самой этой константе.

$$\lim_{x \to x_0} C = C$$

http://aida.ucoz.ru

ТЕОРЕМА 3.

Предел ПРОИЗВЕДЕНИЯ 2-х функций равен ПРОИЗВЕДЕНИЮ их пределов, если последние существуют

$$\lim_{x \to x_0} (f(x) * g(x)) = \lim_{x \to x_0} f(x) * \lim_{x \to x_0} g(x)$$

http://aida.ucoz.ru

ТЕОРЕМА 4.

Предел ОТНОШЕНИЯ 2-х функций равен ОТНОШЕНИЮ их пределов, если последние существуют и ПРЕДЕЛ ЗНАМЕНАТЕЛЯ ОТЛИЧЕН ОТ 0:



$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim\limits_{x \to x_0} f(x)}{\lim\limits_{x \to x_0} g(x)}, \text{если } \lim_{x \to x_0} g(x) \neq 0$$

http://aida.ucoz.ru

ТЕОРЕМА 5.

Постоянный множитель можно выносить за знак предела

$$\lim_{x \to x_0}(k * f(x)) = k * \lim_{x \to x_0} f(x)$$

http://aida.ucoz.ru

ТЕОРЕМА 6.

Предел СТЕПЕНИ переменного равен той же степени предела основания:

$$\lim_{x \to a}(z^n) = \left(\lim_{x \to a} z\right)^n$$

http://aida.ucoz.ru

Вычисление пределов

Вычисление предела: $\lim_{x \to x_0} f(x) = A$

начинают с подстановки предельного значения x_0 в функцию $f(x)$.

Если при этом получается конечное число, то предел равен этому числу.

$$\lim_{x \to 1} \frac{3x - 1}{x^2} = \frac{3*1 - 1}{1^2} = 2$$

Если при подстановки предельного значения x_0 в функцию $f(x)$ получаются выражения вида:

то предел будет равен:

$$\frac{C}{0} = \infty \qquad \frac{C}{\infty} = 0$$

http://aida.ucoz.ru

Вычислите: $\lim\limits_{x \to 1} (x^3 - 2x^2 + 5x + 3)$. 7

а) $\lim\limits_{x \to 1} (x^2 - 3x + 5)$; 3

б) $\lim\limits_{x \to \frac{1}{2}} \dfrac{2x + 3}{4x + 2}$; 1

Домой (4 примера):

а) $\lim\limits_{x \to 5} \sqrt{x + 4}$;

б) $\lim\limits_{x \to 1} \dfrac{3 + 4x}{2x^2 + 6x - 3}$;

а) $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{x^2}{x^2 - x}$;

в) $\lim\limits_{x \to -1} (x^2 + 6x - 8)$; 3

г) $\lim\limits_{x \to -\frac{1}{3}} \dfrac{7x - 14}{21x + 2}$. 1,4

в) $\lim\limits_{x \to 6} \sqrt{x + 3}$;

г) $\lim\limits_{x \to -1} \dfrac{5 - 2x}{3x^2 - 2x + 4}$.

http://aida.ucoz.ru

Часто при подстановке предельного значения x_0 в функцию $f(x)$ получаются выражения следующих видов:

$$\frac{0}{0};\ \frac{\infty}{\infty};$$

Эти выражения называются ***неопределенности***, а вычисление пределов в этом случае называется ***раскрытие неопределенности***.

http://aida.ucoz.ru

Правило № 1

- В большинстве случаев, чтобы раскрыть неопределенность вида $\frac{0}{0}$, достаточно

  числитель и знаменатель дроби разложить на множители, и затем сократить на множитель, приводящий к неопределенности.

http://aida.ucoz.ru

Пример №1:

$$\lim_{x\to 0}\frac{3x^2-2x}{2x^2-5x}=\frac{0}{0}$$

Разложим числитель и знаменатель на множители:

$$\lim_{x\to 0}\frac{x(3x-2)}{x(2x-5)}=\lim_{x\to 0}\frac{3x-2}{2x-5}=\frac{2}{5}$$

http://aida.ucoz.ru

Вернемся к примеру

а) $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{x^2}{x^2 - x}$; **0**

б) $\lim\limits_{x \to -2} \dfrac{x^2 - 4}{2 + x}$; **-4**

$\lim\limits_{x \to -3} \dfrac{x^2 - 9}{4x + 12}$. **-1,5**

Домой (№5,6,7):

в) $\lim\limits_{x \to 5} \dfrac{x^2 - 25}{x - 5}$;

г) $\lim\limits_{x \to -3} \dfrac{3 + x}{x^2 - 9}$.

$$\lim_{x \to 0} \frac{4x}{3x^2 + 2x}$$

http://aida.ucoz.ru

Раскрытие неопределенностей

$$\lim_{x\to 2}\frac{x^2+14x-32}{x^2-6x+8}=\lim_{x\to 2}\frac{(x-2)(x+16)}{(x-2)(x-4)}=\lim_{x\to 2}\frac{x+16}{x-4}=\frac{18}{-2}=-9$$

Если f(x) – дробно – рациональная функция, необходимо разложить на множители числитель и

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{x+1}-1}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\left(\sqrt{x+1}-1\right)\left(\sqrt{x+1}+1\right)}{x\left(\sqrt{x+1}+1\right)}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x+1-1}{x\left(\sqrt{x+1}+1\right)}=$$

Если f(x) – иррациональная дробь, необходимо умножить числитель и знаменатель дроби на выражение, сопряженное числителю.

Упражнения (13 примеров):

$$\lim_{x\to -1}\frac{x^3+1}{x^2+1}$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{x^3-3x+1}{x-4}+1$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{2x^3-2x^2}{5x^3-4x^2}$$

$$\lim_{x\to 5}\frac{x^2-5x+10}{x^2-25}$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{4x^3-3x^2}{2x^2+5}$$

$$\lim_{x\to 3}\frac{x-3}{x^2-9}$$

$$\lim_{x\to 6}\frac{6-x}{3-\sqrt{x+3}}$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-x^2}{1+2x^2}$$

$$\lim_{x\to 4}\frac{\left(\sqrt{x}+1\right)}{\sqrt{x}-1}$$

$$\lim_{x\to 5}\frac{x^2-6x+5}{x^2-25}$$

$$\lim_{x\to -3}\frac{2x^2+x-15}{3x^2+5x-12}$$

$$\lim_{x\to 2}\left(2x^2-3x+4\right)$$

$$\lim_{x\to 1}\left[(7x+2)(4x-3)(5x+1)\right]$$

http://aida.ucoz.ru

Домашнее задание (№8-11):

1) $\lim\limits_{x \to 2} (2x^2 - 3x + 4)$;

3) $\lim\limits_{x \to 0} (3x^3 + x^2 + 8x + 10)$;

5) $\lim\limits_{x \to -1} \dfrac{(x + 3)(x - 2)}{x + 2}$;

1) $\lim\limits_{x \to 3} \dfrac{3}{2x - 6}$;

+ знать ответы на следующие вопросы:

1) **С какими математиками связано понятие «Предел»?**
2) **Как вычислить предел?**
3) **Как раскрыть неопределенность вида 0/0?**
4) **Как раскрыть неопределенность вида 0/0, если f(x) – иррациональная дробь?**
5) **Уметь формулировать теоремы.**

http://aida.ucoz.ru

Дополнительно

2) $\lim\limits_{x \to -1} (x^3 - x^2 + 1)$;

4) $\lim\limits_{x \to 2} ((x^2 - 1)(x - 3)(x - 5))$;

6) $\lim\limits_{x \to 4} \dfrac{\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x} - 1}$.

2) $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{4}{3x^2 + 2x}$;

4) $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{3x^3 + x}{x}$;

6) $\lim\limits_{x \to (-3/2)} \dfrac{4x^2 - 9}{2x + 3}$;

http://aida.ucoz.ru