


Основные формы шизофрении

Выполнил: студентка
409 группы
лечебного факультета
Вафина Залия



Шизофрения - «расщепление души»»



- полиморфное психическое расстройство или группа психических расстройств, связанное с распадом процессов мышления, воли и эмоциональных реакций.
- Эндогенное прогрессивное хроническое психическое заболевание, характеризующееся диссоциацией психических функций

Основные формы шизофрении

- Параноидная
- Простая форма
- Гебефреническая
- Кататоническая



Параноидная форма шизофрении. F20.0



Параноидная форма

- бред
- расстройства мышления;
- галлюцинации, чаще слуховые, реже — зрительные;
- нарушения волевых функций;
- страхи;
- раздражительность;
- возможны нарушения в двигательной сфере.



- навязчивые состояния;
- подозрительность;
- отрешенность;
- замкнутость;
- состояние тревоги.



Диагностика

- Бред преследования, отношения и др
- Псевдогаллюцинации, галлюцинации (слуховые: комментирующие, противоречивые, осуждающие, императивные)
- Обонятельные, вкусовые, соматические галлюцинации



Лечение Параноидной формы

- Нейролептики
- Антидепрессанты
- В- блокаторы
- Инсулинотерапия
- Карбонат лития
- Нейролептики пролонгированного действия
- Монолатеральная электросудорожная терапия





Простая форма шизофрении



Простая форма шизофрении

- **Особенности:**
- Нет положительной симптоматики (бреда и галлюцинаций)
- Форме присуще постепенное нарастание негативных симптомов и изменение тех черт личности, которые были присуще человеку ранее.



Диагностика

- постепенно нарастает негативная симптоматика, в частности беднеет мимика, речь, снижается активность;
- пропадают присущие ранее интересы, человек становится безучастным к окружающей среде;
- социальные контакты больного сужаются, он теряет цель в жизни;
- пропадает продуктивность в работе или учёбе.



Лечение простой формы

- Нейролептики
- Инсулинокоматозная терапия
- Атипичные антипсихотики



Гебефреническая форма F20.1



Гебефреническая форма



- Возникает в подростковом возрасте
- Начало острое, течение острое
- Повышенная возбудимость, активность и излишнее чувство юмора, гремасничество

Гебефреническая форма

- дезорганизация мышления, речи поведения.
Проявляется в виде дурашливости, манерности, назойливости, бессмысленности рифмы и речи в целом);
- инфантилизм;
- повышенное сексуальное влечение;
- быстрая смена настроения;
- усиленный аппетит.



Диагностика

- Двигательно-волевые изменения в виде гримасничанья, дурашливости, регресса инстинктов, немотивированной эйфории, бесцельности и нецеленаправленности.
- Эмоциональная неадекватность.
- Формальные паралогические расстройства мышления - резонерство и разорванность.
- Неразвернутые бред и галлюцинации, которые не выступают на первый план и носят характер включений.

Лечение гебефренической формы



- Инсулинотерапия
- Гипервитаминовая терапия
- Транквилизаторы
- Нейролептики
- Нейролептики-пролонги

Катотоническая форма F20.2



Кататоническая форма

- двигательные изменения (ступор, кататоническое возбуждение)
- восковая гибкость (человек способен изгибаться в неестественные позы)



Диагностика



- Ступор
- Хаотические нецеленаправленные движения
- Каталепсии и негативизм
- Ригидность
- Подчиняемость
- Персеверация

Лечение кататонической формы

- Транквилизаторы
- Билатеральная электросудорожная терапия
- Нейролептики





Спасибо за внимание!