



# Опыт применения препарата Хинофуцин у женщин с цервикальной интраэпителиальной неоплазией I-II стадии в ассоциации с бактериальным вагинозом



О.А. Таран

Винницький національний медичинський  
університет ім. Н.І. Пирогова

# Актуализация проблемы

- Бактериальный вагиноз (БВ) как пограничное состояние микробиоценоза влагалища заслуживает особого внимания, поскольку это один из наиболее распространенных видов заболеваний полового тракта женщин.


# Дизайн исследования

Было обследовано 112 пациенток с верифицированной цервикальной неоплазией I и II стадий, из них отобрано 67 пациенток

1 группа – основная  
37 пациенток, которые на первом этапе проводилось местное лечение БВ препаратом **Хинофуцин**, на втором – хирургическое лечение ЦИН

2 группа – сравнения 30 пациенток, которым сразу проводилось коррекцию патологии шейки матки

# Перенесенные гинекологические заболевания




# Результаты исследования

## Диагноз БВ



# Клиническая картина БВ

## Выделения




- Обильные выделения из влагалища
- Умеренные выделения из влагалища

Полное клиническое выздоровление, которое подтверждалось результатами микроскопии мазков, было достигнуто после первого этапа лечения в основной группе **91,8%** пациенток, **у 8,2%** после завершения второго этапа лечения


При проведении контрольной кольпоскопии  
средний срок полной эпителизации составлял

**"Хинофуцин"**





# После лечения





# ВЫВОДЫ

Таким образом, при изучении структуры и характера микробной ассоциации обнаружено, что для цервикальных интраэпителиальных неоплазий (ЦИН) I и II стадий на фоне бактериального вагиноза характерно преобладание анаэробного дисбиоза со сниженным уровнем лактобацил. Что, по всей видимости, приводило к повторным рецидивам ЦИН и усилению прогрессии ЦИН I в ЦИН II, а также снижало эффективность хирургического лечения ЦИН.

**На основании проведенного исследования установлена высокая терапевтическая эффективность местного применения вагинальных свечей Хинофуцин у женщин с ЦИН I–II в ассоциации с бактериальным вагинозом, а также его хорошая переносимость, что позволяет использовать данный препарат в монотерапии на первом этапе лечения БВ.**