

8 класс

алгебра

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ДРОБИ

7. ПЕРВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О РАЦИОНАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЯХ

Вспомним!

Правила решения уравнений

$$\frac{1}{3}x + 12 = x$$

$$x + 36 = 3x$$

$$x - 3x = -36$$

$$-2x = -36$$

$$x = 18$$

Ответ : 18.

Корни уравнения не изменятся ,
если:

- 1) его обе части умножить или разделить на одно и то же число, не равное нулю;
- 2) какое-нибудь слагаемое перенести из одной части уравнения в другую, изменив при этом его знак.

Линейное уравнение с одним неизвестным - это уравнение, которое можно привести к виду $ax = b$, где $a \neq 0$, с помощью переноса слагаемых и приведения подобных слагаемых.

Вспомним!

Допустимые значения дроби – это такие значения, при которых знаменатель дроби **не обращается в нуль**.

Алгоритм нахождения допустимых значений дроби:

1. Находят значение переменной, при которых знаменатель дроби **обращается в нуль**.
2. Затем **исключают эти значения** из множества всех чисел.

Изучение новой темы

Рациональное выражение – алгебраическое выражение составленное из чисел и переменных с помощью арифметических операций и возведения в натуральную степень.

$P(x)$ – рациональное выражение, тогда

$P(x) = 0$ называют **рациональным уравнением**.

Для **решения рациональных уравнений** применяют те же правила, что и для линейных уравнений.

Внимание!

К дроби $\frac{a}{b} = 0$; нужно относиться

**уважительно! Сначала
воспользоваться**

**условием $a = 0$, а затем проверить b
 $\neq 0$.**

**Рассмотрим на примерах правила решения
рациональных уравнений.**

Рассмотрим пример 1.

Решить уравнение.

$$\frac{2x-1}{5} - \frac{3x+2}{4} - 1 = 0$$

Решени

Выполним действия в левой

часть:

$$\frac{2x-1}{5} - \frac{3x+2}{4} - 1 = \frac{4(2x-1) - 5(3x+2) - 20}{20} =$$

$$= \frac{8x - 4 - 15x - 10 - 20}{20} = \frac{-7x - 34}{20};$$

Дробь равна нулю лишь
при условиях: $-7x - 34 = 0;$

$$\frac{-7x - 34}{20} = 0;$$

$$-7x = 34; \quad x = -\frac{34}{7} = -4\frac{6}{7}; \quad \text{Ответ: } -4\frac{6}{7}.$$

т:

Рассмотрим пример 2.

Решить уравнение.

$$\frac{2}{x+3} + 1 = \frac{x^2 - 10}{x^2 - 9};$$

Решени

Это - рациональное уравнение. Перепишем его в виде:

$$\frac{2}{x+3} + 1 - \frac{x^2 - 10}{x^2 - 9} = 0;$$

Выполним действия в левой

части:

$$\begin{aligned} & \frac{\overset{x}{\cancel{3}} \overset{2}{\cancel{2}}}{\overset{x}{\cancel{3}} \overset{3}{\cancel{3}}} + 1 - \frac{\overset{x}{\cancel{x-3}} \overset{1}{\cancel{x+3}} \overset{1}{\cancel{x^2}} - 10}{x^2 - 9} = \\ & = \frac{2(x-3) + (x-3)(x+3) - (x^2 - 10)}{(x+3)(x-3)} = \end{aligned}$$

$$= \frac{2x - 6 + x^2 - 9 - x^2 + 10}{(x + 3)(x - 3)} =$$

$$= \frac{2x - 5}{(x + 3)(x - 3)}; \quad \frac{2x - 5}{(x + 3)(x - 3)} = 0;$$

$$2x - 5 = 0,$$

$$(x + 3)(x - 3) \neq 0$$

- условие равенства нулю
дроби

$$2x = 5,$$

$$x = 2,5.$$

Выполнив проверку убеждаемся, что при $x = 2,5$ знаменатель $(x - 3)(x + 3)$ не равен нулю.

Отве 2,5.

т:

Рассмотрим пример 3.

Решить уравнение.

$$\frac{10}{x+2} + \frac{6}{x-2} = 2$$

Решени

Это - рациональное уравнение. Перепишем его в виде:

$$\frac{\overset{x-}{10}}{x+2} + \frac{\overset{x+}{6}}{x-2} - \overset{(x-2)(x+2)}{2} = 0$$

$$\frac{10(x-2) + 6(x+2) - 2(x-2)(x+2)}{(x+2)(x-2)} =$$

$$= \frac{\underline{10x} - \underline{20} + \underline{6x} + \underline{12} - \underline{2x^2} + \underline{8}}{(x+2)(x-2)} =$$

$$= \frac{16x - 2x^2}{(x+2)(x-2)} = \frac{2x(8-x)}{(x+2)(x-2)};$$

$$\frac{2x(8-x)}{(x+2)(x-2)} = 0$$

$$2x(8-x) = 0,$$

- условие равенства нулю

$$(x+2)(x-2) \neq 0$$

дробь

Подставим эти числа в

$$2x = 0$$

$$x = 0$$

знаменатель. Поскольку ни при $x = 0$, ни при $x = 8$

или

или

знаменатель не

$$(8-x) = 0,$$

$$x = 8,$$

обращается в нуль, оба значения являются корнями уравнения.

Ответ: 0;

8.