

Этические вопросы в работе специалиста сестринского дела

Доцент кафедры сестринского
дела и социальной работы,
к.б.н. Л.М.Лавут

Медицинская этика -
исторически сложившийся
комплекс или система моральных
представлений, взглядов,
традиций и норм, относящихся к
биологии и медицине, т.е. к
сфере и проблемам изучения и
защиты жизни и здоровья
человека.

Термин мораль

МОРАЛЬ - от латинского *mores* (*mos*) –
обычаи, нрав, поведение.

Это особая форма общественного
сознания, особый способ
регулировать поведение людей и
общество.

Термин этика

- Аналогичное слово «этос» в древнегреческом означает обычай, темперамент, характер, образ мыслей. Впервые встречается у Аристотеля (4 век до н.э.). Означает филосовскую науку о морали, исследует вопросы природы и сущности морали.

Термин нравственность

НРАВСТВЕННОСТЬ - от русского слова «нрав» - совокупность душевных качеств человека

Понятие деонтологии

- ДЕОНТОЛОГИЯ - от греческого слова *deontos* – должное.

Logos – учение. Наука, учение о должном.

Термин ввел Иеремия Бентам в 1834 году.

БИОЭТИКА -

Термин ввел в 1970 году американский биолог В.Р.Поттер.

Это соединение биологических знаний и человеческих ценностей.

Основной принцип – уважение моральной автономии пациента.

Важнейшая категория – права пациента.

Правозащитное движение

I военный трибунал в Нюрнберге
(25 октября 1946г. - 19 июля 1947г.)
рассмотрение «дела медиков»

Предпосылки возникновения нового этапа развития биоэтики:

1. Современный прогресс медико-биологических наук и новейшие медицинские технологии
2. Успехи правозащитного движения

Морально-этические дилеммы

1. Медицинские вмешательства в процессы зарождения человека
2. Медицинские вмешательства в процесс умирания
3. Трансплантация органов, медицинская генетика, оказание психиатрической помощи и т.д.

ОСНОВНЫЕ ЭТИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ:

- 1. Нюрнбергский кодекс** – 10 правил проведения медико-биологических экспериментов на людях, 1946 -1947
- 2. «Устав Всемирной организации здравоохранения»**, 1946
- 3. Женевская декларация.** Принята в 1948 году Всемирной Академией врачей.
- 4. Международный кодекс медицинской этики.** Принят в 1949 г.
- 5. Хельсинкская декларация
«Биомедицинские исследования на людях».** 1964 г.

ОСНОВНЫЕ ЭТИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ:

- 6. «Сиднейская декларация
относительно смерти», 1968 год**
- 7. Декларация «О медицинском
аборте», 1970 год, Осло.**
- 8. «Этический кодекс медсестер»,
1973 год.**
- 9. Лиссабонская декларация о правах
пациента – 1981, 1995гг.**
- 10. «Европейский кодекс моральной
этики», 1987 год.**

Документы, принятые в России:

1. Этический кодекс российского врача, 1991 год
2. Кодекс профессиональной этики психиатра, 1993 год
3. Этический кодекс медицинской сестры России, 1997 год, 2010 год

Основные модели взаимоотношений медработник пациент (Роберт Вич)

- Патерналистическая
- Инженерная
- Коллегиальная
- Контрактная (информационная)

Структура общения медицинский работник - пациент:

- Вербальное
- Невербальное
- Паравербальное

Вербальное общение

- **Цель** – создать благоприятный психологический климат в начале беседы
- **Передача информации** – умение внимательно слушать и реагировать на высказывания, ориентация в проблеме
- **Активный обмен мнениями**, обсуждение вариантов лечения и ухода
- **Выход из контакта**

Невербальное общение

- Язык взглядов
- Жесты, мимика, позы
- Дистанция в общении

Паравербальное общение

- Интонации голоса
- Темп речи
- Паузы
- Тембр голоса
- Четкость речи

Основной принцип биомедицинской этики – уважение моральной автономии пациента.

1. Гуманность, уважение человеческого достоинства личности
2. Благодействие
3. Не причинение вреда
4. Справедливость

Эмоциональные изменения личности

- Повышенная впечатлительность, чувствительность
- Восприимчивость к нарушению жизненного стереотипа
- Ранимость, тревожность
- Страх смерти
- Боязнь одиночества
- Безразличие, раздражительность
- Формальность

Патологические изменения характера

- Навязчивые идеи
- Галлюцинации
- Нарушения ритма сна и бодрствования
- Не сосредоточенность внимания
- Неадекватность действий, поведения
- Аутизм
- Эмоциональная упрощенность

5 основных реакций больного:

- Психологический шок
- Реакция отрицания (неприятие болезни)
- Агрессия (как ответ на «несправедливость судьбы»)
- Депрессия (подавленное состояние)
- Принятие болезни (успокоение согласие с «неизбежностью судьбы»)

Паллиативная помощь

- Паллиативная от латинского (pallium)
– покрывало, плащ

Сообщение диагноза

- Обязательное сообщение больному всей правды о его болезни столь же не оправдано, как и обязательное не сообщение правды

Этика общения

- Избегать терминов «рак», «саркома»
Заменять их словами «опухоль»,
«язва», «сужение», «инфилтрат»
При 4 стадии сказать «ситуация не
простая, но есть способы ее
облегчить, чтобы чувствовать себя
комфортно»

Степень достоверности сообщения

- Определяется спецификой и стадией заболевания
- Отношением больного к обследованию и лечению
- Типом характера больного
- Особенностями поведения, жизненным опытом, интеллектом, образованностью, полом и возрастом

Психотравмирующее влияние заболевания

У большинства больных выявляются признаки абсессивно – фобических и астенодепрессивных нарушений психики. Эмоциональная лабильность, навязчивый страх смерти, уход в себя, тревожно – мнимительные черты, ощущение обреченности, бесперспективности дальнейшей жизни, суицидальные мысли

Факторы развития депрессии

- Социально психологические – стресс, включая установления диагноза, недостаточная социальная поддержка

Факторы развития депрессии

- Связанные с паллиативной стадией заболевания. Функциональные ограничения.
- Тип локализации процесса.
- Болевой синдром.
- Нарушения питания.
- Неврологические нарушения.
- Семейное отягощение различными видами патологии

Тип личности

- Холерик – эмоционально лабилен, легко переходит от энергичных действий к подавленному состоянию, не очень дисциплинирован, не верит в излечение, может быть агрессивен. В разговоре с ним проявлять особое внимание, сохранять спокойствие, больной должен почувствовать доброжелательность и желание ему помочь.

Тип нервной системы и некоторые реакции на болезнь

- Сангвиник – оптимист, понимает необходимость диагностических и лечебных процедур и легко их переносит, верит в успех лечения.

Тип нервной системы

- Флегматик – стеснителен, мало жалуется, не любит задавать вопросов, не углубляется в результаты обследования, дисциплинирован, рекомендации по обследованию и лечению принимает без возражений.

Тип личности

- Меланхолик – мнительный, психически лабилен, стремиться выяснить результаты обследования, обладает поверхностными сведениями негативного характера о злокачественных опухолях, в возможность излечения не верит, впадает в паническое состояние, в разговоре следит за мимикой медработника, анализирует каждое слово, склонен к канцерофобии и к тревожно – депрессивным и обессивно – фобическим синдромам.

Принцип деонтологии и этики в паллиативной помощи

- Максимальная защита психики пациента.
- Каждый паллиативный больной имеет право на лечение.

Роль медсестры при общении с больным

- Расположить к себе пациента
- Снять его эмоциональное напряжение
- Успокоить и посочувствовать
- Сопереживание медсестры может ослабить страх перед медучреждением и медработниками

Роль медсестры при общении с больным

- Обезопасить пациента от индуцированного страха
- Стимулировать оптимистический настрой
- Всячески помочь пациенту адаптироваться к восприятию заболевания
- НЕ противоречить информации врача

Психология потерь

- Опухоли и паллиативные состояния можно сравнить с чувством невинно приговоренного к смертной казни без объявления срока исполнения. А В Гнездилов