

Семейство куньи

- Несмотря на общепринятую тенденцию того, что все животные, принадлежащие к одному и тому самому семейству, обладают похожими чертами, семейство куньи является исключением в этом. На данный момент оно состоит из двадцати трех современных видов, которые проживают на территории Евразии, Северной и Южной Америки, а также Африки. Это самые мелкие животные из всех хищных.

- В семействе куньих много представителей разной среды обитания, есть водные и полуводные виды, наземные. Среди общих характеристик, которыми обладают животные этого семейства, следует сказать о вытянутом и гибком теле, находящегося на относительно коротких ногах с пятью пальцами на каждой.
-
- Шея подвижная, голова маленькая. К тому же, нужно обратить внимание на лицевую часть черепа, которая является немного укороченной. Длина тела 11 - 150см, а вес от 25г до 45кг. Необходимо также подчеркнуть, что семейство куньи - это не только представители хищного животного мира, это также и всеядные животные довольно мелких размеров.
-
- У всех хорошее зрение, слух и обоняние. Все они подвижные, ловкие. Некоторые умеют здорово плавать, некоторые могут лазать по деревьям.

Особенности

- В первую очередь, необходимо обратить внимание на то, что кожа выше названных представителей животного мира покрывается в большинстве случаев густой и тонкой шерстью (именно по этой причине они являются самыми дорогими пушными зверями). Окрас разнообразный - пятнистый, однотонный, полосатый. Цвета меха белый, черный, коричневый, рыжий.

Особенности

- Что же касается зубной системы и устройства их конечностей, то они бывают довольно разнообразными и какой-либо общей их характеристики не существует. Зубов у куньих может быть от 28 до 38 штук. У каланов, например задние ноги - ласты. Когти куньих не втягивающиеся.

Особенности

- Следует сказать об удивительно впечатляющем скелете, который состоит из чрезвычайно тонких костей. Сам хребетный столб имеет: 11 или 12 пар ребер в области грудной клетки; 8 или 9 позвонка в области поясницы; 3 крестцовых позвонка; от 12 до 26 хвостовых позвонка. В большинстве случаев ключицы в этих животных недостаточно развиваются, зато лопатки отличаются большими размерами.

Образ жизни, питание

- Почти все животные из семейства куны ведут одиночный образ жизни. Предпочитают сумеречную или ночную активность. Очень часто представители этого семейства предпочитают пользоваться норами и ямками, которые они вырывают самостоятельно или просто занимают те, которые были созданы другими животными.
-
- Некоторые виды любят обустраивать свои жилища между камнями и ветвями, в дуплах деревьев. В большинстве случаев они не впадают в зимнюю спячку: только некоторые виды из семейства куньих. Встретить в дикой природе их почти невозможно. Все куны пугливые и осторожные.
-
- Большое количество представителей этого семейства предпочитают питаться другими животными. Добычей для них становятся: мелкие млекопитающие, птицы и птичьи яйца, лягушки и насекомые, улитки и моллюски, раки и рыбы.
-

Размножение

- Брачный период длится до 4 месяцев. Беременность продолжается один - два месяца, рождаются слепые и голые детеныши (1 - 10), нуждающиеся в тщательном уходе и защите. В среднем около 2 месяцев они под защитой матери и питаются её молоком. В случае опасности мать переносит щенков в другое место. Самостоятельную жизнь детеныши начинают в возрасте 5 и выше месяцев.

Продолжительность жизни

- В дикой природе представители этого семейства живут 5 - 20 лет.
- Класс - Млекопитающие
- Отряд - Хищные
- Семейство - Куньи

Представители



- Горностай схож внешне с лаской, длина тела в среднем составляет 30 см. Этот зверь хищный, питается грызунами. Иногда разоряет гнезда. В голодное время может есть лягушек, если и их нет, то отбросы и ягоды можжевельника. Размножается раз в год, продолжительность беременности - примерно 9,5 месяцев. В помете в среднем пять детенышей. Активен этот представитель в разное время суток.

Представители



- Солонгой. На горностая похоже еще одно млекопитающее семейства куньих. Называют этого зверя солонгой. Он немного крупнее, одет в более пушистый мех. Длина тела около 30 см. Питается полевками и другими мелкими зверьками, даже ондатрами. Кроме этого, в рацион входят ящерицы и птицы. В зимнее время происходит спаривание, длительность беременности – месяц. В помете примерно три-четыре детеныша.

Представители



- Колонок имеет более плотное телосложение, чем у горносталя. Длина тела достигает сорока сантиметров. Масса в среднем составляет 750 г. Зимняя окраска – рыжевато-охристая. В летнее время расцветка более темная. Гон происходит с февраля по апрель. Беременность длится 40 дней (в среднем), детенышей в помете 7.

Представители



- Норка. Рассматривая семейство куньих, нельзя не вспомнить про американскую и европейскую норку. Эти зверьки прекрасно ныряют и плавают. Внешне норка напоминает колонка. Европейская меньше американской. Длина ее тела 40 см. Масса не более полутора килограмм. Что еще отличает эти два вида норок? Строение зубов и черепа. Норки живут возле водоемов с подмытыми берегами, питаются мелкими грызунами, ондатрами, лягушками и т.д. Спариваются весной, еще по снегу. Период беременности занимает в среднем пятьдесят дней. Детенышей в помете, как правило, девять, хотя бывает и

Представители



- Хорьки. Очень близки к нормам хорьки. Их известно три вида: степной, черноногий и черный. Первый самый большой, длина тела до 56 см, масса до двух кг. Чуть меньше черные хорьки. Длина их тела составляет 48 см, а масса не более 1,5 кг. Основа питания у всех трех видов - это грызуны. Черный хорек, как правило, отдает предпочтение мышам и полевкам, а степной – хомякам и сусликам. Луговые собачки - вот что предпочитают черноногие. Живут эти представители семейства (в особенности степные) около озер и рек.

Представители



- Куницы. Сейчас мы поговорим о каменной и лесной куницах. Эти зверьки значительно крупнее хорьков. Длина тела каменной куницы составляет в среднем 45 см, а масса не более 2,5 кг. Лесная немного поменьше. Длина ее тела в среднем 44 см, а вес колеблется в пределах от 750 до 1500 грамм. Тело у куниц сильное, стройное, ушки большие, застроенные. Различия между этими видами в строении зубов и черепа. Более южным видом является каменная куница. Как понятно из названия, лесная обитает в лесах, захлампленных темнохвойных и смешанных. Иногда и каменная живет в такой местности, но чаще её можно увидеть на безлесных скалистых склонах. Как правило, активны в ночное время суток, хотя можно встретить их и днем. Лесная куница ест грызунов, иногда зайцев. Каменная питается так же, но в её рационе львиную долю занимает растительная пища. Гон происходит в период июнь-август. В помете рождается в среднем пять детенышей.