
ТУБЕРКУЛЕЗ КАК СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКАЯ ПРОБЛЕМА.





TYDEPKYJIES SAPASHOE SABOJIEBAHKE



ТУБЕРКУЛЕЗ

Вызывает микроб, называемый туберкулезной палочкой.



Она очень устойчива во внешней среде.

Болеют туберкулезом люди, животные, птицы.

Попадает возбудитель в организм при вдыхании пыли, с капельками слюны при разговоре, кашле, чихании.

Можно заразиться через продукты, полученные от больных животных.



ЧТОБЫ НЕ ЗАБОЛЕТЬ ТУБЕРКУЛЕЗОМ:

ЗАНИМАЙСЯ СПОРТОМ!

ПЛАВАЙ, БЕГАЙ, ПРЫГАЙ!
ПОДРУЖИСЬ СО СВЕЖИМ ВОЗДУХОМ
И ВОДОЙ!

ЧАЩЕ ОТПРАВЛЯЙСЯ ВПОХОДЫ!



ПУСТЬ ПРИРОДА СТАНЕТ ТВОИМ ЛУЧШИМ ДРУГОМ!

системы.

ПРАВИЛЬНО И ПОЛНОЦЕННО ПИТАЙСЯ!

помни, что «Сила сохраняется в труде, здоровье - в режиме»

Принимай пищу не реже 3-х раз в день. Для твоего здоровья полезны: свежие фрукты, овощи, мясо и яйца, молочные продукты.

Обязательно пей молоко, кефир, простоквашу. Ешь творог, сыр, сметану. В них содержатся необходимые для тебя витамины: A, B, C,



ИЗБЕГАЙ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК!

НЕ КУРИ

НЕ ПРИНИМАЙ АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ И НАРКОТИКИ

НЕ САДИСЬ ЗА СТОЛ С ГРЯЗНЫМИ РУКАМИ

НЕ ПОЛЬЗУЙСЯ ЧУЖИМИ: ГУБНОЙ ПОМАДОЙ, СИГАРЕТАМИ, ЛОЖКАМИ,

ЛОЖКАМИ, ТАРЕЛКАМИ, ПОЛОТЕНЦЕМ, НОСОВЫМ ПЛАТКОМ,

НЕ ОТКАЗЫВАЙСЯ ОТ ПРОБЫ МАНТУ!

Она поможет врачу узнать, болен ли ты и чем тебе помочь.

В 1-ом классе НЕ ЗАБУДЬ

СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ

по назначению врача



Туберкулёз — это широко распространённое в мире инфекционное заболевание человека, которое вызывают различные виды микобактерий (палочка Коха). Болезнь обычно поражает легкие, но способна поражать и другие органы и

помни!

ЧТОБЫ СВОЕВРЕМЕННО ВЫЯВИТЬ ТУБЕРКУЛЕЗ:

Ежегодно с 15 лет ПРОХОДИ

ФЛЮОРОГРА-ФИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА УВЕЛИЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВА ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА

- Постоянно снижающийся жизненный уровень населения
- Очень слабое питание большей части населения
- Увеличение числа лиц, которые страдают на алкоголизмом и наркоманией
- Высокая инфицированность и пораженность туберкулезом такой категории, как мигранты, беженцы, бомжи и т.д.
- практически выпадающие из поля зрения лечебно-профилактические учреждения
- сокращение масштабов противотуберкулезных мероприятий, особенно в части профилактики и раннего выявления туберкулеза у взрослого населения, в частности у социально-дезадаптированных групп и групп высокого риска;

пути заражения микобактериями туберкулеза

- 1. Аэрогенный: (при вдыхании воздуха)
- воздушно-капельный (при чихании и кашле);
- воздушно-пылевой (в запыденных помещениях, где находился больной).
- 2. Контактный (через предметы быта).
- 3. Пищевой (при употреблении в пищу зараженных продуктов питания).



Симптомы туберкулёза

Туберкулез — та болезнь, симптомы которой разнообразны и похожи на симптомы других заболеваний:

- кашель (с выделением мокроты) в течение трех недель и более;
- кровохарканье;
- боли в груди в течение трех недель и более;
- субфебрильная температура (37,0°–37,5°);
- лихорадка в течение трех недель и более;
- потливость (особенно в ночные часы);
- потеря массы тела.



Показатель	Годы				
	1995	2000	2005	2009	2010
Зарегистрировано заболеваний у больных с диагнозов	м «активный тубер	кулез», установ.	пенным впервы	е в жизни:	
всего, тыс. человек	85,0	130,7	119,2	117,2	109,9
на 100 тыс. человек населения	57,8	89,8	84,0	82,6	76,9
из них с диагнозом «активный туберкулез» органов дь	скания:				
всего, тыс. человек	79,8	125,6	114,9	113,5	106,4
на 100 тыс. человек населения	54,2	86,3	81,0	80,0	74,4
Выявлено больных при профилактических осмотрах:					
всего, тыс. человек	34,2	48,9	51,6	58,3	52,9
в процентах к числу взятых на учет больных	47.1	52,0	53.4	61,5	59,9
с диагнозом, установленным впервые в жизни	77,1	32,0	55,4	01,0	33,3
Численность больных активным туберкулезом, состоя	щих на учете в леч		тических учреж	дениях (на коне	ц года):
всего, тыс. человек	280,8	379,9	298,5	262,7	253,6
на 100 тыс. человек населения	191,0	261,5	210,8	185,1	177,4
из них больных активным туберкулезом органов дыха					
всего, тыс. человек	248,6	349,1	279,6	248,1	239,6
на 100 тыс. человек населения	169,1	240,2	197,5	173,6	167,6
из них имели фазу распада					
всего, тыс. человек	83,6	114,3	112,7	102,4	98,5
на 100 тыс. человек населения	56,8	78,7	79,6	71,6	68,9
Взято на учет в отчетном году больных с впервые в ж	изни установленны	ым диагнозом «Т	губеркулез орга	янов дыхания»:	
всего, тыс. человек	67,5	89,1	92,5	91,3	85,1
на 100 тыс. человек населения	45,9	61,3	65,4	64,3	59,5
из них имели фазу распада					
X 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	20.0	4.80.4	4 4 4	00.0	0.0 1

^{33,3} 39,0 36.4 всего, тыс. человек 40,4 44,1

22,6

⁹ За 2005, 2009 гг. показатели на 100 тыс. человек населения рассчитаны с использованием численности населения без учета итогов Всероссийской

переписи населения (ВПН) 2010 г., за 2010 г. - с учетом предварительных итогов ВПН-2010

27,8

31,0

27,5

25,4

на 100 тыс. человек населения





Рис. 3.13. Заболеваемость активным туберкулезом в России (1), в среднем в Западной Европе (2), и в некотор субъектах РФ на 100 тыс. чел. населения. Источники: Росстат, Государственные доклады «О санитарноэпидемической обстановке в Российской Федерации...», и «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации ...»; WHO, World Health Statistics.



странах. Источники: WHO, World Health Statistics; Global Tuberculosis Report 2015.

Перечень литературы и дополнительную информацию см. в книге или на сайте



МЕРЫ ПРИНИМАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВОМ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАЗВИТИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА.

- Вакцинация против туберкулеза в целях его профилактики
- Профилактические медицинские осмотры граждан
- Обязательность оповещения спец. органов надзора о выявлении заболевших
- Своевременное выявление больных туберкулезом сельскохозяйственных животных
- Диспансерное наблюдение за больными туберкулезом устанавливается независимо от согласия таких больных
- Принудительное лечение для нарушителей режима лечения (по решению суда)
- Ведение государственного статистического наблюдения в области предупреждения распространения туберкулеза

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ

- Заболеваемость туберкулезом в России за восемь лет упала на треть, смертность

 на две трети. / Электронный ресурс. Режим доступа к сайту:
 http://www.interfax.ru/presscenter/500110
- Карпов А.В. Туберкулез в России. // Общество. Среда. Развитие, 2007. № 2. С. 83–87.
- Лебедев В.Б. Социальный статус больных туберкулезом: его значимость для организации результатов стационарного лечения. // Вестник фтизиатрии, 2004. Вып. 5. С. 47–52.
- Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 года № 294 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»». / Электронный ресурс. Режим доступа к сайту: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162178/
- Туберкулёз. // Информационный бюллетень ВОЗ (октябрь 2016 года). / Электронный ресурс. Режим доступа к сайту: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs104/ru/
- Федеральный закон от 18.06.2001 года № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации». / Электронный ресурс. Режим доступа к сайту: https://rg.ru/2001/06/23/tuberkulez-dok.html