

**Дослідження.  
Рослини і тварини  
України, які походять  
з інших материків і  
частин Євразії.**

# 1. Муфлон

Територія її походження:

Острови Середземномор'я (Корсика та Сицилія)


Короткі пояснення:

Баран аргалі, баран дикий, аргалі, муфлон європейський (*Ovis musimon* Linnaeus, 1758, або *Ovis ammon musimon*) – вид роду баран (*Ovis*) родини бикових (Bovidae). Жуйна парнокопитна рогата тварина.

Муфлон вибирає дуже високі, скелясті гірські вершини і робить стоянки на крутих, недоступних скелях.

У середньому муфлони досягають довжини 130 см. Ріст 90 см, вага 50 кг у самців і 35 кг у самок. |

У даний час, муфлон розповсюджений на Кавказі (наприклад, в Хосровському заповіднику у Вірменії), на півночі Іраку, і на північному заході Ірану. Раніше зустрічався на Вірменському нагір'ї, в Криму та на Балканах.



## 2. Одатра

Територія її походження:

Канада і США, частково північ Мексики.

Короткі пояснення:

Ондатра болотяна (*Ondatra zibethicus*) – вид **гризунів** (Rodentia) підродини **щурових** (Arvicolinae), єдиний представник роду ондатр (*Ondatra*).

Зазвичай вони населяють заболочені райони біля прісноводних або солоноводних водоймищ, річок, озер або ставків.

Вага дорослих особин може досягати 1,8 кг (у середньому 1–1,5 кг). Довжина тіла – 23–36 см, довжина хвоста майже дорівнює довжині тіла – 18–28 см.

В Україну ондатра вперше була завезена в 1944 р. По мірі того, як болота зникають в результаті людської діяльності, переселяється до районів **іригаційних каналів**. Мешкає уздовж струмків, забруднених **сіркою** від **вугільних шахт**, у яких не може мешкати **риба** та **жаби**. Зникнення багатьох **хижаків** також позитивно впливає на чисельність популяції.





# 3. Пеленгас

Територія її походження:

Далекий Схід

Короткі пояснення:

Піленгас, або кефаль червоногуба (*Liza haematocheilus*) – напівпрохідна риба родини кефалевих.

У Чорному морі пеленгас з'явився завдяки успішному експерименту сорокарічної давності, поставленому співробітниками Одеського відділення Азово-Чорноморського НДІ. Їм вдалося провести акліматизацію цього цінного виду риби в Чорному й Азовському морі.

Розміри – до 60 см, вага – до 3 кг.

Трапляється в Японському морі від ліману Амура до Південної Кореї, ще біля берегів Японії та Китаю. У другій половині ХХ сторіччя успішно акліматизований в Азовському морі, пізніше – у Чорному морі.



# 4. Нутрія

Територія її походження:

Південна Америка

Короткі пояснення:


Нутрія, болот'яний щур або койпу (*Myocastor coypus*) – ссавець, напівводяний гризун, єдиний вид родини нутрієвих (*Myocastoridae*).

Нутрія веде напівводний спосіб життя. Улюблені місця проживання – водойми зі слабо проточною або стоячою водою: заболочені береги річок, очеретяно-рогозові озера та вільхо-осокові болота із багатою водною та прибережною рослинністю.

Зовні нутрія нагадує великого щура. Довжина її тіла досягає 60-ти см, хвоста – до 45 см, важить нутрія 5–10 кг, рідко 15 кг. Самці більші за самок.

Нутрія – чужорідний вид, що трапляється в Україні переважно в місцях штучного утримання й розведення, проте демонструє тенденцію до натуралізації<sup>[5]</sup>.

За даними авторів статей «Дніпро» і «Південний Буг» Вікіпедії, її популяції є в цих ріках.





Провідні культури в  
землеробстві — зернові: озима і яра  
пшениця, жито, озимий і ярий  
ячмінь, кукурудза,  
овес, гречка, просо та рис.



# 5. Соняшник

## Територія її походження:

З Північної Америки (де соняшник був окультурений в III тисячолітті до н.е.) в Європу рослина завезена іспанцями в 1510 році. В Україну ввезена у 18 ст.

## Короткі пояснення:

Соняшник — мексиканська «квітка сонця». В Європу рослина завезена іспанцями в 1510 році. В Україну ввезена у 18 ст. В Україні буйний розвиток культури соняшника почався з початку 20 ст.. Площа під цю культуру в 9 українських губерніях (у тис. га): 1881 — 9,9, 1911 — 33,5, 1913 — 76 (44% усіх олійних і 19% всіх технічних), головним чином у північно-східних і центральних степових районах. Спершу його розводили як декоративну рослину, згодом також заради зерна, яке використовували як ласощі. Тепер соняшникова олія в Україні є найкращим харчовим продуктом як у непереробленому, так і переробленому (маргарин) вигляді.



# 6. Актинідія

Територія її походження:

Вперше почали окультуриувати у Китаї.


Короткі пояснення:

Актинідія (*Actinidia*) – рід витких рослин родини дигенійових (за іншими джерелами, актинідієвих).

Культивують як декоративні рослини.

Актинідія – рослина з дводольним насінням. Аби вона плодоносила, необхідно висаджувати жіночі та чоловічі рослини разом. Однак чоловічі ліани вкорінюються гірше. Тому на 10-15 жіночих ліан потрібно всього одна чоловіча.

В Україні актинідію культивують як декоративну та їстівну рослину.





# 7. Робінія

Територія її походження:

Північної Америки

Короткі пояснення:

Робінія – рід дерев або кущів родини бобових. Походить з Північної Америки. Культивують як декоративні та медоносні рослини. Найпоширеніший вид – робінія звичайна (*Robinia pseudoacacia*) (відома як акація звичайна або біла акація).

Культивується також декоративні гібриди з різних видів робінії.





**Жито походить з країн  
Південно-Східної Азії,  
Туреччини та Закавказзя.**



Ячмінь  
поширився з  
Малої Азії у  
IV–III  
тисячоліттях  
до н.е.





**Батьківщиною  
сучасної  
кукурудзи  
є Мексика.**



Овес походить зі  
східної Європи



Гречка походить з  
Індії.





**Просо - давня  
зернова  
культура, яка  
була відома  
народам Східної і  
Центральної Азії  
за 4-5 тис. років  
до н.е**





**Рис  
ПОХОДИТЬ З  
Африки та  
Китаю**