

Заячья губа



Заячья губа (хейлосхизис) – врожденный дефект, образованный несросшимися во внутриутробном периоде тканями носовой полости и верхней челюсти, характеризующийся расщелиной губы.



Заячья губа проявляется внешним
уродством, проблемами в питании и



хейлопластики.

Данная патология встречается у одного из 2500 новорождённых, среди которых преобладают мальчики.

Формирование расщелин губы и нёба происходит до 8-ой недели беременности, когда закладываются челюстно-лицевые органы.



Коррекцией расщелин лица, восстановлением нарушенных функций и реабилитацией пациентов с такой врожденной патологией занимаются специалисты в области челюстно-лицевой хирургии, стоматологии, логопедии, педиатрии.



Причины развития заячьей губы

Формирование заячьей губы, также как и волчьей пасти, обусловлено на генном уровне. Причиной является мутация TBX22-гена.

Появление расщепления губы, может провоцироваться токсикозом, стрессами, злоупотреблением антибиотиками, радиационным или инфекционным воздействием, употреблением наркотиков, алкоголя или курением будущей матери.

Особенно опасно действие этих факторов в первые 2 месяца беременности. Еще один фактор риска развития заячьей губы – поздние (после 35-40 лет) роды.

Определить рождение ребенка с заячьей губой можно по данным УЗИ плода на поздних этапах беременности. Родителям, уже имеющим ребенка с расщелиной губы, перед планированием следующей беременности показано медико-генетическое консультирование.



Классификация хейлосхизиса

Как правильно распознать
формы
(челюсть)
Полное
О
В
В






Различают четыре формы:

-
-
-

ердого

южно



Существует еще нарушение развития зубного ряда, который проявляется пропуском некоторых зубов или наличием дополнительных, с неправильным углом роста зубов, со склонностями к кариесу. При таких нарушениях может потребоваться ортодонтическое лечение и коррекция прикуса, а иногда - пересадка лишних или имплантация недостающих зубов.



У детей с заячьей губой отмечается нарушение процесса формирования звуков, что проявляется расстройством речевой функции (ринолалией). Речь у таких пациентов нечеткая, с выраженным носовым звуком («гнусавостью») и проблемным произношением согласных.



Принципы лечения заячьей губы

Коррекция заячьей губы проводится в ходе

од
пл
ос
П
вр
ро
пр
пр
ф



Оперативное устранение заячьей губы – хейлопластику лучше проводить в 3-6-месячном возрасте. В случае тяжелого дефекта, возможно ее осуществление в первые дни или месяц жизни ребенка при условии достаточной прибавки в весе, отсутствии анемии, патологии кишечника, сердечно-сосудистой, эндокринной или нервной систем.



Проведение хейлопластики в первые две недели после рождения благоприятно влияет на развитие губы и носа в



Д
П
О
Э
Г
О
Н
К

й.
й в
меры
СТЬ К

При хирургическом устранении
расщелины губы достигается



и
ние
ие
вита
ком

Коррекция заячьей губы должна быть завершена к 3-м годам, когда начинается становление речи. В более позднем возрасте проводится логопедическое лечение, направленное на устранение речевых дефектов, и косметическое лечение по устранению послеоперационного рубца.

