



УХОД И НАБЛЮДЕНИЕ ЗА БОЛЬНЫМИ С
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

ТЕХНИКА ДАЧИ КИСЛОРОДА
НЕОТЛОЖНАЯ ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ
ПРИ ОБМОРОКЕ, КОЛЛАПСЕ, ОСТАНОВКЕ
СЕРДЦА

*ВЫПОЛНИЛИ СТУДЕНТЫ ГРУППЫ 2901 ПЕДИАТРИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА*

КОСТЯЕВ РОДИОН НИКОЛАЕВИЧ

КАЛУЖСКИХ ДМИТРИЙ АРТЕМОВИЧ

ЭТИОЛОГИЯ

Жалобы:

- слабость
- быструю утомляемость при физической нагрузке
- внезапную потерю сознания;
- неприятные ощущения в области сердца («перебои», «замирание», боли).

Проявления заболеваний ССС во все периоды детства могут быть отставание в физическом и моторном развитии детей, бледность кожных покровов, изменения пульса, уровня артериального давления, одышка.



ПАЛАТА ДЕТЕЙ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ССС




ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ССС

Правила питания на диете №10

- Питаться равномерно 5-6 раз в день;
- Готовить без соли, соль ограничена до 3-5 г;
- Сократить количество свободной жидкости до 1,2 л;
- В основе рациона ощелачивающие продукты, пища, богатая магнием, калием, липотропными веществами;
- Мясо, птицу и рыбу отваривать, остальные продукты можно тушить, запекать.



ИССЛЕДОВАНИЕ ПУЛЬСА



Пульс – толчкообразные колебания стенок сосудов, вызванные движением крови, выталкиваемой сердцем.

У детей до года жизни пульс обычно исследуют на височной артерии, в последующем – на лучевой артерии.

Подсчет частоты ударов должен осуществляться в течение минуты. Для медицинской сестры имеют значение частота и ритмичность пульса.


ОБМОРОК

Обморок – проявление острой сосудистой недостаточности и «малокровия» головного мозга, клинически реализующееся во внезапной и кратковременной (несколько минут) потере сознания.

Тактика среднего медицинского персонала при обмороке:

- **срочно вызвать врача**
- уложить ребенка горизонтально с приподнятыми ногами
- освободить от стесняющей одежды побрызгать на лицо холодной водой; дать понюхать смоченную нашатырным спиртом вату; приложить грелки к конечностям;
- контролировать частоту пульса и дыхания;

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОБМОРОКЕ



КОЛЛАПС

Коллапс – острая сосудистая недостаточность, характеризующаяся резким снижением артериального давления и грубым расстройством кровообращения.


Тактика медицинского персонала при остановке сердца:

- уложить больного горизонтально;
- проводить непрямой массаж сердца.

Оценка эффективности массажа сердца:

- появление пульса на артериях, в первую очередь – на крупных (сонной, лучевой);
- появление тонов сердца;
- уменьшение цианоза кожных покровов и слизистых;
- повышение артериального давления;

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ КОЛЛАПСЕ





Различия между коллапс и шок

Коллапс

- Это острая сосудистая недостаточность, обусловленная падением тонуса артериол и вен и резким снижением артериального и венозного давления. Нарушения в ЦНС развиваются, в отличие от шока, вторично, вследствие сосудисто-сердечной недостаточности.

Шок

- Реакция организма на сверхсильное, особенно болевое, раздражение, сопровождающуюся более тяжелыми расстройствами жизненно важных функций нервной и эндокринной систем, кровообращения, дыхания, обменных процессов и часто выделительной функции почек.

О ЧЁМ МЫ УЗНАЛИ

Особенности жалоб при поражении сердечно-сосудистой системы;

Виды двигательных режимов, используемых в стационарах;

Особенности диетотерапии и питьевого режима у детей с поражением сердечно-сосудистой системы;

Тактика медсестры при оказании помощи ребенку с обмороком; остановкой сердца

**ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ОКОНЧЕНА**

A raccoon is sitting on a green lawn, looking directly at the camera. Its right paw is raised in a waving gesture. The raccoon has its characteristic black and tan fur with a dark mask around its eyes.

**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!**