


Тема:

Лист — боковой орган побега

Задачи:

1. Изучить особенности внешнего и внутреннего строения листа;
2. Дать характеристику основным функциям листа.



Морфология листа


Лист — боковой (латеральный) орган, характеризующийся ограниченным ростом.

Главные функции листа:


1. Фотосинтез;
2. Газообмен;
3. Транспирация.

Дополнительные функции:

4. Запасающая (сочные чешуи луковицы);
5. Вегетативное размножение (сенполия);
6. Защитная (колючки кактуса).



Морфология листа




Листья могут быть черешковыми, сидячими и влагалищными.

Основные части листа:

Лист большинства растений состоит из пластинки, черешка, прилистников и основания.



Листовая пластинка — расширенная, обычно плоская часть листа, выполняющая функции фотосинтеза, транспирации и газообмена.



Морфология листа

Черешок — суженная часть листа, соединяющая листовую пластинку с основанием и регулирующая положение листа по отношению к свету. Листья с черешками называют **черешковыми**, без черешков — **сидячими**.

Основание листа — нижняя часть листа, примыкающая к стеблю. Одной из форм является **листовое влагалище** — расширенное основание листа в виде трубки, охватывающее часть стебля (злаки).




Морфология листа



Прилистники — листовидные образования у основания листа, которые служат для защиты молодого листа и пазушной почки. Встречаются не у всех растений.

Иногда прилистники достигают значительного развития, их размеры превышают размеры листовых пластинок (горох). В этом случае прилистники выполняют роль фотосинтезирующих органов.

Морфология листа




По форме листовые пластины бывают:

1 – игольчатые, 2 – линейные, 3 – продолговатые, 4 – ланцетные, 5 – овальные, 6 – округлые, 7 – яйцевидные, 8 – обратнояйцевидные, 9 – ромбические, 10 – стреловидные, 11 – копьевидные.


Морфология листа

Форма края листовой пластинки



1 – цельнокрайний; 2 – пильчатый; 3 – зубчатый; 4 – струговидный; 5 – городчатый; 6 – волнистый; 7 – выемчатый.

Морфология листа




Рассеченность листовой пластинки:

лопастные листья (перисто- или пальчато) — выемки не доходят до половины полупластинки;

раздельные листья (перисто- или пальчато) — выемки заходят глубже половины полупластинки;

рассеченные листья (перисто- или пальчато) — выемки достигают главной жилки листа.

Листорасположение




1. *Розетка* — междоузлия сближены;
2. *Супротивное* — от узла отходят два сидящих друг против друга листа (клен, сирень);
3. *Очередное, или спиральное* — на каждом узле располагается по одному листу, причем основания листьев можно соединить условной спиральной линией, растянутой вдоль оси побега (береза, липа);
4. *Мухомчатое* — от узла отходит более двух листьев (олеандр).

Морфология листа

Классификация листьев:

Листья, имеющие одну пластинку (цельную или выемчатую), называются *простыми*. Простые листья при листопаде опадают целиком.

Сложные листья — листья, состоящие из нескольких четко обособленных листовых пластинок (листочков), каждый из которых своим черешком прикреплен к общему черешку (рахису). Часто сложный лист опадает по частям: сначала листочки, а потом черешок.



Морфология листа

Среди сложных листьев различают:

Парно- и непарноперистосложные листья;

Пальчатосложные листья;

Тройчатые листья.

Рахис сложных листьев может образовывать боковые ответвления, тогда возникают дважды-, трижды-, четыреждыперистосложные листья.



Морфология листа


Жилкование — это система расположения проводящих пучков в листовых пластинках. Различают:

1. Параллельное жилкование — листовую пластинку пронизывает несколько одинаковых жилок, располагающихся параллельно.





Характерно для однодольных растений.

2. Дуговое жилкование — листовую пластинку пронизывает несколько одинаковых жилок, располагающихся дугообразно.

Характерно для однодольных растений.




Признаки двудольных и однодольных растений

Двудольные растения	Однодольные растения
 Две семядоли, это обычно органы запаса питательных веществ для проростка	 Одна семядоля, она — орган всасывания питательных веществ из эндоспермы
 Чаще всего стержневой корень с боковыми корнями	 Мочковатый корень
 Обычно пальчатое или перистое жилкование, часто расчлененная листовая пластинка	 Жилкование чаще всего параллельное или дуговое, лист цельный
 Проводящие пучки распределены по центральному цилиндру регулярно кольцеобразно	 Проводящие пучки в центральном цилиндре располагаются неупорядоченно
 Цветок содержит по 4, 5 и более элементов; околоцветник чаще всего двойной	 Элементы цветков чаще всего кратны трем, околоцветник простой, остьевидный

Морфология листа


3. *Сетчатое жилкование* — обычно из черешка в листовую пластинку входит одна жилка, которая затем дает ответвления — боковые жилки, образующие густую сеть. Сетчатое жилкование может быть *перистым* и *пальчатым*. Характерно для двудольных растений.

4. *Дихотомическое жилкование* — листовую пластинку пронизывают вильчато разветвленные жилки (гинкго).



Анатомия листа

Сверху и снизу лист покрыт **эпидермой** (кожицей). Поверх эпидермы располагается слой **кутина**. Нижняя поверхность листа покрыта эпидермой с множеством устьиц. На 1 мм² листа приходится **от 50 до 500** устьиц. У плавающих на поверхности воды листьев устьица располагаются на верхней эпидерме, а у погруженных листьев обычно отсутствуют.



Внутреннее строение листа:

1 — кутикула; 2 — эпидерма; 3 — ксилема; 4 — флоэма; 5 — волокна; 6 — колленхима; 7 — устьица; 8 — столбчатая хлоренхима; 9 — губчатая хлоренхима; 10 — железистый волосок; 11 — кроющий волосок; 12 — межклетник.

Анатомия листа


Между верхней и нижней эпидермой располагается мезофилл, образованный столбчатой и губчатой хлоренхимой. Столбчатая хлоренхима располагается под верхней кожицей листа. В основном в ней осуществляются процессы фотосинтеза. У растений средних широт (огурец, клевер) столбчатая паренхима обычно образована одним рядом клеток, у южных растений чаще образуется 2-3 ряда.

Ближе к нижней эпидерме располагается губчатая хлоренхима, осуществляющая преимущественно функции газообмена и транспирации. Клетки губчатой хлоренхимы принимают участие и в фотосинтезе, но в меньшей слабой степени, чем клетки столбчатой паренхимы, так как число хлоропластов в них в 2 -6 раз меньше.

Жилки образуют проводящую систему листа. В жилках имеются проводящие пучки (один или несколько). Большинство пучков **закрытые**, лишь более крупные могут быть открытыми, но камбий развит слабо.


Анатомия листа

Поперечный срез листовой пластинки



Анатомия листа


Видоизменения, приобретенные в ходе приспособления к среде обитания



Лист плавающий, устьица в верхнем эпидермисе; большие межклетники; слабо выраженные проводящие пучки




Жесткий лист, верхний эпидермис многослойный, толстая кутикула; устьица погруженные, защита от испарения с помощью волосков





Суккулентный лист, верхний эпидермис многослойный; запасание воды

В проводящих пучках ксилема обращена к верхней стороне листа, а флоэма — к нижней. Крупные проводящие пучки образованы сосудами и ситовидными трубками. Обычно проводящие пучки окружены обкладкой из паренхимы — *обкладочной паренхимой*. Обкладка увеличивает площадь контакта мезофилла с проводящими элементами ксилемы и флоэмы. Проводящие пучки выполняют и механическую функцию. Крупные жилки, как правило, окружены *склеренхимой*.

Анатомия листа



Функции листа: транспирация



Транспирация является **верхним концевым двигателем водного тока**, обеспечивает **терморегуляцию** и **движение воды и солей к органам растения**.

Различают два вида транспирации — **кутикулярную** и **устьичную**.

Кутикулярная (10-20%) — испарение воды с поверхности кутикулы.


Под **устьичной транспирацией** понимают процесс испарения воды листьями с помощью устьиц.

Функции листа: транспирация





В настоящее время общепризнана гипотеза устьичных движений, связанная с перераспределением **ионов калия** между замыкающими и сопутствующими клетками и **синтезом на свету глюкозы**.

Ионы калия (закачиваются в замыкающие клетки) и **образующаяся на свету глюкоза** повышают осмотическое давление.

Определенную роль играет и **концентрация CO_2** . Избыток CO_2 , по-видимому, вызывает подкисление цитоплазмы. Это приводит к изменению pH, что приводит к закрыванию устьиц.



Устьица



Функции листа: транспирация





Рис. 15.1.1.

Возникновение осмотического давления:

1 – осмотическая ячейка; 2 – полупроницаемая мембрана; 3 – молекулы растворителя – воды; 4 – молекулы растворенного вещества – сахарозы

Устьица



А. Трубку, заполненную водой с растением наверху, погружают в сосуд с ртутью. По мере испарения воды в трубку втягивается ртуть. Справа вместо растения используется глиняный пористый цилиндр. Б. В тонком стеклянном капилляре вода за счет адгезии (притяжения к стенкам) поднимается на значительную высоту, а в широком сосуде – только образует по краю сосуда мениск.

Устьица

Растения	Число устьиц на мм ²		Место произрастания
	На верхней поверхности	На нижней поверхности	
Кувшинка	625	3	Водоем
Дуб	0	438	Влажный лес
Слива	0	253	Умеренно влажный сад
Яблоня	0	246	
Пшеница	47	32	Недостаточно влажное поле
Овес	40	47	
Очиток	21	14	Сухие песчаные места
Молодило	11	14	

Рис. 43. Типы устьичных аппаратов:

А. Аномоцитный (от греч. *anomos* – беспорядочный): замыкающие клетки устьиц окружены клетками, не отличающимися от остальных клеток эпидермы. Во всех группах высших растений за исключением хвощей.

Б. Перицитный (от греч. *peri* – около, вокруг): замыкающие клетки полностью окружены одной побочной клеткой. Только у папоротников.

В. Полоцитный (от греч. *polos* – полюс): замыкающие клетки окружены одной побочной клеткой не полностью: к одному из устьичных полюсов примыкают одна или две эпидермальные клетки. Глазным образом у папоротников. Г. Диацитный (от греч. *dia* – врозь, через): замыкающие клетки окружены парой побочных клеток, общая стенка которых находится под прямым углом к замыкающим клеткам. У папоротников и цветковых.

Д. Парацитный (от греч. *para* – рядом): каждая из замыкающих клеток устьиц сопровождается одной или более побочными клетками, расположенными параллельно замыкающим клеткам.

У папоротников, хвощей, цветковых и гнетопсид.

Е. Анизоцитный (от греч. *anisos* – неравный): замыкающие клетки устьиц окружены тремя побочными клетками, из которых одна заметно крупнее или меньше двух других. Только у цветковых.

Ж. Тетрацитный (от греч. *tetra* – четыре): замыкающие клетки окружены четырьмя побочными клетками, из которых две латеральные и две полярные. У цветковых, главным образом у однодольных.


З. Ставроцитный (от греч. *stauros* – крест): замыкающие клетки устьиц окружены четырьмя (иногда тремя или пятью) одинаковыми, более или менее радиально вытянутыми побочными клетками, антиклинальные стенки которых расположены накрест по отношению к замыкающим клеткам. У папоротников, изредка у цветковых.

И. Энциклоцитный (от греч. *kuklos* – колесо, круг): четыре (иногда три) или более побочных клеток образуют узкое кольцо вокруг замыкающих клеток. У папоротников, голосеменных и цветковых.

К. Актиноцитный (от греч. *aktis* – луч): пять или более радиально вытянутых побочных клеток располагаются вокруг замыкающих клеток. Только у цветковых.


1 – замыкающие клетки устьица; 2 – побочные клетки;

3 – основные клетки эпидермы (по А. А. Яценко-Хмелевскому, с изменениями)



Функции листа: фотосинтез

Фотосинтез — процесс образования из углекислого газа и воды за счет энергии света органических веществ. Процесс идет с выделением кислорода.




Функции листа: дыхание

Процесс дыхания осуществляется постоянно, **как на свету, так и в темноте.**


Если поместить в сосуд свежесрезанные листья, плотно закрыть его и поставить в темное теплое место, то на следующий день можно обнаружить, что состав воздуха в сосуде изменился, известковая вода мутнеет. В отличие от фотосинтеза, во время дыхания происходит освобождение энергии, органические вещества окисляются, и происходит выделение углекислого газа. Эти реакции протекают в митохондриях клеток.



Функции листа: дыхание



Листопад




Для уменьшения транспирации в зимний период времени растения освобождаются от листьев, происходит листопад. Сигналом к листопаду служит уменьшение продолжительности светового дня. Это явление получило название фотопериодизма.

Листья теряют зеленую окраску в результате разрушения хлорофилла в хлоропластах. Становятся заметны вспомогательные пигменты – каротиноиды желтого или оранжевого цвета.

У основания черешка в поперечном направлении образуется специальный отделительный слой, состоящий из легко расслаивающейся паренхимы. Со стороны стебля ближайшие к основанию черешка клетки пробковеют и образуют защитный слой, сохраняющийся после опадания листа в виде **листового рубца**.

Видоизменения листа



Колючки. Уменьшают транспирацию и защищают растения от поедания животными. Кактус, робиния, барбарис.

Усики. Это нитевидные образования, чувствительные к прикосновению и приспособленные для лазания.

Ловчие аппараты. Встречаются у растений, произрастающих на болотистых, торфяных, бедных минеральными веществами почвах (росянка, венерина мухоловка, непентес используют богатую азотом и фосфором органическую пищу).

Сочные листья листовых суккулентов накапливают в листьях воду.





Рис. 83. Колючки листового происхождения:

а — спаржа спаржевидная; *б* — альфредия снежная; *в* — акация корнигера; *г* — молочай блестящий; *д* — робиния лжеакация (белая акация); *е* — барбарисы: 1 — тунберга; 2 — падуболистный; 3 — обыкновенный

Видоизменения листа



Олимпиадникам




Рис. 14.5.3.2.


Лист фикуса (*Ficus elastica*) – поперечный разрез:

1 – верхняя эпидерма; 2 – гиподерма; 3 – цистолит; 4 – столбчатая паренхима; 5 – губчатая паренхима; 6 – ксилема; 7 – флоэма; 8 – склеренхима (6–8 – коллатеральный проводящий пучок); 9 – нижняя эпидерма; 10 – устьичный аппарат

Изолатеральный лист фикуса – столбчатая ткань сверху и снизу, внутренние клетки **многослойной эпидермы** служат для накопления влаги.

Встречаются и выделительные клетки – **цистолиты**, представляющие собой вросшую внутрь клеточную стенку, на которой откладываются кристаллы углекислого кальция.

Олимпиадникам



Листья, у которых столбчатая паренхима на верхней стороне листовой пластинки, а губчатая на нижней, называются *дорсовентральными*.




Рис. 145. Типы строения мезофилла у покрытосеменных растений: А — функия; Б — борец; В — лимон; Г — эвкалипт.

Обозначения: в.эп — верхняя эпидерма, г.мзф — губчатый мезофилл, дл.к — дланевидные клетки, к — кутикула, кр — кристалл оксалата кальция, мжк — межклетники, н.эп — нижняя эпидерма, о.мзф — однородный мезофилл, с.мзф — столбчатый мезофилл, у — устьице




Рис. 50. Разрез листа олеандра. Устьица в углублениях на нижней стороне листа, закрытые волосками:

1 — верхний эпидермис; 2 — палисадная паренхима; 3 — губчатая паренхима; 4 — нижний эпидермис; 5 — устьица; 6 — волоски.






Рис. 80. Изолатеральный лист проса:

1 — верхняя эпидерма; 2 — клетки обкладки; 3 — ксилема; 4 — флоэма; 5 — нижняя эпидерма; 6 — склеренхима; 7 — устьица; 8 — проводящий пучок; 9 — палисадная паренхима; 10 — двигательные клетки




У С-4 растений около проводящего пучка располагаются клетки обкладки, к ним прилегают клетки мезофилла (кранц-анатомия).

Повторение




Что обозначено на рисунках?

Повторение




Что обозначено на рисунках?

Повторение



Что обозначено на рисунке?

Повторение



Что обозначено на рисунке?