

Дифференциал функции

- Производные высших порядков
- Производные от функций, заданных параметрически
- Дифференциал функции
- Геометрический смысл дифференциала
- Основные теоремы о дифференциалах
- Применение дифференциала в приближенных вычислениях

Производные высших порядков

Производная $y' = f'(x)$ функции $y = f(x)$ есть также функция от x и называется *производной первого порядка*.

Если функция $f'(x)$ дифференцируема, то ее производная называется *производной второго порядка* и обозначается:

$$y''; \quad f''(x); \quad \frac{d^2y}{dx^2} \qquad \text{Итак: } y'' = (y')'$$

Производная от производной второго порядка, если она существует называется *производной третьего порядка* и обозначается:

$$y'''; \quad f'''(x); \quad \frac{d^3y}{dx^3} \qquad \text{Итак: } y''' = (y'')'$$

Производной n – ого порядка (или n – ой производной) называется производная от производной $n - 1$ – ого порядка.

$$y^{(n)} = (y^{(n-1)})'$$

Производные высших порядков

Начиная от производной 4 порядка , производные обозначаются римскими цифрами или цифрами в скобках:

$y^{(5)}$ или y^v - производная пятого порядка.

Вычислить производную n – ого порядка от функции: $y = \ln(x + 1)$

$$y' = (\ln(x + 1))' = \frac{(x + 1)'}{x + 1} = \frac{1}{x + 1} = (x + 1)^{-1}$$

$$y'' = ((x + 1)^{-1})' = -1 \cdot (x + 1)^{-2}; \quad y''' = (- (x + 1)^{-2})' = 1 \cdot 2(x + 1)^{-3}$$

$$y^{(4)} = (1 \cdot 2(x + 1)^{-3})' = -1 \cdot 2 \cdot 3(x + 1)^{-4}$$

$$y^{(5)} = (-1 \cdot 2 \cdot 3(x + 1)^{-4})' = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4(x + 1)^{-5}$$

$$y^{(n)} = (-1)^{n+1}(n-1)!(x+1)^{-n}$$

Производные от функций, заданных параметрически

Пусть функция $y = f(x)$ задана параметрически уравнениями:

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$$

Производная первого порядка от этой функции находится по формуле:

$$y'_x = \frac{y'_t}{x'_t}$$

Найдем производную второго порядка:

$$y''_x = (y'_x)'_x = \frac{(y'_x)_t'}{x'_t}$$

Аналогично получаем:

$$y'''_x = (y''_x)'_x = \frac{(y''_x)_t'}{x'_t} \quad y^{(4)}_x = (y'''_x)'_x = \frac{(y'''_x)_t'}{x'_t} \quad \text{и т. д.}$$

Производные от функций, заданных параметрически

Вычислить производную 3 – ого порядка от функции:

$$\begin{cases} x = t^2 \\ y = 1 - t^3 \end{cases} \quad y'_x = \frac{(1 - t^3)'}{(t^2)'} = \frac{-3t^2}{2t} = -1.5t$$

$$y''_x = \frac{(y'_x)'_t}{x'_t} = \frac{(-1.5t)'}{(t^2)'} = \frac{-1.5}{2t} = -0.75t^{-1}$$

$$y'''_x = \frac{(y''_x)'_t}{x'_t} = \frac{(-0.75t^{-1})'}{(t^2)'} = \frac{0.75t^{-2}}{2t} = \boxed{\frac{3}{4t^3}}$$

Дифференциал функции

Пусть функция $y = f(x)$ имеет в некоторой точке X отличную от нуля производную, следовательно существует предел:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x) \neq 0 \Rightarrow \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x) + \alpha(x) \Rightarrow$$

(где $\alpha(x) \rightarrow 0$ при $\Delta x \rightarrow 0$)

$$\Delta y = f'(x)\Delta x + \alpha(x)\Delta x$$

*По теореме о связи
функции, ее предела и
бесконечно малой
функции*

Таким образом, приращение функции Δy представляет собой сумму двух слагаемых: $f'(x)\Delta x$ и $\alpha \cdot \Delta x$, являющимися бесконечно малыми при $\Delta x \rightarrow 0$.

При этом первое слагаемое есть бесконечно – малая одного порядка с Δx , так как:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f'(x)\Delta x}{\Delta x} = f'(x) \neq 0$$

Дифференциал функции

Второе слагаемое есть бесконечно малая функция более высокого порядка по сравнению с Δx , так как Δx

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\alpha(x)\Delta x}{\Delta x} = \alpha(x) = 0$$

Поэтому первое слагаемое $f'(x)\Delta x$ называют **главной частью приращения функции**.

Дифференциалом функции $y = f(x)$ в точке x называется главная часть ее приращения:

$$dy = f'(x)\Delta x$$

Найдем дифференциал независимой переменной, то есть функции $y = x$:

$$y' = x' = 1 \Rightarrow dy = dx = \Delta x$$


Поэтому:

$$dy = f'(x)dx$$

Дифференциал функции независимой переменной равен приращению производной функции отряда дифференциал независимой переменной dy

Геометрический смысл дифференциала

Проведем к графику функции $y = f(x)$ в точке $M(x, y)$ касательную



Рассмотрим ординату
касательной для точки $x + \Delta x$.
Из прямоугольного треугольника
 ABM имеем:

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{|AB|}{\Delta x} \Rightarrow$$

$$|AB| = \operatorname{tg} \alpha \cdot \Delta x$$

Согласно геометрическому смыслу производной, $\operatorname{tg} \alpha = f'(x) \Rightarrow$

$$|AB| = f'(x) \cdot \Delta x = dy$$

Дифференциал функции $y = f(x)$ в точке X равен приращению
ординаты касательной к графику функции в этой точке, когда X
получает приращение Δx .

Основные теоремы о дифференциалах

Теорема 1

Дифференциал суммы, разности, произведения и частного двух дифференцируемых функций находится по формулам:

$$d(u \pm v) = du \pm dv$$

$$d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v \cdot du - u \cdot dv}{v^2}$$

$$d(u \cdot v) = v \cdot du + u \cdot dv$$

Теорема 2

Дифференциал сложной функции равен произведению производной этой функции по промежуточному аргументу на дифференциал этого промежуточного аргумента.

$$y'_x = y'_u \cdot u'_x \Rightarrow y'_x \cdot dx = y'_u \cdot u'_x \cdot dx \Rightarrow$$

$$dy = y'_u \cdot du$$

dy

Это свойство дифференциала называют **инвариантностью** (неизменностью) формы дифференциала.

Приложение дифференциала в приближенных вычислениях

Как известно, приращение функции можно представить в виде:

$$\Delta y = dy + \alpha(x)\Delta x$$

Отбрасывая бесконечно малую $\alpha(x)\Delta x$ более высокого порядка, чем Δx , получим приближенной равенство:

$$\Delta y \approx dy$$

Это равенство позволяет с большой точностью вычислять приращение любой дифференцируемой функции.

Подставим в равенство выражения для приращения и дифференциала функции:

$$f(x + \Delta x) - f(x) \approx f'(x)\Delta x \Rightarrow$$

$$f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\Delta x$$

Формула позволяет приближенно вычислять значение функции в точке $x_0 + \Delta x$, зная значение функции в точке x_0 .

Приложение дифференциала в приближенных вычислениях

Вычислить приближенно: $\arctg 1.05$

Рассмотрим функцию: $y = \arctg x$

$$\arctg(x_0 + \Delta x) \approx \arctg(x_0) + \arctg'(x_0)\Delta x$$

Так как $x_0 + \Delta x = 1.05$ то $x_0 = 1$ $\Delta x = 0.05$

$$\arctg 1 = \frac{\pi}{4} \quad (\arctg x)' = \frac{1}{1+x^2} \quad (\arctg x)'|_{x=1} = \frac{1}{2}$$

$$\arctg(1.05) \approx \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \cdot 0.05 \approx 0.81$$