

**Кафедра медицинской и биологической физики**

**Тема: Элементы векторной алгебры.**

лекция № 2 для студентов 1 курса, обучающихся по специальности 030401– Клиническая психология

**к.п.н., доцент Шилина Н.Г.**

**Красноярск, 2015**

# План лекции:

- Понятие вектора. Действия над векторами.
- Линейно зависимые и линейно независимые векторы.
- Размерность линейного пространства.
- Базис линейного пространства
- Скалярное произведение двух векторов
- Системы координат.

# Значение темы

- Предметом изучения в векторной алгебре являются векторные величины(векторы) и действия с ними. Примерами таких величин могут служить скорость и ускорение движущейся точки, сила.
- Цифровые данные, используемые в различных областях, также можно представить в виде систем векторов.

Понятие вектора позволяет существенно упростить операции с большими структурированными наборами чисел.

**Вектором** называют любую конечную последовательность чисел:  $a_1, a_2, \dots, a_n$ .  
При этом сами числа  $a_1, a_2, \dots, a_n$  называют **координатами вектора**.

Координаты вектора получаются вычитанием из координат его конца соответствующих координат начала.

# Определение вектора

Понятие вектора позволяет существенно упростить операции с большими структурированными наборами чисел.


Определим вектор как набор ***N*** чисел. Можно определить вектор-столбец и вектор-строку

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} \mathbf{x}_1 \\ \mathbf{x}_2 \\ \dots \\ \mathbf{x}_N \end{pmatrix}; \quad \mathbf{x} = \|\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_N\|$$



## Геометрическим вектором (вектором)

- Называется направленный прямолинейный отрезок, для которого указано, какая из ограничивающих точек считается началом, а какая - концом. Начало вектора называют точкой его приложения.


# Обозначения



Отрезок  $AB$



# Векторы с 1,2 или 3 координатами - ЭТО




**направленные отрезки на прямой,  
плоскости, в пространстве**

Два вектора  $(a_1, a_2, \dots, a_n)$  и  $(b_1, b_2, \dots, b_m)$  называются **равными** в том и только том случае, если они имеют одинаковое число координат ( $n = m$ ) и если их соответственные координаты равны между собой:  $a_1 = b_1; a_2 = b_2, \dots, a_n = b_n$ .  
Равенство векторов пишется так:  **$a = b$** .

# Для геометрических векторов

- Два вектора называются равными, если они лежат на параллельных прямых (или одной прямой), одинаково направлены и имеют равные длины



$$\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB}.$$

$$\overrightarrow{AB} \neq \overrightarrow{BA},$$


# Нуль-вектор -

вектор у которого начало и конец совпадает, его модуль равен нулю и нет определенного направления.

Следовательно можно считать все нуль векторы равными и ввести для них общее обозначение  $\underline{0}$

# Коллинеарные векторы

Векторы называются коллинеарными, если они лежат на одной прямой, либо на параллельных прямых



$$a \parallel b$$

# Компланарные векторы

Векторы называются компланарными, если они расположены на прямых, параллельных одной и той же плоскости

# Сложение векторов

Два вектора равны, если равны все их компоненты.

Сумма двух векторов  $\mathbf{x}$  и  $\mathbf{y}$  записывается как  $\mathbf{x}+\mathbf{y}$  и определяется как вектор


$$\mathbf{x} + \mathbf{y} = \begin{pmatrix} \mathbf{x}_1 + \mathbf{y}_1 \\ \mathbf{x}_2 + \mathbf{y}_2 \\ \dots\dots\dots \\ \mathbf{x}_N + \mathbf{y}_N \end{pmatrix}$$

Разность двух векторов  $\mathbf{x}-\mathbf{y}$  есть вектор  $\mathbf{z}$ , такой, что  $\mathbf{y}+\mathbf{z}=\mathbf{x}$

**Сумма** векторов ***a*** и ***b*** определяется равенством  $\mathbf{a} + \mathbf{b} = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_n + b_n)$ .

Например,  $(1, -1, 0, 3, 8) + (4, 3, -3, -5, -7) = (5, 2, -3, -2, 1)$ .

## Правило параллелограмма




# Умножение векторов

- **Произведением** вектора  $\mathbf{a} = (a_1, a_2, \dots, a_n)$  на число  $k$  называют вектор  $k\mathbf{a}$ , определяемый равенством  $k\mathbf{a} = (ka_1, ka_2, \dots, ka_n)$ .
- Умножение вектора на число сводится к растяжению при  $|k| > 1$  или сжатию при  $|k| < 1$  исходного вектора с сохранением его направления при  $k > 0$  или с заменой на противоположное при  $k < 0$

# Умножение вектора на скаляр

$$c_1 \mathbf{x} = \begin{pmatrix} c_1 x_1 \\ c_1 x_2 \\ \dots \\ c_1 x_N \end{pmatrix}$$



# Свойства операций:

- коммутативность:  $\mathbf{a} + \mathbf{b} = \mathbf{b} + \mathbf{a}$ ;
- ассоциативность:  $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) + \mathbf{c} = \mathbf{a} + (\mathbf{b} + \mathbf{c})$ ,  
 $k(l\mathbf{a}) = (kl)\mathbf{a}$ ;
- дистрибутивность:  $(k + l)\mathbf{a} = k\mathbf{a} + l\mathbf{a}$ ,  
 $k(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = k\mathbf{a} + k\mathbf{b}$ .
- Вектор, все координаты которого равны нулю, называют **нулевым** вектором ( $\mathbf{0}$ ).
- Вектор  $(-1)\mathbf{a}$  называется **противоположным** вектору  $\mathbf{a}$  (обозначается  $-\mathbf{a}$ ).  $\mathbf{a} + (-\mathbf{a}) = \mathbf{0}$ .

# Линейно зависимые и линейно независимые векторы

Множество  $L$  называют **линейным пространством** (или **векторным пространством**), а его элементы – **векторами**, если:

1. На этом множестве задана операция сложения: каждому двум векторам  $\mathbf{a}$  и  $\mathbf{b}$  из  $L$  сопоставлен некоторый третий вектор из  $L$ , обозначаемый  $\mathbf{a} + \mathbf{b}$  и называемый суммой векторов  $\mathbf{a}$  и  $\mathbf{b}$ ;
2. Задана операция умножения векторов на числа: каждой паре  $\mathbf{a}, k$  (вектор  $\mathbf{a}$  и число  $k$ ) сопоставлен некоторый вектор, обозначаемый  $k\mathbf{a}$  и называемый произведением вектора  $\mathbf{a}$  на число  $k$ ;

3. Эти операции удовлетворяют следующим требованиям:

- $\mathbf{a} + \mathbf{b} = \mathbf{b} + \mathbf{a}$  для любых векторов  $\mathbf{a}$  и  $\mathbf{b}$ ;
- $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) + \mathbf{c} = \mathbf{a} + (\mathbf{b} + \mathbf{c})$  для любых трех векторов  $\mathbf{a}$ ,  $\mathbf{b}$  и  $\mathbf{c}$ ;
- существует единственный вектор  $\mathbf{0}$  такой, что  $\mathbf{a} + \mathbf{0} = \mathbf{a}$  для любого вектора  $\mathbf{a}$ ;
- для любого вектора  $\mathbf{a}$  существует единственный вектор  $\mathbf{a}'$  такой, что  $\mathbf{a} + \mathbf{a}' = \mathbf{0}$ ;
- $1 \cdot \mathbf{a} = \mathbf{a}$  для любого вектора  $\mathbf{a}$ ;
- $k_1(k_2 \mathbf{a}) = (k_1 k_2) \mathbf{a}$  для любых чисел  $k_1$  и  $k_2$  и любого вектора  $\mathbf{a}$ ;
- $(k_1 + k_2) \mathbf{a} = k_1 \mathbf{a} + k_2 \mathbf{a}$  для любых чисел  $k_1$  и  $k_2$  и любого вектора  $\mathbf{a}$ ;
- $k(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = k\mathbf{a} + k\mathbf{b}$  для любого числа  $k$  и любых векторов  $\mathbf{a}$  и  $\mathbf{b}$ .

# Геометрический смысл линейной зависимости векторов

- Один вектор линейно зависим тогда и только тогда, когда он нулевой.
- Для того, чтобы два вектора были линейно зависимы, необходимо и достаточно, чтобы они были коллинеарны.
- Для того чтобы три вектора были линейно зависимы необходимо и достаточно, чтобы они были компланарны.
- Любые четыре вектора линейно зависимы.

# Примеры линейных пространств

- векторы плоскости (обозначение  $R^2$ )
- нашего пространства, в котором мы живем, его называют трехмерным (определяется тремя измерениями: длиной, шириной, высотой) и обозначают  $R^3$

Обобщением этих пространств является пространство  $R^n$  векторов  $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ , имеющих  $n$  координат ( $n$ -мерных векторов).


- Пусть  $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_p$  – множество векторов из пространства  $L$ . Возьмем произвольные числа  $k_1, k_2, \dots, k_p$  и составим вектор  $\mathbf{a} = k_1 \mathbf{a}_1 + k_2 \mathbf{a}_2 + \dots + k_p \mathbf{a}_p$ .
- Любой вектор  $\mathbf{a}$  данного вида называется **линейной комбинацией** векторов  $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_p$ , а числа  $k_1, k_2, \dots, k_p$  – коэффициентами этой линейной комбинации.

# Пример

- $\mathbf{a}_1 = (2, -1, 4, 0)$ ,  $\mathbf{a}_2 = (3, -5, -2, 2)$ ,  $\mathbf{a}_3 = (-3, 6, -8, 5)$ , то линейная комбинация

$$3\mathbf{a}_1 - 2\mathbf{a}_2 - \mathbf{a}_3 = (6, -3, 12, 0) - (6, -10, -4, 4) - (-3, 6, -8, 5) = (3, 1, 24, -9).$$

- вектор  $\mathbf{b}$  является линейной комбинацией векторов  $\mathbf{a}_1$  и  $\mathbf{a}_2$ , т.к.  $\mathbf{b} = 3\mathbf{a}_1 + 2\mathbf{a}_2$ .



- Векторы  $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_p$  называются **линейно зависимыми** (или образующими **линейно зависимую систему**), если существуют такие числа  $c_1, c_2, \dots, c_p$ , не равные одновременно нулю, что справедливо равенство:

$$c_1 \mathbf{a}_1 + c_2 \mathbf{a}_2 + \dots + c_p \mathbf{a}_p = \mathbf{0}.$$

- Если же это равенство возможно только в случае  $c_1 = c_2 = \dots = c_p = 0$ , то векторы  $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_p$  называются **линейно независимыми** (образующими **линейно независимую систему**).

# Условия линейной зависимости и независимости векторов

1. Всякая система векторов, содержащая нуль-вектор  $\mathbf{0}$ , линейно зависима.
2. Если  $k$  ( $k < p$ ) векторов системы  $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_p$  линейно зависимы, то и вся система линейно зависима.
3. Если из системы линейно независимых векторов  $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_p$  удалить  $r$  ( $r < p$ ) векторов, то оставшиеся векторы образуют также линейно независимую систему.
4. Если среди векторов системы  $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_p$  имеются такие векторы  $\mathbf{a}_k$  и  $\mathbf{a}_m$ , что  $\mathbf{a}_k = \lambda \mathbf{a}_m$ , где  $\lambda$  — некоторое число, то вся система векторов  $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_p$  линейно зависима.
5. Система, состоящая из одного вектора, линейно зависима тогда и только тогда, когда этот вектор нулевой.

# Теорема

- Векторы  $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_p$  линейно зависимы тогда и только тогда, когда хотя бы один из них является линейной комбинацией всех остальных.
- Линейное пространство  $L$  называется  **$n$ -мерным**, если в нем существует  $n$  линейно независимых векторов, а любые  $n + 1$  векторов являются линейно зависимыми.

- **Базисом**  $n$ -мерного линейного пространства  $L$  называется любая упорядоченная система  $n$  линейно независимых векторов в пространстве  $R^n$

- Пример такой системы в пространстве  $R^n$  :

$$\mathbf{e}_1 = (1, 0, \dots, 0),$$

$$\mathbf{e}_2 = (0, 1, \dots, 0),$$

.....

$$\mathbf{e}_n = (0, 0, \dots, 1).$$

- **Теорема 1.** Если в пространстве  $L$  некоторая система  $n$ -мерных векторов обладает свойством, что определитель, строками которого являются данные векторы, не равен нулю, то эти векторы образуют базис в  $L$ .
- **Теорема 2.** Разложение произвольного вектора  $\mathbf{a}$  по базису всегда единственно.
- Числа  $k_1, k_2, \dots, k_n$  – коэффициенты разложения вектора  $\mathbf{a}$  по некоторому базису – называются **координатами** вектора  $\mathbf{a}$  в этом базисе.

- Пусть даны два линейных пространства  $L_1$  и  $L_2$ . Предположим, что между элементами этих пространств можно установить взаимно однозначное соответствие (биекцию).
- Если элемент  $x \in L_1$ , а  $y \in L_2$ , то факт их взаимно однозначного соответствия записывается так:  $x \leftrightarrow y$ . Предположим также, что если  $x_1 \leftrightarrow y_1$  и  $x_2 \leftrightarrow y_2$  то  $x_1 + x_2 \leftrightarrow y_1 + y_2$  и  $\alpha x_1 \leftrightarrow \alpha y_1$ , где  $\alpha$  – любое действительное число.
- Если выполнены эти условия, то пространства  $L_1$  и  $L_2$  называются **изоморфными**.

- **Теорема 3.** Два линейных пространства изоморфны тогда и только тогда, когда они имеют одинаковую размерность.
- Например, изоморфны множество всех векторов трехмерного пространства и множество последовательностей из  $R^3$ , каждая из которых содержит три числа.

# Скалярное произведение двух векторов

- Скалярным произведением двух векторов  $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$  и  $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)$  называется число  $(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n = \sum_{i=1}^n x_i y_i$

# Скалярное произведение двух векторов

$$(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sum_{i=1}^N x_i y_i$$

$$(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (\mathbf{y}, \mathbf{x})$$

$$(\mathbf{x} + \mathbf{y}, \mathbf{z} + \mathbf{w}) = (\mathbf{x}, \mathbf{z}) + (\mathbf{x}, \mathbf{w}) + (\mathbf{y}, \mathbf{z}) + (\mathbf{y}, \mathbf{w})$$

$$(c_1 \mathbf{x}, \mathbf{y}) = c_1 (\mathbf{x}, \mathbf{y})$$

$(\mathbf{x}, \mathbf{x})$  – квадрат длины вектора  $\mathbf{x}$

# Свойства скалярного произведения

- $(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (\mathbf{y}, \mathbf{x})$  – коммутативность;
- $(\mathbf{x}, \mathbf{y} + \mathbf{z}) = (\mathbf{x}, \mathbf{y}) + (\mathbf{x}, \mathbf{z})$  – дистрибутивность;
- $(k\mathbf{x}, \mathbf{y}) = k(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ ,  $k$  – любое действительное число;
- $(\mathbf{x}, \mathbf{x}) > 0$ , если  $\mathbf{x}$  – ненулевой вектор;
- $(\mathbf{x}, \mathbf{x}) = 0$ , если  $\mathbf{x}$  – нулевой вектор

- Линейное пространство  $L$ , в котором введена операция скалярного произведения, называется **евклидовым пространством**.
- **Длиной (модулем) вектора  $x$**  называется число:  $|x| = \sqrt{(x, x)}$  или

$$|x| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 \dots x_n^2}$$

# Пример

Рассчитать модуль вектора

$$\mathbf{a} = (\sqrt{3}, 3, 2)$$


$$|\mathbf{a}| = \sqrt{3 + 9 + 4} = \sqrt{16} = 4$$

# Свойства модуля вектора

- $|\mathbf{x}| = 0$  тогда и только тогда, когда  $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ;
- $|k\mathbf{x}| = |k| \cdot |\mathbf{x}|$ .  $k$  – любое действительное число;
- $|(\mathbf{x}, \mathbf{y})| \leq |\mathbf{x}| \cdot |\mathbf{y}|$  (неравенство Коши – Буняковского);
- $|\mathbf{x} + \mathbf{y}| \leq |\mathbf{x}| + |\mathbf{y}|$  (неравенство треугольника).

- Пусть  $x$  и  $y$  – два ненулевых вектора. Углом между ними называют число  $\varphi$ , определенное с помощью равенства

$$\cos \varphi = \frac{(x, y)}{|x| \cdot |y|}$$



- Векторы  $x$  и  $y$  называются **перпендикулярными** или **ортогональными** друг другу, если их скалярное произведение равно нулю. Нулевой вектор ортогонален любому другому.
- Систему векторов  $a_1, a_2, \dots, a_p$  в евклидовом пространстве  $L$  называют **ортогональной**, если любые два различных вектора этой системы ортогональны друг другу.

# Ортогональность векторов

$$(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 0$$

$$\mathbf{x} = \begin{vmatrix} 1 \\ 0 \end{vmatrix}; \quad \mathbf{y} = \begin{vmatrix} 0 \\ 1 \end{vmatrix}$$

- Вектор  $e$  называют **нормированным** или **единичным**, если его модуль равен 1.
- Систему векторов  $e_1, e_2, \dots, e_p$  называют **ортонормированной**, если любые два вектора этой системы ортогональны друг другу и если модуль каждого из них равен 1.
- В  $n$ -мерном евклидовом пространстве система  $n$  ортонормированных векторов образует **ортонормированный** базис.

# Тест

Умножение вектора на число при  $|k| > 1$   
сводится к

- 1.растяжению исходного вектора
- 2.сжатию исходного вектора

# РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- **Обязательная:**

- Кричевец, А.Н. Математика для психологов /А.Н. Кричевец, Е.В. Шикин, А.Г. Дьячков. – М.: Флинта: НОУ ВПО «МПСИ», 2010.– 376 с.
- Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и интерпретация данных/А.Д. Наследов.- СПб.: Речь, 2008.

- **Дополнительная:**

- Математика в примерах и задачах: учебное пособие /Л.Н. Журбенко, Г.А. Никонова, Н.В.Никонова и др. – М.: ИНФРА–М, 2011. –373 с.
- Болдин К.В., Башлыков В.Н., Рукосуев А.В. Высшая математика /К.В. Болдин К, В.Н. Башлыков, А.В. Рукосуев. – М.: Флинта, 2010
- **Электронные ресурсы:**
- УБИЦ КрасГМУ Портал центра дистанционного образования  
Электронная библиотека
- Ресурсы интернет



Красноярский  
Государственный  
Медицинский  
Университет  
им. проф.  
В.Ф.Войно-Ясенецкого



**БЛАГОДАРЮ  
ЗА ВНИМАНИЕ**