

ДРУГИЕ СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ СРЕДСТВА

MISERIS SUCCURERE DISCE -
учись помогать несчастным
больным

Производные нитрофурана

Фуразолидон
(*Furazolidonum*) –
препарат желтого
цвета, в таблетках
0,05.


**для лечения кишечных
инфекций** (дизентерия и
пищевая
токсикоинфекция)

Наружные растворы
для лечения ран и
ожогов



Furadoninum И Furaginum

применяют при
Инфекционных
заболеваниях
мочевых путей



палочки



Применение производных нитрофурана

**ограничено в связи с большим
количеством побочных действий:
поражение легких, печени с
летальным исходом.**

Furacilinum –

препарат желтого
цвета, выпускается
в таблетках по 0,05.
Внутрь – для
лечения кишечных
инфекций, наружно
- как антисептик.



Производные 8-оксихинолина


5-НОК = нитроксолин

1. 5-НОК =
нитроксолин
хорошо всасывается
в
кровь и выводится в
неизменном виде
через
почки,
накапливаются в
моче



Применяется 5-НОК

при воспалении
мочевыводящих
путей в
таблетках в оболочке
(по 2 табл. 4 раза в
день).



Противовирусные средства

**Химиотерапевтические средства,
обладающие лечебной и
профилактической активностью при
вирусных инфекциях:**

- 1. Амиксин**
- 2. Ингаверин**
- 3. Арбидол**
- 4. Оксалиновая мазь**
- 5. Ремантадин**
- 6. Интерфероны**

Ремантадин –

- применяется для профилактики и лечения гриппа А в таблетках по 0,05 – 3 раза в день, в течение первых 5 дней.



Оксолиновая мазь

0,25 % мазь в нос для профилактики гриппа, назначают 2-3 раза в день в течение 4-5 дней.



Интерферон –

**Фактор
противовирусного
иммунитета,
образуется
в организме
человека,
применяется как
профилактическое и
лечебное средство
при
гриппе и вирусных**



Противогрибковые средства

гризеофульвин ,
флюкостат , нистатин ,
дифлюкан , леворин,
амфотерицин .

Применяются при
заболеваниях,
вызываемых грибами
(кандидомикозе,
дисбактериозе,
микозе, молочнице);
таблетки, мази, свечи.

