

# КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

## Планиметрия

### 1. Углы

Углом называется геометрическая фигура (рис. 1), образованная двумя лучами, исходящими из одной точки.

Точка  $O$  — вершина угла, а лучи  $OA$  и  $OB$  — стороны угла.

Обозначение:  $\angle AOB$  или  $\angle ab$ .

Угол в  $90^\circ$  называется **прямым** (рис. 2).

Угол, меньший прямого, называется **острым** (рис. 3).

Угол, больший прямого, но меньший развернутого, называется **тупым** (рис. 4).




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4

Два угла называются **вертикальными**, если стороны одного угла являются продолжениями сторон другого (рис. 5).

$\angle AOC$  и  $\angle DOB$ ;  $\angle BOC$  и  $\angle AOD$  — вертикальные.

**Вертикальные углы равны:**  $\angle AOC = \angle DOB$  и  $\angle BOC = \angle AOD$ .

Два угла называются **смежными**, если у них одна сторона общая, а две другие составляют прямую линию (рис. 6),  $\angle AOC$  и  $\angle BOC$  — смежные.




Рис. 5




Рис. 6




Рис. 7

Сумма смежных углов равна  $180^\circ$ .

Биссектрисой угла называется луч, проходящий между сторонами угла и делящий его пополам (рис. 7).

Биссектрисы вертикальных углов составляют продолжение друг друга (рис. 8).

Биссектрисы смежных углов взаимно перпендикулярны (рис. 9).



Рис. 8




Рис. 9

При пересечении двух прямых  $a$  и  $b$  третьей  $c$  (секущей) образуется 8 углов (рис. 10):

соответственные углы:

$\angle 1$  и  $\angle 5$ ,  $\angle 2$  и  $\angle 6$ ,  $\angle 4$  и  $\angle 8$ ,  $\angle 3$  и  $\angle 7$ ;

внутренние накрест лежащие:

$\angle 4$  и  $\angle 6$ ,  $\angle 3$  и  $\angle 5$ ;

внешние накрест лежащие:

$\angle 1$  и  $\angle 7$ ,  $\angle 2$  и  $\angle 8$ ;

внутренние односторонние:

$\angle 4$  и  $\angle 5$ ,  $\angle 3$  и  $\angle 6$ ;

внешние односторонние:

$\angle 1$  и  $\angle 8$ ,  $\angle 2$  и  $\angle 7$ .




Рис. 10

### 2. Многоугольник




Рис. 11

$ABCDE$  — пятиугольник (рис. 11).

Точки  $A$ ,  $B$ ,  $C$ ,  $D$ ,  $E$  — вершины многоугольника;  $\angle A$ ,  $\angle B$ ,  $\angle C$ ,  $\angle D$ ,  $\angle E$  — углы;  $AB$ ,  $BC$ ,  $CD$  и т. д. — стороны; отрезки  $AC$ ,  $AD$ ,  $BE$ ,  $BD$ ,  $CE$  — диагонали;  $P = AB + BC + \dots + EA$  — периметр многоугольника.

Многоугольник называется **выпуклым** (рис. 11), если он целиком расположен по одну сторону от каждой прямой, проходящей через две




Рис. 12

его соседние вершины. В противном случае многоугольник называется **невыпуклым** (рис. 12).

### Свойства:

- Сумма внутренних углов произвольного  $n$ -угольника равна  $180^\circ \cdot (n - 2)$ .

- Сумма внешних углов выпуклого  $n$ -угольника, взятых по одному при каждой вершине, равна  $360^\circ$ .

- В выпуклом  $n$ -угольнике из каждой вершины можно провести  $(n - 3)$  диагоналей, которые разбивают  $n$ -угольник на  $(n - 2)$  треугольников.

- В выпуклом  $n$ -угольнике число диагоналей равно  $\frac{1}{2}n(n - 3)$ .

### 3. Правильные многоугольники

Выпуклый многоугольник, у которого равны все углы и стороны, называется **правильным**.

#### Свойства:

- Каждый угол правильного  $n$ -угольника равен  $\alpha_n = \frac{180^\circ(n - 2)}{n}$ .

- Около правильного  $n$ -угольника можно описать окружность, и примот только одну.

- В правильный  $n$ -угольник можно вписать окружность, и примот только одну.

- Окружность, вписанная в правильный  $n$ -угольник, касается всех сторон  $n$ -угольника в их серединах.

- Центр окружности, описанной около правильного  $n$ -угольника, совпадает с центром окружности, вписанной в тот же  $n$ -угольник.

- Длина стороны правильного  $n$ -угольника, вписанного в окружность радиуса  $R$ , равна  $a = 2R \sin \frac{180^\circ}{n}$ .

- Длина стороны правильного  $n$ -угольника, описанного около окружности радиуса  $r$ , равна  $a = 2r \operatorname{tg} \frac{180^\circ}{n}$ .

### 4. Треугольник

Треугольником называется геометрическая фигура, состоящая из трех точек, не лежащих на одной прямой, и трех отрезков, последовательно соединяющих эти точки.




Рис. 13

Точки  $A$ ,  $B$ ,  $C$  — вершины  $\triangle ABC$ . Отрезки  $AB$ ,  $BC$  и  $AC$  — стороны,  $\angle A$ ,  $\angle B$  и  $\angle C$  — углы.

Стороны треугольника часто обозначают малыми буквами (рис. 13):

$$AB = c, BC = a, AC = b.$$

$$P = a + b + c \text{ — периметр треугольника.}$$

Треугольник, у которого все углы острые, называется **остроугольным** (рис. 13).

Треугольник, у которого угол прямой, называется **прямоугольным** (рис. 14).

Стороны, образующие прямой угол, называются **катетами** ( $a$  и  $b$ ), а сторона, лежащая против прямого угла, — **гипотенузой** ( $c$ ).

Треугольник с тупым углом называется **тупоугольным** (рис. 15).

Треугольник, у которого две стороны равны, называется **равнобедренным** (рис. 16).




Рис. 14




Рис. 15




Рис. 16




Рис. 17

#### Свойства равнобедренного треугольника:

- Углы при основании равны.
- Биссектриса, проведенная к основанию, является одновременно медианой и высотой.
- Высота, проведенная к основанию, является одновременно медианой и биссектрисой.

4. Медиана, проведенная к основанию, является одновременно высотой и биссектрисой.

**Внешним углом** треугольника называется угол, смежный с каким-нибудь углом этого треугольника (рис. 18).

$\angle CBD$  — внешний угол треугольника.

Внешний угол треугольника равен сумме двух углов треугольника, не смежных с ним (рис. 18):  $\angle CBD = \angle A + \angle C$ .

Отрезок, соединяющий середины двух сторон, называется **средней линией** треугольника (рис. 19).




Рис. 18




Рис. 19

#### 5. Признаки равенства треугольников

**I признак (признак равенства по двум сторонам и углу между ними)**

Если **две стороны и угол между ними** одного треугольника соответственно равны **двум сторонам и углу между ними** другого треугольника, то такие треугольники равны (рис. 20).

$$AB = A_1B_1, AC = A_1C_1, \angle A = \angle A_1.$$

**II признак (признак равенства по стороне и прилежащим к ней углам)**

Если **сторона и два прилежащих угла** одного треугольника соответственно равны **стороне и двум прилежащим к ней углам** другого треугольника, то такие треугольники равны (рис. 21).

$$AB = A_1B_1, \angle A = \angle A_1, \angle B = \angle B_1.$$

**III признак (признак равенства по трем сторонам)**

Если **три стороны** одного треугольника соответственно равны **трём сторонам** другого треугольника, то такие треугольники равны (рис. 22).

$$AB = A_1B_1, BC = B_1C_1, AC = A_1C_1.$$




Рис. 20




Рис. 21




Рис. 22

#### 6. Неравенства треугольника

Каждая сторона треугольника меньше суммы двух других сторон:

$$a < b + c, b < a + c, c < a + b.$$

#### 7. Определение вида треугольника по его сторонам

Пусть  $c$  — наибольшая сторона, тогда:

- если  $c^2 < a^2 + b^2$ , то треугольник остроугольный;
- если  $c^2 > a^2 + b^2$ , то треугольник тупоугольный;
- если  $c^2 = a^2 + b^2$ , то треугольник прямоугольный.

#### 8. Прямоугольные треугольники (некоторые свойства)

1) Сумма острых углов равна  $90^\circ$  (рис. 23).  $\angle A + \angle B = 90^\circ$ .




Рис. 23

2) Катет, лежащий против угла в  $30^\circ$ , равен половине гипотенузы (рис. 24).

$$a = \frac{1}{2}c.$$

3) Если катет равен половине гипотенузы, то угол, лежащий против этого катета, равен  $30^\circ$  (рис. 24).




Рис. 24

#### 9. Признаки равенства прямоугольных треугольников

1. Если **катеты** одного прямоугольного треугольника соответственно равны **катетам** другого, то такие треугольники равны (рис. 25).

$$AC = A_1C_1, BC = B_1C_1.$$




Рис. 25

2. Если **катет и прилежащий к нему острый угол** одного прямоугольного треугольника соответственно равны **катету и прилежащему к нему углу** другого, то такие треугольники равны (рис. 26).

$$AC = A_1C_1, \angle A = \angle A_1.$$

3. Если **гипотенуза и острый угол** одного прямоугольного треугольника




Рис. 26

соответственно равны гипотенузе и острому углу другого, то такие треугольники равны (рис. 27).

$$AB = A_1B_1, \angle A = \angle A_1.$$

4. Если гипотенуза и катет одного прямоугольного треугольника соответственно равны гипотенузе и катету другого, то такие треугольники равны (рис. 28).

$$AB = A_1B_1, AC = A_1C_1.$$




Рис. 27




Рис. 28

## 10. Четыре замечательные точки треугольника

С каждым треугольником связаны 4 точки:

- 1) точка пересечения медиан;
- 2) точка пересечения биссектрис;
- 3) точка пересечения высот (или их продолжений);
- 4) точка пересечения серединных перпендикуляров к сторонам.

Эти четыре точки называются **замечательными точками** треугольника.

**Высотой** треугольника называется длина перпендикуляра, опущенного из любой его вершины на противолежащую сторону или ее продолжение.

В **тупоугольном треугольнике** (рис. 29) две высоты падают на продолжение сторон и лежат вне треугольника, а третья внутри.

В **остроугольном треугольнике** (рис. 30) все три высоты лежат внутри треугольника.

В **прямоугольном треугольнике** катеты одновременно служат и высотами (рис. 31).






Рис. 29

Рис. 30

Рис. 31

Три высоты треугольника всегда пересекаются в одной точке, называемой **ортocентром**. В тупоугольном треугольнике ортоцентр лежит вне треугольника. В прямоугольном треугольнике он совпадает с вершиной прямого угла.

**Медианой** треугольника называется отрезок, соединяющий вершину треугольника с серединой противоположной стороны.

Три медианы треугольника пересекаются в одной точке, которая является центром тяжести треугольника (рис. 32).

Эта точка делит каждую медиану в отношении 2 : 1 (считая от соответствующей вершины).

**Биссектрисой** треугольника называется отрезок биссектрисы угла от вершины до противолежащей стороны.

Три биссектрисы треугольника пересекаются в одной точке, которая является центром вписанного круга (рис. 33).

Три перпендикуляра к сторонам треугольника, проведенные через их середины (рис. 34, 35, 36), пересекаются в одной точке, которая является центром описанной окружности.

В тупоугольном треугольнике (рис. 34) эта точка лежит **вне** треугольника, в остроугольном (рис. 35) — **внутри**, в прямоугольном — **на середине** гипотенузы.

Ортоцентр, центр тяжести, центр вписанной и описанной окружностей совпадают друг с другом только в **равностороннем** треугольнике.




Рис. 34




Рис. 35




Рис. 36

## 11. Произвольный треугольник

1) Свойство биссектрисы (рис. 37) внутреннего угла треугольника:

$$\frac{a}{b} = \frac{a_1}{b_1}.$$

2) Длина биссектрисы:

$$l_c = \sqrt{ab - a_1b_1}; \\ l_c = \frac{\sqrt{ab(a+b+c)(a+b-c)}}{a+b}.$$




Рис. 37

## 14. Теорема синусов

Во всяком треугольнике стороны относятся как синусы противолежащих углов:

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma} = 2R,$$

где  $R$  — радиус окружности, описанной около треугольника.

## 15. Теорема косинусов

Квадрат одной из сторон треугольника равен сумме квадратов двух других его сторон минус удвоенное произведение этих сторон на косинус угла между ними:

$$\begin{aligned} a^2 &= b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha, \\ b^2 &= c^2 + a^2 - 2ca \cos \beta, \\ c^2 &= a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma. \end{aligned}$$

## 16. Площадь треугольника

$$1) S = \frac{1}{2} ah_a;$$

$$2) S = \frac{1}{2} ab \sin \gamma;$$

$$3) S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$
 (формула Герона);

$$4) S = pr, \text{ где } p = \frac{1}{2}(a+b+c);$$

$$5) S = \frac{abc}{4R};$$

$$6) S = \frac{a^2 \sin B \sin C}{2 \sin A}.$$

## 17. Равносторонний (правильный) треугольник (рис. 40)

$$S = \frac{a^2 \sqrt{3}}{4}; a = R \sqrt{3} = 2r \sqrt{3};$$

$$R = \frac{a}{\sqrt{3}}; r = \frac{a}{2\sqrt{3}}; h = \frac{a\sqrt{3}}{2}.$$




Рис. 40

## 18. Подобные треугольники

Два треугольника называются **подобными**, если их углы соответственно равны и стороны одного треугольника пропорциональны сходственным сторонам другого (рис. 41).

$AB$  и  $A_1B_1$ ,  $BC$  и  $B_1C_1$ ,  $AC$  и  $A_1C_1$  — сходственные стороны.

Из подобия треугольников следует:

$$\angle A = \angle A_1, \angle B = \angle B_1, \angle C = \angle C_1.$$

$$\frac{AB}{A_1B_1} = \frac{BC}{B_1C_1} = \frac{CA}{C_1A_1} = k,$$

где  $k$  — коэффициент подобия.

Обозначение:  $\triangle ABC \sim \triangle A_1B_1C_1$ .

Если два треугольника подобны, то отношение их площадей равно  $k^2$ , т. е.  $S_{\triangle ABC} : S_{\triangle A_1B_1C_1} = k^2$ .




Рис. 41

## 19. Признаки подобия треугольников

**I признак:** если два угла одного треугольника соответственно равны двум углам другого, то такие треугольники подобны (рис. 42).

$$\angle A = \angle A_1, \angle B = \angle B_1.$$

**II признак:** если две стороны одного треугольника пропорциональны двум сторонам другого и углы, заключенные между ними, равны, то такие треугольники подобны (рис. 43).

$$\begin{aligned} \angle A &= \angle A_1, \\ \frac{AB}{A_1B_1} &= \frac{AC}{A_1C_1}. \end{aligned}$$




Рис. 42





Рис. 43

**III признак:** если три стороны одного треугольника пропорциональны трем сторонам другого, то такие треугольники подобны (рис. 44).

$$\frac{AB}{A_1B_1} = \frac{BC}{B_1C_1} = \frac{AC}{A_1C_1}.$$



Площади подобных фигур (в частности, многоугольников) пропорциональны квадратам их сходственных сторон.

В частности, площади кругов относятся как квадраты радиусов (или диаметров).




Рис. 45

## 20. Четырехугольник

**1. Произвольный выпуклый** ( $d_1$  и  $d_2$  — диагонали,  $\phi$  — угол между ними) (рис. 45).

$$S = \frac{1}{2} d_1 d_2 \sin \phi.$$

**2. Вписанный** (рис. 46).

$$\alpha + \gamma = \beta + \delta = 180^\circ.$$

В любом вписанном четырехугольнике сумма противоположных углов равна  $180^\circ$ . Верно и обратное.

$$ac + bd = d_1 d_2$$

(теорема Птолемея).

$$S = \sqrt{(p-a)(p-b)(p-c)(p-d)},$$

$$\text{где } p = \frac{1}{2}(a+b+c+d).$$

**3. Описанный.**

В любом описанном четырехугольнике суммы противоположных сторон равны (рис. 47).

$$a + c = b + d, \quad S = p \cdot r.$$




Рис. 46




Рис. 47

## 21. Параллелограмм

Параллелограммом называется четырехугольник, у которого противоположные стороны попарно параллельны (рис. 48).

$$AB \parallel DC, AD \parallel BC$$

( $a$  и  $b$  — смежные стороны;  $\alpha$  — угол между ними;  $h_a$  — высота, проведенная к стороне  $a$ ).

$d_1^2 + d_2^2 = 2(a^2 + b^2)$  — зависимость между сторонами и диагоналями;

$$S = a \cdot h_a = ab \sin \alpha = \frac{1}{2} d_1 d_2 \sin \phi — \text{площадь параллелограмма.}$$




Рис. 48

**Некоторые свойства:**

- В параллелограмме противоположные стороны и углы равны ( $AB = DC; AD = BC; \angle A = \angle C; \angle B = \angle D$ ).
- Диагонали параллелограмма в точке пересечения делятся пополам ( $AO = OC; BO = OD$ ).

3. Сумма углов, прилежащих к одной стороне, равна  $180^\circ$  ( $\angle A + \angle B = 180^\circ$  и т. д.).

4. Диагональ параллелограмма делит его на два равных треугольника ( $\triangle ADC = \triangle ABC$ ,  $\triangle ABD = \triangle BCD$ ).

5. Биссектриса угла параллелограмма отсекает от него равнобедренный треугольник (рис. 49).



Рис. 49

**Признаки параллелограмма (рис. 48)**

- Если в четырехугольнике две стороны равны и параллельны ( $AB = DC, AB \parallel CD$ ), то такой четырехугольник — параллелограмм.
- Если в четырехугольнике противоположные стороны попарно равны ( $AB = DC, AD = DC$ ), то такой четырехугольник — параллелограмм.
- Если в четырехугольнике противоположные углы попарно равны ( $\angle A = \angle C; \angle B = \angle D$ ), то такой четырехугольник — параллелограмм.
- Если в четырехугольнике диагонали пересекаются и в точке пересечения делятся пополам, то такой четырехугольник — параллелограмм.

**22. Трапеция**

$a$  и  $b$  — основания;  $h$  — высота;  $d_1$  и  $d_2$  — диагонали;  $\varphi$  — угол между ними (рис. 50).

Трапецией называется четырехугольник, у которого две стороны параллельны, а две не параллельны.

$AB \parallel DC, AB$  и  $DC$  — основания трапеции,  $AD$  и  $BC$  — боковые стороны.

Отрезок  $l$ , соединяющий середины боковых сторон, называется средней линией трапеции.

$$l = \frac{1}{2}(a + b) \text{ — длина средней линии трапеции.}$$

$$m \parallel a \parallel b, m = \frac{2ab}{a+b}.$$

$$\angle A + \angle D = 180^\circ; \angle B + \angle C = 180^\circ.$$

$$S = l \cdot h = \frac{1}{2}(a + b) \cdot h = \frac{1}{2}d_1 \cdot d_2 \sin \varphi \text{ — площадь трапеции.}$$




Рис. 50




Рис. 53




Рис. 54

**1. Равнобедренная трапеция**

Если у трапеции боковые стороны равны, то такая трапеция называется равнобедренной (рис. 51).

$$AD = BC.$$

В равнобедренной трапеции углы при основаниях равны ( $\angle A = \angle B; \angle C = \angle D$ ) и диагонали равны ( $AC = BD$ ).

$$AE = \frac{1}{2}(a - b).$$




Рис. 51




Рис. 52

**2. Прямоугольная трапеция**

Если в трапеции один из углов прямой, то такая трапеция называется прямоугольной (рис. 54).

$$\angle D = \angle C = 90^\circ.$$

$$BE = CD = h \text{ (высота трапеции).}$$

$$AE = a - b.$$

**23. Прямоугольник**

Прямоугольником называется параллелограмм, у которого все углы прямые (рис. 55).




Рис. 55

**1. Равнобедренная трапеция**

Прямоугольник обладает всеми свойствами параллелограмма. Кроме того, у прямоугольника диагонали равны.

Стороны прямоугольника одновременно являются и высотами.

$$d^2 = a^2 + b^2.$$

$$S = ab = \frac{1}{2}d^2 \sin \varphi.$$

**24. Ромб**

Ромбом называется параллелограмм, у которого все стороны равны (рис. 56).

Так как ромб является параллелограммом, то он обладает всеми его свойствами.

Кроме того, диагонали ромба взаимно перпендикулярны и являются биссектрисами его углов.

$$AC \perp BD.$$

$AC$  — биссектриса углов  $A$  и  $C$ ;  $BD$  — биссектриса углов  $B$  и  $D$ .

$$d_1^2 + d_2^2 = 4a^2.$$

$$S = a \cdot h_a = a^2 \sin \alpha = \frac{1}{2}d_1 \cdot d_2 \text{ — площадь ромба.}$$




Рис. 56

**25. Квадрат**

Квадратом называется прямоугольник, у которого все стороны равны (рис. 57).

Можно сказать, что квадрат — это ромб с прямым углом.

Квадрат обладает всеми свойствами прямоугольника и ромба.

**Основные свойства**

- У квадрата все углы прямые.
- У квадрата диагонали равны, взаимно перпендикулярны и являются биссектрисами его углов.




Рис. 57

**26. Окружность**

Окружностью называется геометрическое место точек плоскости, равноудаленных от одной ее точки (центра) (рис. 58).

Отрезок, соединяющий центр окружности с точкой на окружности, называется радиусом.




Рис. 58

**Обозначение:**  $r$  или  $R$ .  
На рисунке  $OC = OE = OD = R$ .

Часть окружности (например,  $CmD$ ) называется дугой.

Отрезок, соединяющий две точки окружности, называется хордой, а хорда, проходящая через центр, — диаметром.

$AB$ ,  $BC$ ,  $CD$  и  $CE$  — хорды окружности.  
 $CE$  — наибольшая из хорд — диаметр.

**Обозначение:**  $d$  или  $D$ .  
 $D = 2R$ .

Часть плоскости, ограниченная окружностью, называется кругом.

Часть круга, ограниченная дугой ( $CmD$ ) и стягивающей ее хордой ( $CD$ ), называется сегментом.

Часть круга, ограниченная двумя радиусами и дугой, называется сектором.

Угол, образованный двумя радиусами, называется центральным ( $\angle COD$  на рис. 58).

Угол, у которого вершина лежит на окружности, а стороны являются хордами, называется вписанным (например,  $\angle ABC$ ).

## 27. Свойства касательных к окружности




Рис. 59

Угол, образованный двумя касательными ( $CA$  и  $CB$ ), исходящими из одной точки, называется описанным ( $\angle ACB$  на рис. 59).

1. Радиус, проведенный в точку касания, перпендикулярен касательной.

2. Две касательные, проведенные к окружности из одной точки, равны, и центр окружности лежит на биссектрисе угла между ними.

## 28. Окружность и треугольник

1. Около всякого треугольника можно опи- сать окружность; центром окружности является точка пересечения перпендикуляров, проведенных к сторонам через их середины (рис. 60).

2. Во всякий треугольник можно вписать окружность; центром окружности является точка пересечения биссектрис (рис. 61).




Рис. 60




Рис. 61

## 29. Окружность и четырехугольник

1. Для того чтобы около четырехугольника можно было описать окружность, необходимо и достаточно, чтобы сумма противоположных углов была равна  $180^\circ$  (рис. 62).

$$\alpha + \beta = 180^\circ.$$

2. Для того чтобы в четырехугольник можно было вписать окружность, необходимо и достаточно, чтобы суммы противоположных сторон были равны (рис. 63).

$$a + c = b + d.$$




Рис. 62




Рис. 63

## 30. Углы и окружность

Центральный угол измеряется ду- гой, на которую он опирается (рис. 64).

$$\angle AOB = \cup AmB.$$

Вписанный угол измеряется поло-виной дуги, на которую он опирается (рис. 65).

$$\angle ABC = \frac{1}{2} \cup AmC.$$




Рис. 64




Рис. 65

Угол между хордой и касательной изме- ряется половиной дуги, заключенной внут- ри него (рис. 66).

$$\angle ABC = \frac{1}{2} \cup BmC.$$

Угол между двумя касательными изме- ряется полуразностью дуг (рис. 67).

$$\angle ABC = \frac{1}{2} (\cup AmC - \cup AnC).$$

Угол между двумя хордами измеряется полуразницей дуг, на которые он опирается (рис. 68).

$$\angle AEC = \frac{1}{2} (\cup AmC + \cup BnD).$$

Угол между секущими измеряется полу- разностью дуг между ними (рис. 69).

$$\angle ABC = \frac{1}{2} (\cup AmC - \cup EnD).$$

Угол между касательной и секущей из- меряется полуразностью отсекаемых ими дуг, прилежащих к касательной (рис. 70).

$$\angle ABC = \frac{1}{2} (\cup AmC - \cup CnD).$$




Рис. 66




Рис. 67




Рис. 68




Рис. 69




Рис. 70

### 31. Метрические соотношения в окружности

Если хорды  $AB$  и  $CD$  пересекаются в точке  $E$ , то произведение отрезков одной хорды равно произведению отрезков другой (рис. 71).

$$AE \cdot EB = CE \cdot ED.$$

Если из точки  $B$  к окружности проведены две секущие  $BDA$  и  $BEC$ , то

$$DB \cdot AB = EB \cdot CB$$
 (рис. 72).

Если из точки  $B$  к окружности проведены секущая  $BDA$  и касательная  $BC$ , то произведение секущей на ее внешнюю часть равно квадрату касательной (рис. 73).

$$AB \cdot DB = BC^2.$$




Рис. 71




Рис. 72




Рис. 73

### 32. Длина окружности. Площадь круга и его частей

$$C = 2\pi R = \pi D \text{ — длина окружности};$$

$$l = \frac{\pi R n^\circ}{180^\circ} = R\alpha \text{ — длина дуги окружности};$$

$$S_{\text{круг}} = \pi R^2 = \frac{1}{4} \pi D^2 = \frac{1}{2} CR \text{ — площадь круга};$$

$\pi = \frac{C}{D} \approx 3,14$  — отношение длины окружности к ее диаметру;

$$S_{\text{сект.}} = \frac{\pi R^2 n}{360} \text{ — площадь сектора.}$$




Рис. 74

### 33. Понятие вектора

Вектором называется направленный отрезок (рис. 75).

- Всякий вектор характеризуется:
- 1) начальной точкой;
  - 2) направлением;
  - 3) длиной (модулем).




Рис. 75

Длиной (модулем) ненулевого вектора  $\overrightarrow{AB}$  называется длина отрезка  $AB$  и обозначается  $|\overrightarrow{AB}|$  или  $|\vec{a}|$ .

### 34. Равенство векторов

Если ненулевые векторы лежат на одной прямой или параллельных прямых, то они называются коллинеарными (рис. 76).

Коллинеарные векторы:

$$\vec{a}, \vec{m}, \overrightarrow{CD}, \overrightarrow{KP}, \overrightarrow{AA} = \vec{0}.$$

Неколлинеарные векторы:

$$\overrightarrow{CD} \text{ и } \overrightarrow{ST}, \overrightarrow{KP} \text{ и } \overrightarrow{ST}.$$

Коллинеарные векторы называются сонаправленными, если они имеют одинаковые направления.

Например,  $\vec{a} \uparrow\uparrow \vec{m}$ ,  $\vec{a} \uparrow\uparrow \overrightarrow{KP}$ ,

$\vec{m} \uparrow\uparrow \overrightarrow{KP}$ .




Рис. 76

Коллинеарные векторы называются противоположно направленными, если они имеют разные направления.

Например,  $\vec{a}$  и  $\overrightarrow{CD}$ ,  $\vec{m}$  и  $\overrightarrow{CD}$ ,  $\overrightarrow{CD}$  и  $\overrightarrow{KP}$ .

Векторы называются равными, если они сонаправлены и их длины равны.

### 35. Координаты вектора

Пусть  $A(x_1; y_1)$  — начало вектора  $\vec{a}$ ,  $B(x_2; y_2)$  — конец вектора  $\vec{a}$  (рис. 75).

Координатами вектора  $\vec{a}$  называют числа  $a_1 = x_2 - x_1$ ,  $a_2 = y_2 - y_1$  и обозначают  $\vec{a}(a_1; a_2)$ .

Тогда абсолютная величина (модуль) вектора с координатами  $a_1$ ,  $a_2$  равна  $|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$ .

Если векторы равны, то у них равны соответствующие координаты. И обратно, если у векторов равны соответствующие координаты, то векторы равны.

### 36. Действия над векторами

#### 1. Сумма двух векторов.

Каковы бы ни были точки  $A$ ,  $B$ ,  $C$ , имеет место векторное равенство (рис. 77):

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} \text{ (правило треугольника),}$$

$$\text{или } \vec{a} + \vec{b} = \vec{c}.$$




Рис. 77

2. Векторы складываются геометрически по правилу параллелограмма (рис. 78): сумма двух векторов  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$ , имеющих общее начало, изображается диагональю параллелограмма, построенного на этих векторах.

3. Для векторов справедливы *переместительный* и *сочетательный* законы сложения:

$$\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a} \text{ и } \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}) = (\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c}.$$

4. Разностью векторов  $\vec{a}(a_1; a_2)$  и  $\vec{b}(b_1; b_2)$  называется такой вектор  $\vec{c}(c_1; c_2)$ , который в сумме с вектором  $\vec{b}$  дает вектор  $\vec{a}$ , т. е.

$$\vec{b} + \vec{c} = \vec{a} \text{ (рис. 79).}$$

#### 5. Умножение вектора на число.

Произведением вектора  $\vec{a}(a_1; a_2)$  на число  $k$  называется вектор  $k\vec{a}(ka_1; ka_2)$ .

Из определения следует, что:

- 1) произведение любого вектора на число нуль есть нулевой вектор;
- 2) для любого числа  $k$  и любого вектора  $\vec{a}$  векторы  $\vec{a}$  и  $k\vec{a}$  коллинеарны.

Основные свойства умножения вектора на число:

- 1)  $(kl)\vec{a} = k(l\vec{a})$  — сочетательный закон;
- 2)  $(k+l)\vec{a} = k\vec{a} + l\vec{a}$  — I распределительный закон;
- 3)  $k(\vec{a} + \vec{b}) = k\vec{a} + k\vec{b}$  — II распределительный закон.

### 37. Скалярное произведение векторов

Скалярным произведением двух векторов называется произведение их длин (модулей) на косинус угла между ними (рис. 80).

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \alpha.$$

- 1) Если  $\vec{a} \perp \vec{b}$ , то  $\alpha = 90^\circ$ ,  $\cos \alpha = 0$ , тогда  $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ .

Верно и обратное: если  $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ , то  $\vec{a} \perp \vec{b}$ .

- 2) Если  $\alpha < 90^\circ$ , то  $\vec{a} \cdot \vec{b} > 0$ ; если  $\alpha > 90^\circ$ , то  $\vec{a} \cdot \vec{b} < 0$ .
- 
- Рис. 80

### 38. Скалярное произведение в координатах

Если  $\vec{a}(x_1; y_1)$ ,  $\vec{b}(x_2; y_2)$ , то  $\vec{a} \cdot \vec{b} = x_1x_2 + y_1y_2$ .

**Следствие 1.**  $\vec{a} \perp \vec{b}$  тогда и только тогда, когда  $x_1x_2 + y_1y_2 = 0$ .

**Следствие 2.**  $\cos \alpha = \frac{x_1x_2 + y_1y_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2} \cdot \sqrt{x_2^2 + y_2^2}}$ , где  $\alpha$  — угол между ненулевыми векторами  $\vec{a}(x_1; y_1)$ ,  $\vec{b}(x_2; y_2)$ .

### 39. Свойства скалярного произведения векторов

- 1)  $\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2$ ;
- 2)  $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$  (переместительный закон);
- 3)  $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot \vec{c} + \vec{b} \cdot \vec{c}$  (распределительный закон);
- 4)  $(k\vec{a}) \cdot \vec{b} = k(\vec{a} \cdot \vec{b})$  (сочетательный закон).

### 40. Уравнение окружности




Рис. 81

Если центром окружности является начало координат (рис. 81), то уравнение окружности имеет вид

$$x^2 + y^2 = R^2.$$




Рис. 82

Если центр окружности  $M(x_0; y_0)$ , то уравнение окружности имеет вид (рис. 82)

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2.$$

### 41. Уравнение прямой

- 1) Любая прямая в декартовых координатах  $x$  и  $y$  задается уравнением вида  $ax + by + c = 0$ , где  $a$  и  $b$  — коэффициенты при неизвестных,  $c$  — свободный член.

- 2) Если  $a = 0$ ,  $b \neq 0$ , то  $y = -\frac{c}{b}$  — уравнение прямой, параллельной оси  $Ox$  (рис. 83).




Рис. 83

- 3) Если  $b = 0$ ,  $a \neq 0$ , то  $x = -\frac{c}{a}$  — уравнение прямой, параллельной оси  $Oy$  (рис. 84).




Рис. 84

- 4) Если  $c = 0$ ,  $a \neq 0$ ,  $b \neq 0$ , то  $ax + by = 0$  — уравнение прямой, проходящей через начало координат  $(0; 0)$  (рис. 85).




Рис. 85