

Образовательное бюджетное образовательного учреждения
Департамента здравоохранения города Москвы
«Медицинский колледж №1»

Курсовая работа на тему : Роль медицинской сестры в реабилитации после инсульта



Специальность :сестринское

дело

Форма обучения :

очная

Студент Слободчиков Юрий
Алексеевич

Курс III Группа С31

Руководитель :Кареевская Юлия
Анатольевна

Москва

Содержание



слайд 3

слайд 3

слайд 4

слайд

слайд

слайд

слайд 9

слайд 11

слайд

1. Введение

а) инсульт

б) Виды инсульта

1) Ишемический инсульт

5

2) Геморрагический инсульт

6

2. Первые признаки инсульта у взрослого человека

слайд 7

3. воздействием неблагоприятных факторов

8

4. Как распознать инсульт

5. Первая помощь

6. Роль медицинской сестры в

реабилитационных мероприятиях

12

Введение

Инсульт — это острое нарушение мозгового кровообращения, приводящее к стойкому очаговому поражению головного мозга. Может носить ишемический или геморрагический характер. Патология сопровождается острым нарушением мозгового кровообращения, поражением сосудов и ЦНС. При нарушении нормального кровотока ухудшается питание нервных клеток головного мозга, а это весьма опасно, поскольку орган работает за счет постоянного поступления к нему кислорода и ГЛЮКОЗЫ



вида инсульта

Ишемический инсульт

Геморрагический инсульт

Существует 2 основных вида инсульта:

ишемический и геморрагический. Они имеют принципиально разный механизм развития и нуждаются в кардинально отличающихся подходах к лечению. Ишемический и геморрагический инсульт занимают соответственно 80% и 20% от общей совокупности.



Ишемический инсульт

Ишемическое поражение головного мозга встречается в 8 случаях из 10. Преимущественно им страдают люди преклонного возраста, после 60 лет, чаще – мужчины. Основная причина – это закупорка сосудов или их длительный спазм, что влечет за собой прекращение кровоснабжения и кислородное голодание. Это ведет к отмиранию клеток мозга.



Геморрагический инсульт

Что это? Геморрагический инсульт – результат кровоизлияния в вещество головного мозга после повреждения стенок сосуда. Нарушение функциональной активности и гибель нейроцитов при этом в основном происходит вследствие их сдавливания гематомой.



Первые признаки инсульта у

взрослого человека

Признаки инсульта следует знать всем людям, независимо от наличия медицинского образования. Эти симптомы, в первую очередь, связаны с нарушением иннервации мышц головы и тела, поэтому при подозрении на инсульт попросите человека выполнить три простых действия: улыбнуться, поднять руки, сказать любое слово или предложение.

У человека, внезапно почувствовавшего «дурноту», можно предположить сосудистые проблемы по следующим признакам, которые можно принять за первые признаки инсульта:

Онемение участков тела (лицо, конечности);

Головная боль;

Потеря контроля над окружающей обстановкой;

Двоение в глазах и другие нарушения зрения;

Тошнота, рвота, головокружение;

Патология развивается, как осложнение основного заболевания сердца и сосудов, а также под воздействием неблагоприятных факторов:

- атеросклероз сосудов головного мозга;
- тромбоэмболия;
- гипертония (артериальная гипертензия);
- ревматические поражения сердца;
- инфаркт миокарда;
- операции на сердце;
- постоянный стресс;
- сосудистые опухоли;
- прием некоторых видов наркотических средств;
- алкоголизм;
- курение;
- аневризма мозговой артерии.

Как распознать инсульт

Лицо

Лицо выглядит необычно?

Попросите больного улыбнуться



Рука

Одна рука падает вниз?


Попросите больного поднять обе руки



Речь

Речь звучит странно?

Попросите больного повторить фразу



Время

Счет идет на минуты!

Скорее вызывайте помощь!

ИНСУЛЬТ МОЖЕТ КОСНУТЬСЯ КАЖДОГО

Запомните простой тест,
который поможет его распознать и вызвать вовремя
«скорую»




Не может улыбнуться?
Уголок рта опущен?



Не может поднять обе руки?
Одна ослабла?



Не может разборчиво
произнести свое имя?



У врачей есть только 4,5 часа
чтобы спасти жизнь больного.

Первая помощь

При инсульте кровоизлияние в мозг требует незамедлительной реакции на его возникновения, поэтому после наступления первых же симптомов, нужно выполнить

1. уложите больного таким образом, чтобы его голова была приподнята примерно на 30° .
2. Если больной потерял сознание и оказался на полу, переместите его в более удобное положение.
3. Если у больного есть предпосылки к рвоте, поверните его голову на бок, чтобы рвотные массы не попали в органы дыхания.

- 5. Необходимо понимать то, как меняется у больного человека пульс и артериального давления. При возможности нужно проверить эти показатели и запомнить их.

6 Когда приедет бригада скорой помощи, врачам необходимо указать, как начались проблемы, насколько стал хуже себя чувствовать и выглядеть больной, а также какие таблетки он принимал.

Роль медицинской сестры в Реабилитационных мероприятиях:

- ▣ проводятся с самого начала инсульта и продолжаются при сохранении неврологического дефицита на протяжении всей жизни при участии больного, команды медработников и родственников;
- ▣ правильный уход за телом больного, использование специальных приспособлений;

- ▣ дыхательная гимнастика (для профилактики пневмоний);
- ▣ как можно более ранняя активизация двигательного режима больного, начиная от непродолжительных присаживаний в кровати до полноценной лечебной физкультуры;
- ▣ применение различных физиотерапевтических и других методов: электропроцедуры, массаж, акупунктура, занятия с логопедом.

**Спасибо за
внимание**

Интернет источник

- <http://simptomu-i-lechenie.net/insult/>
- http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/za-bolevanija_neurology/insult