



TEMA:

PROFILAXIA TUMORILOR LA COPII ȘI
ADOLESCENȚI, REABILITAREA
POSTOPERATORIE A
COPILOR ȘI ADOLESCENȚILOR CU
NEOFORMAȚIUNI TUMORALE ALE
REGIUNII OROMAXILOFACIALE.

Autor: Guțu Vadim, medic rezident anul II, fac. Parodontologie.

PROFILAXIA TUMORILOR

- Orientarea profilactică în stomatologie este „un principiu de bază a stomatologie care are menirea de a reduce considerabil prevalența principalelor boli buco-dentare și a nevoilor de tratamente stomatologice, de a depista și trata cât mai precoce leziunile și bolile buco-dentare și maxilo-faciale, de a preveni accidentele și complicațiile.
- **Profilaxia** bolii reprezintă strategia de reducere a factorilor de risc specifici unei maladii, sau de întărire a factorilor care reduc susceptibilitatea la boală, precum și activitățile destinate unor boli deja instalate.

Strategia stomatologiei preventive este complexă și cuprinde:

profilaxia primară;

secundară;

terțiară.

PROFILAXIA PRIMARĂ

Profilaxia primară are drept scop evitarea apariției maladiilor și vizează pe de o parte creșterea rezistenței țesuturilor cavității bucale la acțiunea factorilor nocivi și pe de altă parte – eliminarea factorilor cu rol determinant sau favorizant în declanșarea afecțiunilor stomatologice.

În cadrul profilaxiei primare trebuie să evităm apariția bolilor prin:

- educație sanitară;
- alimentație corectă;
- raționalizarea consumului de zahăr;
- igienă buco-dentară corectă;
- control periodic;
- profilaxia cu fluor;
- utilizarea agenților chimici de inhibare a plăcii bacteriene ș.a.



!!! Toate aceste mijloace se adresează tuturor membrilor colectivității

PROFILAXIA PRIMARĂ A TUMORILOR DIN SFERA O.M.F.:

- eliminarea factorilor majori de risc (tutun, alcooluri distilate);
- suprimarea iritațiilor cronice: margini ascutite ale dinților cariați, obturații debordante, lucrări protetice traumatizante.

Studii recente arată că 1/3 din cancerele bucale ar putea fi prevenite prin profilaxie primară



PROFILAXIA SECUNDARĂ

- **Profilaxia secundară urmărește:**

Depistarea și diagnosticul precoce al leziunilor precursorare ale malignității și a leziunilor de debut ale cancerului bucal. Prevenirea cancerului bucal este considerată de OMS obiectiv prioritar al stomatologiei. Prin profilaxia secundară a cancerului bucal, încă o treime din cancerele cu aceste localizări pot fi salvate. Orice leziune ulcerativă care nu are tendință de vindecare spontană, sau în urma unui tratament în decurs de 14-21 zile, necesită consultația de urgență la medicul specialist.



PROFILAXIA TERȚIARĂ

- **Profilaxia terțiară** se referă la concepția preventivă în cadrul tratamentului curativ, deci când afecțiunile stomatologice sunt deja instalate și sunt în fază avansată în cadrul evoluției lor.

Aceasta include în esență:

- ansamblul tehnicilor profilactice, studiul și analiza mijloacelor, a locurilor de aplicare și a personalului;
- educația sanitară, depistarea, supravegherea și controlul aplicării mijloacelor de profilaxie;
- analiza educației sanitare;
- corelația între receptarea informației și aplicarea ei.

OMS recomandă drept cerințe obligatorii pentru medici în general - competența și îndemânarea. Acestea, dublate de conștiinciozitate și de o înaltă conduită etică, sunt condițiile esențiale pentru o medicină stomatologică moderă, orientată profilactic.

REABILITAREA POSTOPERATORIE A COPILOR ȘI ADOLESCENȚILOR CU NEOFORMAȚIUNI TUMORALE

- Reabilitarea bolnavilor cu neoformațiuni tumorale este un complex de măsuri medicale, sociale, psihologice și profesionale în vederea atingerii scopului maxim în activitatea funcțională.



REABILITAREA MEDICALĂ

- Reabilitarea medicală are scopul de a restabili relieful anatomic al părților moi sau antrenarea complexă funcțională a tulburărilor de fonație, masticăție, deglutiție, respirație și a stării psihologice a bolnavului în dezvoltarea mecanismelor compensatorii pe cale chirurgiei plastice, tratamentelor ortopedice, ortodontice, medicamentos.
- Evidența postoperatorie a bolnavilor va fi preluată de asistența ortodontică, protetică, chirurgicală pentru prevenirea recidivelor și dezvoltarea armonioasă a copiilor.

REABILITAREA PSIHOLOGICĂ

- Reabilitarea psihologică începe imediat după suspectarea și stabilirea diagnosticului de tumoră și durează pe tot parcursul vieții. Luând în considerație faptul că copiii vor deveni maturi, ei sunt pregătiți pentru integrarea în societate și activitatea de muncă.

REABILITAREA SOCIALĂ

- Reabilitarea socială se practică în perioada adolescenței și are drept scop alegerea rațională a profesiei, angajarea în câmpul muncii și realizarea lor ca personalitate. În acest scop sunt practicate complexul de intervenții de reabilitare de către oncolog, ortodont, logoped, pediatru, pedagogi și personalul medical din instituțiile de învățământ.
- Defectele postoperatorii în regiunea oro-maxilo-facială sunt rezolvate pe cale chirurgicală sau ortodontică imediat după înlăturarea tumorii.

The background is a gradient of blue, transitioning from a lighter shade at the top to a darker shade at the bottom. In the four corners, there are decorative white line-art patterns that resemble circuit traces or neural network connections, with small circles at the end of the lines.

Vă mulțumesc pentru atenție