




# Острый живот

Подготовила студентка 452 группы Грабовская Юлия


# Понятие острого живота




**Острый живот** — представляет собой симптомокомплекс, отражающий патологическое состояние организма, при котором произошло серьёзное повреждение органов брюшной полости с раздражением брюшины. Характеризуется резкими кинжальными болями в животе и патологическим напряжением брюшной стенки.

# Причины острого живота

## **1. Острые желудочно-кишечные кровотечения:**

- кровоточащая язва желудка или двенадцатиперстной кишки;
  - варикозное расширение вен пищевода и кардии;
  - геморрагический гастрит;
  - злокачественные и доброкачественные опухоли желудка, тонкой и толстой кишки;
  - аноректальные кровотечения.
- 

## 2. Внутрибрюшинные воспалительные заболевания, требующие неотложной операции:



- аппендицит и его осложнения;
- механическая острая непроходимость кишечника со странгуляцией брыжейки или без нее;
- острый деструктивный холецистит;
- перфорация язвы, дивертикула толстой кишки и других полых органов;
- эмболия или тромбоз мезентериальных сосудов;




**3. Проникающие ранения и тупые травмы живота с повреждением органов брюшной полости.**


**4. Заболевания органов брюшной полости, не требующие неотложной операции:**

- желудочно-кишечные (гастроэнтерит, острый холецистит и печеночная колика, гепатит);
- гинекологические (сальпингит, дисменорея, боли внизу живота в середине менструального цикла);
- почечные (почечная колика, пиелонефрит, инфаркт почки).

## **5. Экстраабдоминальные (внебрюшинные) заболевания:**

- сердечно-сосудистые (инфаркт миокарда, расслаивающая аневризма аорты, перикардит);
  - плеврорегочные (пневмония, плеврит, эмболия легочной артерии);
  - урогенитальные (острая задержка мочи, заворот яичника);
  - неврологические (грыжа Шморля, или межпозвонкового диска);
  - прочие (диабетическая и уремическая комы, гемолитические и лейкоемические кризы).
- 

# Основные симптомы

- **Боль** с различным характером, которая возникает внезапно и распространяется по всему животу или локализуясь в его определенных отделах.
  - **Рвота.**
  - **Задержка газов и отсутствие стула.**
  - **Защитное мышечное напряжение передней брюшной стенки.**
- 

# Дополнительные симптомы

1. Выражение лица страдальческое, осунувшиеся, заостренные черты лица (лицо Гиппократата).
2. Сухость во рту,
3. дыхание несвободное, так как больной щадит живот, потому что глубокие вдохи усиливают боль.
4. Тахикардия.
5. Слабость и озноб.



# Первая помощь:

1. При возникновении симптомов «острого живота» прежде всего надо срочно вызвать «скорую помощь».



2. Человек с состоянием «острого живота» сам принимает оптимальную, вынужденную позу, для уменьшения болей («поза эмбриона»). До приезда Скорой помощи желательно находится в положении лежа.



3. Холод на живот. Это может быть лед из холодильника, завернутый в пакет и ткань, резиновая грелка с холодной водой.

Прикладывать холод на живот следует в течение 15 минут, заменяя его, по мере необходимости, до приезда врача.



# Категорически не рекомендуется:

1. Использовать грелку для снятия болей.
  2. Принимать антибиотики, слабительные и обезболивающие средства, алкоголь.
  3. Ставить очистительную клизму, пить и есть.
- ▣ При шоке больному во время транспортировки в специализированной машине необходимо проводить противошоковые мероприятия.