

Кормление птицы

Рацион для бройлеров

- Кормить цыплят-бройлеров можно двумя способами: покупными специальными комбикормами, разработанными по возрастной системе, а также обычным зерном с витаминными и минеральными добавками. Такие комбикорма делятся на три группы:
- Стартовый – это первичный корм для выращивания цыплят, который содержит повышенное количество белка (строительный материал). Такую смесь используют с момента вылупления цыплят.
- Откормочный – это ростовой рацион для птицы, который обеспечивает максимальное накопление мышечной ткани. Также, он способствует формированию и физиологическому созреванию белковой ткани цыпленка.
- Финишный – корм, разработанный для кормления взрослых бройлеров. В этой смеси содержится уже незначительное количество белка, но имеется много витаминов и минералов.

- Бройлеров кормят вволю много раз:
- В первую неделю — 8 раз;
- Вторая – 6 раз;
- Третья – 4 раза;
- С месяца – 2 раза утром и вечером.

- **Минеральные добавки**

- Мел, ракушка измельченная, костная мука

- Их дают по 3 грамм на одну особь с 5-дневного возраста.

- Также с первой недели жизни в отдельную кормушку нужно насыпать мелкий гравий (3-5 мм).

- Нельзя давать песок.

- **Витамины**

- Организм бройлеров крайне восприимчив к нехватке витаминов. Поэтому дают специальные витаминные добавки или, так называемый, тривитамин.
- Например, с 5-го дня в корм нужно вводить витамин А и Е.
- Потом обычно готовят масляный раствор с витамином А, Е и Д2. Для этого на пол литра растительного масла добавляют по 10 мл каждого витамина.
- Хранить такую смесь нужно в холодильнике и давать два раза в неделю по чайной ложке на 1 килограмм корма.

- **Овощи**

- Овощи являются отличным источником дополнительной клетчатки и витаминов для бройлеров. Особенно важна цыплятам морковь. Ее следует вводить в мешанки с 5-дневного возраста в измельченном виде. Примерно 5 грамм на одну особь. Свекла и капуста также полезны, их можно давать в сыром измельченном виде. А вот картофель только вареный и мятый.

Нормы кормления для цыплят и бройлеров

Показатель	Ед.изм.	Стартер для цыплят	Доращивание цыплят	Откорм бройлеров	Начало откорма (до 4 недель)	Конец откорма
Сырой протеин	%	22	18	22	23	22
Обменная энергия	МДж/кг	11,5	11,3	12,5	12,5	13,0
Сырая клетчатка	макс %	3	5	3	3	3
Сырая зола	макс %	7	7	7	7	7
Кальций	%	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Фосфор	%	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Натрий	%	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Метионин	%	0,50	0,45	0,5	0,50	0,45
Метионин+Цистин	%	0,85	0,8	0,85	0,85	0,80
Лизин	%	1,1	0,9	1,1	1,2	1,1
Ксантофил	мг/кг	—	—	15	15	25
Кокцидиостатик *		+	+	+	+	
Стимулятор роста		+	+	+	+	+