



ЯДОВИТЫЕ РАСТЕНИЯ

**Подготовил руководитель кружка
Митич Н.В.**

□ **Цели:** формирование основ безопасного поведения в природе

Задачи:

- познакомить детей с ядовитыми растениями;
- познакомить с правилами безопасного взаимодействия с ядовитыми растениями;
- развивать чувство осторожности;
- формировать общие представления детей о значении ядовитых растений и об их опасностях;
- воспитывать чувство ответственности к своему здоровью.



□ **Ядовитые растения** – это растения, вырабатывающие и накапливающие в процессе жизнедеятельности яды, вызывающие отравления животных и человека.

Внимание опасность! «Ядовитые растения»



1. **Болиголов**
2. **Цикута (вех)**
3. **Белладонна**
4. **Кукольник**
5. **Лютик едкий**

6. **Багульник**
7. **Волчье лыко**
8. **Белокрыльник**
9. **Аконит**

БЕЛЕНА ЧЕРНАЯ



ПРИЗНАКИ ОТРАВЛЕНИЯ

- Появляются спустя 30-60 мин. После употребления семян. Лицо и шея краснеют. Обильное слюноотечение сменяется резкой сухостью во рту. Иногда возникают тошнота и рвота. Судороги рук и ног. Возбужденное состояние, возникают галлюцинации.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

- Промывание желудка раствором поваренной соли (1ст. ложка на 5л. воды), активированный уголь с последующим промыванием желудка слабым раствором перманганата калия.



ДУРМАН ОБЫКНОВЕННЫЙ



ПРИЗНАКИ ОТРАВЛЕНИЯ

- Появляются спустя 30-60 мин. После употребления семян. Лицо и шея краснеют. Обильное слюноотечение сменяется резкой сухостью во рту. Иногда возникают тошнота и рвота. Судороги рук и ног. Возбужденное состояние, возникают галлюцинации



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

- Промывание желудка раствором поваренной соли (1ст. ложка на 5л. воды), активированный уголь с последующим промыванием желудка слабым раствором перманганата калия.



ВОЛЧЬЕ ЛЫКО



ПРИЗНАКИ ОТРАВЛЕНИЯ

- При попадании ягод или сока в желудок: жжение во рту и глотке, затруднение глотания, слюнотечение, боли в желудке, понос, рвота. В моче может появиться кровь. Сок, попавший на кожу, может вызвать боль, красноту, отек и даже пузыри и язвы.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

- Промывание желудка, прием водной взвеси активированного угля, обволакивающих средств. Кожу промывают водой и раствором перманганата калия.



ЛАНДЫШ МАЙСКИЙ



ПРИЗНАКИ ОТРАВЛЕНИЯ

- Легкая степень отравления проявляется тошнотой, рвотой, поносом, сильной головной болью и болью в желудке. В тяжелых случаях нарушается ритм и частота сердечных сокращений, пульс становится редким. Может наступить смерть в результате остановки сердца.




ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

Промывание желудка водной взвесью активированного угля или 0,5% раствором танина. При рвоте – глотание мелких кусочков льда



ВОРОНИЙ ГЛАЗ



ПРИЗНАКИ ОТРАВЛЕНИЯ

- ▣ Ягоды оказывают действие на сердце. Нарушается ритм и частота сердечных сокращений. Листья влияют на нервную систему: расстройство зрения, судороги, потеря сознания. Корневища вызывают рвоту.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

Промывание желудка водной взвесью активированного угля или 0,5% раствором танина. При рвоте – глотание мелких кусочков льда.



ЧИСТОТЕЛ БОЛЬШОЙ



ПРИЗНАКИ ОТРАВЛЕНИЯ

- Тошнота
- Рвота
- Понос
- Боли в животе
- Судороги
- Паралич дыхательного центра.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

- Промывание желудка 0,1% раствором перманганата калия.
- Слабительные средства.



ПАСЛЕН СЛАДКО-ГОРЬКИЙ



ПРИЗНАКИ ОТРАВЛЕНИЯ

- Учащение пульса
- Одышка
- Боль в животе
- Тошнота
- Понос
- Потеря сознания



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

- Промыть желудок и дать слабительное.
- Если без сознания: уложить на бок, чтобы не запал язык и не наступило удушье.
- Вызвать скорую помощь.



ВЕХ ЯДОВИТЫЙ



ПРИЗНАКИ ОТРАВЛЕНИЯ

- Частая рвота
- Обильное слюна выделение
- Головокружение
- Кожа бледнеет
- Зрачки сильно расширяются
- Сердечная деятельность и дыхание расстраиваются.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

- Промывание желудка слабым раствором перманганата калия.
- Очистительные клизмы.



КРАСАВКА, ИЛИ БЕЛЛАДОННА



ПРИЗНАКИ ОТРАВЛЕНИЯ

- Повышается температура тела
- Расширяются зрачки
- Покраснение лица и глазных яблок
- Головная боль
- Головокружение
- Тошнота



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

- Промыть желудок: выпить 2-3 стакана воды, а еще лучше крепко заваренного чая. Вызвать рвоту.
- Если человек испытывает боль в сердце, следует принять сердечные капли или положить под язык таблетку валидола



□ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

