



Кератиты

Периферический язвенный кератит





Периферический катаральный кератит

- Лечение:

1. Композитные капли – антибиотик+стероид 4 раза в день
2. Искусственные слезы 4 раза в день
3. Гигиена век и теплые компрессы
4. Доксициклин по 100 мг 2 раза в день 7 дней далее по 100 мг один раз 3 недели

Центральная бактериальная язва роговицы





Центральная бактериальная язва роговицы

● Лечение:

1. Тяжелая язва – цефазолин (50 мг\мл)+гентамицин (14 мг\мл) каждый час 24-36 часов
2. Среднетяжелая язва – левофлоксацин или моксифлоксацин в доступной концентрации каждый час 24-36 часов
3. Мидриатики 2-3 раза в день
4. Инъекции а\б – в особых случаях)))
5. Системно антибиотики – при переходе на склеру, угрозе перфорации, специф. Инфекциях, проникающее ранение!!!

Поверхностный герпетический кератит




Поверхностный герпетический кератит

- Лечение:

1. Мазь ацикловир 3% 5 раз в день
2. Ацикловир внутрь по 400-800 мг 5 раз в день
3. ЛЮБОЙ противовирусный препарат 8 раз в день
(идоксиуридин, интерфероны, трифлуридин)
4. Мидриатики 2 раза в день


Стромальный герпетический кератит



Стромальный герпетический кератит

- Дексаметазон 0,1% каждые 2 часа!!!
- Ацикловир по 400 мг 2 раза в день
- Циклоплегика 2 раза в день



Кератит, связанный с *Varicella Zoster*



Кератит, связанный с *Varicella* *Zoster*

- Ацикловир 800 мг 5 раз в день, валацикловир 1000 мг 3 раза в день, фамцикловир 125 мг 4 раз в день
- Внутривенное введение этих же препаратов
- При выраженной язве тарзорофия, пластика конъюнктивой

Грибковый кератит




Грибковый кератит

- Лечение:

1. Натамицин 5%, амфотерицин В 0,15% каждый час длительно
2. Внутрь кетоконазол, итраконазол, флюконазол, миконазол по 200-400 мг 2 раза в день

Акантамебный кератит



Акантамебный кератит

- Лечение:

1. Снятие эпителия над очагом для лучшего проникновения лекарств!!!
2. Один из следующих препаратов – пропамидин 0,1%, хлогексидин 0,02%, полигексаметилен бигуанид 0,02%, неомицин-полимиксин В-грамицидин...
3. Кетоконазол по 400 мг в день
4. НПВС формы для местного применения

Кератоконус




- Начало: пубертат – 30-40 лет
- Прогрессирующий миопический астигматизм
- Невозможность использования жестких контактных линз (ЖКЛ)
- Отсутствие признаков воспаления

Лечение:

1. Оптическая коррекция
2. Бандажные КЛ
3. Интрастромальные сегменты
4. Кератопластика

Острая водянка роговицы



- Резкое снижение остроты зрения
- Выраженный дискомфорт в глазу
- Слезотечение
- Блефароспазм

Лечение:

1. Повязка
2. Инстилляции гипертонических растворов и циклоплегиков
3. Контроль ВГД!



Дистрофии и дегенерации роговицы



Лентовидная
кератопатия

1. Хронические заболевания глаз
2. Первичная лентовидная кератопатия
3. Гиперкальциемические состояния
4. Системные заболевания