

Государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«ПЕРВЫЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

МЕДИЦИНСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.П. ПАВЛОВА

Кафедра иммунологии

# «Приобретенные (вторичные) иммунодефициты»

Цикл 2 - клиническая  
иммунология  
Занятие № 4

# Фронтальный опрос -вопросы

1. Дайте определение понятию «вторичная иммунологическая недостаточность».
2. Назовите основные причины ВИД.
3. Что такое «физиологическая» ВИД?
4. Назовите основные показатели клеточного и гуморального звена врожденного иммунитета, оцениваемые в иммунограмме.
5. Назовите основные показатели Т клеточного звена, оцениваемые в иммунограмме.
6. Назовите основные показатели В клеточного звена, оцениваемые в иммунограмме.
7. Какие клетки и гуморальные факторы участвуют в защите против внеклеточных бактерий?
8. Какие клетки и гуморальные факторы участвуют в защите против внеклеточных и какие - против внутриклеточных бактерий?
9. Какие клетки и гуморальные факторы участвуют в защите против вирусов?
10. Какие клетки и гуморальные факторы участвуют в противоопухолевой защите?

# Последствия дисрегуляции иммунного ответа

Недостаточность  
контроля  
аутоиммунных  
реакций



Аутоиммунн  
ые  
заболевани  
я

Недостаточность  
иммунного  
ответа



Иммунодефи  
циты

Недостаточность  
контроля  
пролиферации  
лимфоцитов



Злокачественн  
ые  
лимфопролифе  
ра  
тивные  
заболевания

## ВИД – это не нозологическая форма

ВИД - это клинико-патогенетическая характеристика транзиторных (в большинстве случаев) нарушений иммунной системы как у детей, так и у взрослых, не связанных с генетическими дефектами иммунной системы.

Следует помнить, что: транзиторные изменения параметров иммунной системы возможны у практически здоровых лиц, их выявление не всегда свидетельствует о наличии ВИД.

# Основные признаки развития ВИД

- Отсутствие генетического дефекта.
- Возникновение ИД на фоне ранее нормально функционировавшей иммунной системы.
  - Исчезновение возникших нарушений иммунной системы после устранения причины.
- Наличие некоторых клинических проявлений ИД у больного в виде очагов хронической инфекции в разных органах и системах.
- Изменения иммунологических показателей носят не постоянный характер, могут отмечаться в разных звеньях .
  - Возможность достижения клинико-иммунологического эффекта при проведении адекватной терапии или спонтанное выздоровление.


# Физиологические иммунодефицитные состояния

«Физиологические» ИД проявляются на определенном этапе жизненного цикла человека и связаны с объективными причинами:

## 1. Возраст:

- Ранний детский.
- Подростковый.
- Старческий.

## 2. Беременность.



# Иммунологический анамнез

Иммунологический анамнез отличается от других видов анамнеза своими **целями и задачами.**

**Целью иммунологического анамнеза является:**

- попытка установить наличие нарушений иммунной системы у конкретного больного.
- выявить – врождённый или приобретённый характер этих нарушений.
- дать ориентировочную оценку нарушений в отдельных звеньях иммунной системы.

# Сбор иммунологического анамнеза:



# Задачи иммунологического анамнеза

- Выявление возможной **причины** (либо нескольких причин) развития ИД.
- Установление **времени возникновения ИД**.
  - Сбор данных о перенесенных ранее заболеваниях и их анализ с позиции **«болезней-масок»**, что дает возможность **предположить нарушения в том или ином звене иммунной системы**.

- Анализ семейного анамнеза и выяснение иммунопатологии **у родственников** (злокачественные, аутоиммунные, аллергические, хронические гнойно-воспалительные и иные заболевания).
- **Оценка эффективности ранее применявшейся иммунотерапии**.

# «Болезни-маски» ВИД при нарушениях гуморального иммунитета

- Генерализованные бактериальные инфекции (сепсис, менингит).
- Рецидивирующие и хронические бактериальные инфекции ЛОР-органов (синуситы, отиты).
- Повторные бактериальные поражения органов дыхания: пневмонии, плевриты, бронхоэктатическая болезнь.
- Хронические бактериальные инфекции кожи и подкожной клетчатки (фурункулы, абсцессы, пиодермии, флегмоны, парапроктиты и т.д.).
- Другие хронические бактериальные очаги органов и систем (мочевыделительная, желудочно-кишечная и др.).

## «Болезни-маски» ВИД при нарушениях преимущественно Т –клеточного звена иммунитета

- Грибковые заболевания кожи, слизистых оболочек, в том числе системные формы (кандидозы, аспергиллезы).
- Паразитарные инвазии.
- Хронические вирусные инфекции (герпес, ЦМВ, ВЭБ).

- Туберкулез.
- Аутоиммунные заболевания.
- Онкопатология, лимфопролиферативные заболевания.
- Частые ОРВИ (более 6 раз в год).

# «Болезни-маски» ВИД при нарушениях фагоцитарного звена (врожденный иммунитет)

- Фурункулы, карбункулы, абсцессы.
- Повторные ангины, фарингиты, тонзиллиты


- Другие хронические локализованные очаги поражения (хронический пиелонефрит, аднексит, гайморит, отит и др.).

# Перечень возможных причин ВИД



- Заболевания – онкологические, аутоиммунные, инфекционные (в том числе ВИЧ-инфекция).
- Травмы, ожоги, операции, наркоз.
  - Внешние факторы – ионизирующая радиация, токсические вещества, в том числе алкоголь, ядохимикаты.
- Лекарственные препараты - цитостатики, глюкокортикоиды.
- Нарушение питания - белково-энергетическая неполноценность, дефицит витаминов, микроэлементов (цинка, селена и др.).
- Вредные факторы производственной среды.
  - Стресс.

# Важнейшие факторы, оказывающие влияние на иммунную систему






# Сбалансированное питание (белки) + состояние слизистой ЖКТ



# Наиболее распространённые причины вторичных иммунодефицитов у пожилых

- Старение иммунной системы -перерождение тимуса, снижение активности Т-лимфоцитов
- Старение организма в целом (замедление обмена веществ).
- Перенесенные инфекции (вирус Эпштейн-Барр и др.).
- Возрастные изменения в работе гормональной и центральной нервной систем.
- Нарушение работы ЖКТ.
  - Стрессы.
  - Психические расстройства.
- Несбалансированное питание.
  - Авитаминозы.
  - Полиморбидность.
- Результаты лечения различных хронических заболеваний.
  - Опухоли /химиотерапия/.

# Иммунная система новорожденных: физиологический иммунодефицит врожденного иммунитета



Показатели снижены:  
(по сравнению со взрослыми)

- Снижен уровень компонентов системы комплемента (С3).
  - Снижены уровни IgM.
- Физиологическая незрелость лейкоцитов новорожденных :
  - снижен хемотаксис нейтрофилов,
  - снижена поглотительная способность фагоцитов,
  - снижены уровни опсонинов по отношению к различным бактериям, что обусловлено сниженным уровнем С3, и сниженным уровнем IgM .


Показатели  
повышены:

- Бактерицидная активность лейкоцитов к различным микроорганизмам в пределах нормы взрослых или даже повышена.
- Повышен лизоцим сыворотки.


# Формирование иммунной системы у ребенка заканчивается только к 7 годам

1. Внутриутробно ребенок не сталкивается с микроорганизмами, собственная иммунная система у него неактивна.
2. Дефицит IgM антител в период гестации.
3. Во время беременности от матери к ребенку попадают только Ig класса G.
4. Приобретенные от матери Ig в крови ребёнка сохраняются около 6 месяцев.
5. Недостаточная способность к фагоцитозу.
6. Низкая продукция интерферонов.

## Уровни иммуноглобулинов у новорожденных:



# Динамика материнских и собственных иммуноглобулинов у плода и у новорожденного



# 1 критический период - период новорожденности (первые 4 недели жизни)

- Лимфоцитоз с 5 суток.
- Количество клеток не сопровождается адекватной функцией.
- Гуморальная защита за счет материнских антител.
  - Низкая чувствительность к действию цитокинов - снижена экспрессия рецепторов к цитокинам.
- Слабая противовирусная защита.
- Снижена экспрессия костимулирующих молекул (CD40-CD40L , CD28-CD28L).
- Недостаточные реакции активации комплемента.
- Снижена фагоцитарная активность клеток.

# Общие характеристики Т-лимфоцитов у новорожденных

- В крови высокий уровень недавних мигрантов из тимуса, они пролиферируют в ответ на IL 7 в отсутствие стимуляции TCR.
- Поляризация иммунного ответа в сторону Th2
- Th17 клетки единичные или отсутствуют,
  - Относительно высокий уровень Treg в пуповинной крови,
- Низкие функциональные способности CD8-лимфоцитов.

- Сниженная активность сигнальных путей Т-клеточной активации.
  - Слабые взаимодействия CD40-CD154, что приводит к нарушению переключения классов иммуноглобулинов и продукции антител.
- Низкий уровень CD154 приводит к нарушению регуляции продукции

## 2-й критический период – 3-6 месяцев жизни

- Начинается катаболизм материнских антител
- Собственная продукция антител осуществляется за счет IgM.
- Плохо формируются клетки памяти

- Доминирует Th 2 ответ
- sIgA появляется в назальных секретах, в слюне с 3 месяцев, но его концентрация ниже чем у взрослых в 4-5 раз

# 3-й критический период – 2 год жизни

- Расширяются контакты с внешним миром
- К концу 1 года жизни-IgG =0,5-0,6 ;IgA-0,3 от средних значений взрослых
- к концу 2 года жизни- IgM, IgG=0,8;IgA-0,4 от средних значений взрослых.
- Доминирует IgM ответ.

- Иногда поздний иммунологический старт-транзиторная гипогаммаглобулинемия
- Противовирусная защита по-прежнему страдает- частые ОРВИ (резко снижена продукция интерферона альфа после любой вирусной инфекции)

# Факторы, не способствующие преодолению физиологического иммунодефицита у детей раннего возраста:

## Экзогенные факторы:

- Неблагоприятная экология.
- Раннее начало посещения детских дошкольных учреждений (постоянные инфекции).
- Низкий уровень образования, санитарной культуры, неблагоприятные социально-бытовые условия.
- Недостаточно сбалансированное питание.
  - Гипо- и авитаминозы.
- Психоэмоциональные стрессы.
- Необоснованное назначение антибактериальной терапии.

## Эндогенные факторы:

- Определенная «незрелость» внутренних органов и иммунной системы.
- Очаги хронической инфекции в ЛОР-органах.
  - Дисбактериоз кишечника.
- Изменения функции желез внутренней секреции.
  - Наличие аллергических заболеваний.

# 4-й переходный период-6-7 год жизни

- Вновь «перекрест» и лимфоцитоз
  - Повышается частота патологии иммунитета

- Часты паразитарные инфекции, повышается чувствительность к туберкулезу

# 5-й переходный период- подростковый возраст

- Пубертатный скачок роста.
- Секреция половых гормонов ведет к подавлению клеточного ответа и доминированию гуморального, менее эффективного иммунного ответа.
- Нарастает воздействие экзогенных факторов
  - Остается чувствительность к микобактериям туберкулеза.
- Новая волна нарастания транзиторных вторичных иммунодефицитных состояний.

# Вакцинация – как метод минимизации проявлений физиологического ВИД у детей и у пожилых

Показатели	Снижение показателя
Случаи госпитализации среди пожилых	на 48%
Смертность среди пожилых	на 50–68%
Случаи заболевания гриппом среди привитых здоровых людей младше 65 лет	на 70–90%
Случаи заболевания гриппом среди привитых детей	на 60–90%
Острый отит среди детей	на 30–36%

В вакцинации против различных инфекций нуждаются группы риска развития осложнений:

- дети раннего, дошкольного и школьного возраста,
- медицинские работники,
- люди старше 60 лет,
- воинский контингент,
- работники транспорта,
- лица, страдающие хроническими соматическими заболеваниями.

Источник: НИ гриппа Миинздравсоцразвития  
[www.influenza.spb.ru](http://www.influenza.spb.ru)

# Применение иммуномодуляторов

## В составе комплексного лечения

- Острые и хронические воспалительные заболеваний любой этиологии (в том числе ОРВИ, грипп).
- Септические состояния.
- Гнойные хирургические инфекции.
- Хронические рецидивирующие урогенитальные инфекции.
- Заболевания респираторного тракта.
  - Туберкулез.
- Онкологические заболевания (сопутствующая терапия).

## В виде монотерапии

- Восстановление иммунитета после перенесенных «истощающих» заболеваний.
- Профилактика инфекций и восстановление иммунитета (онкологических больных).
- Перед началом осенне-зимнего сезона для профилактики обострений воспалительных заболеваний у ЧДБ (часто и длительно болеющих лиц)

# Физиологический иммунодефицит при беременности

Материнская иммунная система должна :

- обеспечивать защиту организма беременной и плода от патогенных микроорганизмов,
- обеспечивать иммунологическую толерантность к аллоантигенам отца для успешного развития плода на всем протяжении беременности.



Компромисс между:  
иммунологической защитой матери и плода от инфекционных агентов  
и  
иммунологической защиты плода от агрессии иммунной системы матери  
или развитие «иммунологической привилегированности матки»  
- результат тонкого взаимодействия клеточных, гуморальных, пара- и аутокринных факторов на уровне плаценты.

# Антигены плода при беременности

- Антигены EVT интерстициального трофобласта:
  - антигены МНС-I классические HLA-C (вызывают иммунный ответ клеточный и гуморальный- АТ).
  - антигены МНС-I неклассические HLA-E, HLA-F, HLA-G (иммуномодулирующее действие).
    - MiHA минорные антигены гистосовместимости, обусловлены полиморфизмом генов нормальных белков.
- Эмбриональные антигены (AFP, hCG, TPS, PSA, MCA, CA-125, SCC).
  - Антигены спермы.



Для развития толерантности к антигенам плода, иммунная система матери должна находиться в состоянии иммунодефицита

## Антигены плода при беременности взаимодействуют с иммунной системой матери

- Ворсинки трофобласта омываются кровью матери.
  - Растворимые молекулы МНС, эмбриональные антигены, дебрис поступают во все органы матери с кровотоком, в том числе **в селезенку**
- Экстраворсинчатый интерстициальный трофобласт контактирует с иммунными клетками децидуальной оболочки (может развиваться локальный ответ в зоне взаимодействия).

# Механизмы развития толерантности к антигенам плода


Система факторов, предотвращающих прямые контакты или активацию клеток иммунной системы:

- трофобласт покрыт слоем синцитиотрофобласта, который не экспрессирует аллоантигены.
- в децидуальной оболочке исключен синтез многих хемокинов, привлекающих воспалительные клетки.
- в децидуальной оболочке мало лимфатических сосудов.
- дендритных клеток тоже мало и они не мигрируют в лимфоузлы.

Создание микроокружения, необходимого для индукции толерантности, дифференцировки iTregs:

- эпителий матки и трофобласт синтезируют противовоспалительные цитокины TGF $\beta$  и IL-10
- IDO индоламин 2,3 дезоксигеназа (трофобласт, мкф, ДК; NK-IFN $\gamma$ -мкф-IDO) – индукция Tregs.
- толерогенные дендритные клетки LILRB1 реагируют с HLA-G.
- ворсинчатый трофобласт синтезирует гормоны: прогестерон и хорионический гонадотропин

# Зоны контактов плода с иммунной системой матери при гемохориоидальном типе плаценты (Moffett, Loke 2006)



# Подавление адаптивного иммунитета на фоне активации врожденного иммунитета при беременности



# Классификация вторичных иммунодефицитов



-индуцированная форма,  
-спонтанная форма,  
- СПИД

# Причины развития индуцированной формы ВИД

Действие конкретных групп причин :

- ионизирующее излучение,
- применение цитостатиков, кортикостероидов,
  - травмы,
- хирургические вмешательства,
  - стрессы,
- нарушение питания (белковая недостаточность) и др.

ИД развивается вторично (по отношению к основному заболеванию):

- онкопатология
- сахарный диабет
  - заболевания печени, почек
- инфекции и т.д.

## Спонтанная форма ВИД

Характеризуется  
отсутствием явной  
причины,  
вызывающей  
нарушения в  
иммунной системе.

Клинически проявляется в виде  
хронических,  
часто рецидивирующих  
инфекционно-воспалительных  
заболеваний:  
органов дыхания,  
ЖКТ,  
урогенитального тракта,  
вызванных условно-патогенной  
флорой.

Хронические заболевания трудно  
поддаются традиционному  
лечению.

# Иммунодиагностика при подозрении на ИД

Применение  
инструментальных  
методов -

компьютерная и  
рентгенодиагностика,  
УЗИ позволит  
диагностировать:  
изменение размеров  
тимуса,

спленоmegалию,  
охарактеризовать  
лимфоузлы и т.д.

- Иммунологические тесты назначает врач аллерголог-иммунолог с учетом предполагаемых дефектов в иммунной системе .
- При необходимости врач аллерголог-иммунолог назначает иммунологический мониторинг - проведение повторных иммунологических исследований на фоне или после проведенного лечения.

# ВИД : клинические и лабораторные критерии

Клинические критерии	Лабораторные критерии
Частые обострения вялотекущих хронических воспалительных заболеваний	↓ Содержания форменных элементов крови в гемограмме
Частые ОРВИ (более 5-6 раз в год)	↓ Уровни IgA, IgM, IgG в крови
Частые обострения герпес-вирусной инфекции	↓ Число общего числа Т-лимфоцитов; популяций и субпопуляций
Длительный субфебрилитет	↓ Функциональной активности фагоцитов, системы комплемента
Лимфоаденопатия	Нарушения продукции интерферонов, дисбаланс синтеза цитокинов Тh-клетками
Отсутствие достаточного клинического эффекта после назначения стандартной терапии по поводу имеющегося у пациента заболевания	Изменения состояния спонтанного и индуцированного апоптоза, ↓ аффинности антител

# Инфекции и иммунитет

Оesophagus



Нормальные  
миндалины



Нормальная  
кожа



Кандидоз  
(Candida)



Стрептококковая  
инфекция



Стафилококковая  
инфекция

# Варианты иммунного ответа на бактериальную инфекцию



# Иммунологические показатели у более 10000 больных с бактериальной инфекцией

по данным профессора Латышевой Т.В. ФГБУ «ГНЦ НИИ Иммунологии»

1. В 71- 90 % случаев выявлены нарушения фагоцитарного звена:  
74% - снижение фагоцитарного индекса.

82% - снижение внутриклеточной бактерицидности нейтрофилов.

58 - 90% - снижение индуцированной и спонтанной хемилюминесценции.

2. В 63,6% случаев выявлены нарушения гуморального звена:  
30,6% - дисиммуноглобулинемии.

42 % - снижение уровня IgG.

43,8% - снижение аффинности антител.

3. В 43% случаев выявлены нарушения клеточного звена:  
43% - лейкопения.

48% - снижение CD8+ и CD4+ -лимфоцитов;

36% -снижение CD 19 + (В лимфоцитов).

4. В 38% случаев - смешанная патология (бактериально - вирусные ассоциации).


5. В 19% случаев - изменений иммунологических параметров не выявлено.

# Принципы лечения ОРВИ у часто длительно болеющих (ЧБД)

- Патогенетический подход.
- Комплексность терапии.
  - Профилактика (закаливание, физические упражнения, витамины, вакцинация, консультация невролога и психолога и др.).
  - Физиотерапия (УФО, массаж и др.).

- Санация очагов хронической инфекции (заболеваний органов ЖКТ, лечение паразитарных инвазий и др.).
- Фармакотерапия (симптоматическая терапия ОРВИ (противовирусные препараты, отхаркивающие средства и т.д.).
- Лечение сопутствующих заболеваний.
  - По показаниям-(иммунотерапия).


# Заместительная иммунотерапия: применение иммуноглобулинов в клинической практике



# Механизмы действия заместительной терапии препаратами иммуноглобулинов при сепсисе и тяжелых инфекциях


Высокоаффинные антитела осуществляют быструю **нейтрализацию** эндотоксинов, экзотоксинов и суперантигенов.

Широкий спектр высокоаффинных антител после опсонизации бактериальных агентов способствует **быстрому комплемент-опосредованному уничтожению** бактерий и **повышению активности фагоцитов** (путем активации их **Fc-рецепторов**).




# Алгоритм иммуномодулирующей терапии у больных с острыми хирургическими заболеваниями

Иммунный ответ на деструкцию тканей при острых хирургических заболеваниях



Сравнительный анализ эффективности профилактической иммуномодулирующей терапии у больных с тяжелым острым панкреатитом.



Боровкова Н.В. Вторичный иммунодефицит при гнойно-септических осложнениях хирургических заболеваний. Автореферат дисс. д.м.н., Москва-2011, 50 с.

# Классификация ВИД: СПИД

**СПИД** – синдром приобретенного иммунодефицита, последняя стадия ВИЧ –инфекции.

**ВИЧ** – вирус иммунодефицита человека.

ВИЧ относится к семейству РНК- содержащих ретровирусов, имеющих фермент- обратную транскриптазу. Описаны 2 вида ВИЧ- **ВИЧ 1 и ВИЧ 2.**

# ВИЧ 1 и 2

Генетический  
аппарат  
**ВИЧ-1** и **ВИЧ-2**  
схож между собой  
по последовательности  
нуклеотидов  
на **50%**.

- **ВИЧ-1** более распространен в США, Европе, России, Центральной Африке;
- **ВИЧ-2**-эндемичен для Западной Африки.

# ВИЧ 1 и 2

## **ВИЧ-1**

(открыт в 1983 году Л. Монтанье и Р. Галло);

**ВИЧ-2** (открыт в 1986 году Л. Монтанье).

Оба типа **ВИЧ** поражают:

Т- лимфоциты,


другие клетки иммунной системы (макрофаги),

клетки нервной системы (в основном головного мозга).

Для ВИЧ характерна высокая степень изменчивости – в миллион раз больше, чем у вируса гриппа.

В Международной базе данных зафиксировано более **25 тысяч** вариантов **ВИЧ**.

# Число взрослых и детей, инфицированных ВИЧ ( данные ВОЗ 2010 г.)



**Всего: 34.0 млн [31.6 млн – 35.2 млн]**

# Пути инфицирования ВИЧ

Вирус обнаруживается во всех биологических жидкостях зараженного человека, но в разных концентрациях.

Самая высокая концентрация – в крови, сперме, вагинальном отделяемом, грудном молоке.

Минимальное содержание вируса – в слюне, в слезной жидкости..

Пути проникновения вируса:

- Парентеральный.
- Половой.
- Вертикальный (от матери новорожденному).

Вертикальный путь может происходить по одному из трех вариантов:

Трансплацентарный – антенатальный (вероятность заражения - 15-25 %).

В родах-интранатальный путь (60-85 %).

Постнатальный-при грудном вскармливании (12-25%).

# Прогноз заболевания

У взрослых обычно происходит **длительный период** между проникновением ВИЧ и развитием СПИД.

Длительность прогрессирования инфекции до СПИДа у нелеченых взрослых в среднем составляет **10 лет**.

Вероятность рождения инфицированного ребенка от матери с ВИЧ-статусом в европейских странах составляет

**25-30%,**


в Африке **-50-60%.**

У детей период от ВИЧ-инфицирования до состояния СПИД **намного меньше**, чем у взрослых.

# Строение ВИЧ

Нуклеокапсид ВИЧ содержит:

- 2 одноцепочечные молекулы РНК,
  - связанные с ними белки р 7 и р 9,
  - комплекс ферментов (обратная транскриптаза, интеграназа, РНК-полимераза, протеиназа),
  - основной белок нуклеокапсида ВИЧ- р24.
- В зрелых вирионах также содержится белок Vpr.



# Строение оболочки ВИЧ

В состав оболочки ВИЧ входят:  
гликопротеины **gp 160** (160 кДа),  
состоящий из надмембранной части –gp120  
и внутримембранной части –gp 41.

Гликопротеин **gp 120** способен связываться с молекулами **CD 4** и играет ключевую роль в проникновении вируса в клетку-мишень.

Значительное число молекул **gp 120** отрывается от вирусных частиц и попадает в кровь и в ткани.

Этот процесс называется шеддингом (от англ. Shedding – утечка).

**ВИЧ 2** имеет мембранные гликопротеины **gp 140** (gp105 и gp 36 кДа).

# Строение ВИЧ




Figure 11-21 Immunobiology, 6/e. (© Garland Science 2005)

# Геном ВИЧ

Геном ВИЧ может существовать в двух вариантах :

- в виде геномной РНК,
- в виде ДНК,

синтезированной на геномной РНК – как на матрице, и в виде участка ДНК, интегрированного в какую-либо хромосому клетки-хозяина (провирусная форма).

Как и все ретровирусы, ВИЧ обладает сильной изменчивостью и существует в виде множества квазивидов:

ни один дочерний вирион не воспроизводит родительский в точности – эволюционно отобранный способ ускользания вирусов от иммунного надзора организма-хозяина.



# Свойства ВИЧ

Характерная для ВИЧ  
непрерывная  
антигенная  
изменчивость  
позволяет вирусу  
легко проникать в  
клетки хозяина.

ВИЧ заселяет  
лимфоциты и клетки  
миелоидного ряда.

Т лимфоциты –  
хелперы и макрофаги  
–депо вируса,  
так как гликопротеин  
gp 120 связывается с  
молекулой CD4 и  
рецепторами для  
хемокинов –  
CCR3 и CCR5.


# Этапы развития ВИЧ -инфекции

Сначала ВИЧ-1 инфицирует дендритные клетки и макрофаги, затем - Т лимфоциты.


- Внутриэпителиальные дендритные клетки:
- интернализируют вирусы.
  - мигрируют с ними в лимфатические узлы.
  - в лимфатических узлах представляют вирусные антигены Т-лимфоцитам.

# Этапы развития ВИЧ -инфекции


Вход вируса в дендритную клетку



ВИЧ интернализирован, в ранних эндосомах





Дендритная клетка в лимфоузле презентует ВИЧ Т-хелперу CD4+



# Клетки-мишени для ВИЧ

- CD4+ Т лимфоциты
- Дендритные клетки
- макрофаги
- клетки Лангерганса
- ТИМОЦИТЫ
- СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ КОСТНОГО МОЗГА
- микроглия
- эпителиальные клетки





Слизистая

Клетка Лангерганса

Антигенпрезентирующая клетка

Vagina

Репликация в ЛУ

CD4+ Th

Репликация в слизистой

макрофаг

ВИЧ

CD4+

Диссеминация

системная лимфоидная ткань

ВИЧ свободный и в клетках

Грудной проток

кровоток

Генитальный ЛУ

# Изменения в иммунной системе при ВИЧ-1-инфицировании: проникновение

Поверхностный **gp 120** связывается с молекулами **CD 4**.

После связывания происходит изменение оболочки ВИЧ,


**gp 41** взаимодействует с плазматической мембраной клетки организма-хозяина, в результате которого внутренние компоненты вируса входят в клетку.

В качестве корецептора для ВИЧ-1 использует также **CCR 5**-хемокиновый рецептор, однако в клетку экспрессируемый мононуклеарами (мутации гена **CCR 5** защищают клетки хозяина от входа ВИЧ-1).

Рецепторы **CXCR 4** на Т-лимфоцитах также используются ВИЧ-1 для входа в клетки.

# Вход ВИЧ в клетку хозяина


ВИЧ



# Этапы развития ВИЧ -инфекции

Вирусные частицы связываются с CD4 молекулами и с корецепторами на Т клетке

Оболочка вируса сливается с мембраной клетки, вирус проникает в клетку-мишень



# Изменения в иммунной системе при ВИЧ-1-инфицировании: проникновение в геном

Вновь образованный геном ВИЧ в виде ДНК, синтезированной с помощью обратной транскриптазы на геномной РНК – как на матрице, входит в ядро клетки-мишени

Вирус в виде участка ДНК, интегрированного в какую-либо (любую) хромосому клетки-хозяина, может **существовать в форме провируса.**

# Этапы развития ВИЧ -инфекции




Figure 11-23 part 2 of 2 Immunobiology, 6/e. (© Garland Science 2005)

# Изменения в иммунной системе при ВИЧ-1-инфицировании: проникновение в геном и размножение ВИЧ

Активация Т-клетки приводит к низкому уровню транскрипции провируса.

Происходит многократный сплайсинг РНК-транскриптов.


Происходит синтез и сборка всех необходимых новому вирусу белков, включая белки оболочки.

Происходит сборка вновь образованных вирусов внутри клетки организма-хозяина.


Выход из пораженной клетки организма-хозяина дочерних вирусов (с выраженными антигенными изменениями вследствие мутаций ) и заражение других клеток.

# Этапы развития ВИЧ -инфекции


Активация Т-клетки приводит к низкому уровню транскрипции провируса.





Позже начинаются процессы синтеза вирусных РНК



Синтез вирусных белков



Сборка новых вирусов, заражение других клеток



## Латентность

Состояние непродуктивной инфекции в индивидуальной клетке.

Латентно инфицированные клетки сохраняют способность продуцировать инфекционные вирусные частицы.


## Вирусная репликация

Новый цикл инфекции, характеризующийся тем, что неинфицированные ранее клетки инфицируются *de novo* и производят новые вирусы.

## Резервуары

Популяции инфицированных клеток, которые обеспечивают наличие способных к репликации вирусов в пациентах, которые проходят цикл оптимальной антивирусной терапии на протяжении лет.

# Жизненный цикл ВИЧ



# Изменения в иммунной системе при ВИЧ-1-инфицировании

## ВИЧ-1 может:

- выступать в качестве суперантигена,
- вызывать апоптоз клеток-мишеней
- индуцировать цитотоксическое действие CD8+ лимфоцитов, направленное против CD4+ клеток, экспрессирующих антигены ВИЧ-1.

При ВИЧ инфекции происходит аномальная активация В-лимфоцитов (у больных увеличивается синтез IgG и IgA к антигенам ВИЧ-1).  
ВИЧ вызывает дисфункцию иммунной системы, нарушает процессы распознавания антигенов, вызывает апоптоз клеток.

# Изменения в иммунной системе при ВИЧ-1-инфицировании

На более поздних стадиях заболевания дисрегуляция иммунной системы усиливается:

- прогрессивно снижается синтез важнейших цитокинов - интерферона гамма, интерлейкинов 2, 12, 13, и др.

- мононуклеары, инфицированные ВИЧ-1, продуцируют большие количества провоспалительных цитокинов.

Нарушается регуляция всех типов иммунных ответов и ответов врожденного иммунитета.

Вследствие разрушения и гибели прогрессивно снижается число CD4+лимфоцитов.

Активируется низковирулентная флора, включая оппортунистические микроорганизмы.

# Этапы формирования СПИД – синдрома приобретенного иммунодефицита

В 50-60% случаев в течение 2-6 недель после заражения вирусом отмечаются гриппоподобные симптомы.

В течение последующих 5-8 лет заболевание может протекать бессимптомно.

Далее – в течение 2-3 лет – выраженная симптоматика (инфекционные процессы), прогрессивно снижается число CD4+ клеток в крови, запустевают органы иммунитета – тимус, лимфоузлы.

Последний год жизни – постоянные инфекции (в среднем от момента заражения до смерти проходит 10-13 лет).

# Клинические проявления иммунодефицита при ВИЧ -инфекции

**1 фаза - начало инфекции (первые 2-3 недели) –гриппо-подобный синдром:**

лихорадка, головные боли, генерализованная

лимфоаденопатия, артралгии, воспалительные процессы в

глотке и в гортани, кандидоз

слизистой оболочки полости рта,

гепато- и спленомегалия,

диарея, конъюнктивит, серозный

менингит.

**2 фаза – бессимптомная- может длиться 5-10 лет.**

**3 фаза – персистирующая генерализованная лимфоаденопатия.**





Figure 11-20 Immunology (© Garland Science 2005)

## 3 фаза –персистирующая генерализованная лимфоаденопатия

Увеличиваются в основном шейные, над- и подключичные, подмышечные, кубитальные лимфатические узлы.

У ряда больных возникают психопатические и неврологические расстройства, соответствующие подострой энцефало- и полинейропатии. Нарушается сон, снижается внимание, усиливаются головные боли.

# Иммунный ответ на ВИЧ



# СПИД-связанный симптомокомплекс

По мере углубления иммуносупрессии присоединяются вторичные заболевания:

- оппортунистические инфекции, вызываемые условно-патогенными микроорганизмами.
- злокачественные новообразования (саркома Капоши, В-клеточная лимфома и др.).

Больные предъявляют жалобы на слабость, быструю утомляемость, прогрессивную потерю массы тела (10% и более), субфебрилитет, потливость, нарушение стула.

Происходит неуклонное снижение интеллекта и памяти, вплоть до развития ВИЧ-обусловленной деменции.


Прогрессируют оппортунистические инфекции- часто развивается пневмоцистная пневмония.

# Клинические проявления у ВИЧ-инфицированных детей

- Персистирующая генерализованная лимфоаденопатия
- Гепато- и спленомегалия
  - Лихорадка
  - Экзема
  - Паротит
  - Отит
  - Синусит
  - Анемия
- Задержка физического и умственного развития

- Мышечная слабость
- Персистирующая диарея
  - Лимфоцитарная интерстициальная пневмония
- Токсоплазмоз головного мозга  
(у детей старше 1 года)
- Герпетические поражения кожи и слизистых оболочек

# Диагностика ВИЧ-инфекции включает критерии:



- Эпидемиологические.
  - Клинические.
  - Лабораторные.

# Критерии диагностики ВИЧ-инфекции:

## 1. Группы эпидемиологического контроля

- Наркоманы.
- Би- и гомосексуалисты, лица, ведущие беспорядочную половую жизнь
- Реципиенты, получающие повторные гемотрансфузии и переливание компонентов крови.
  - Некоторые профессиональные группы населения, работающие с контаминированным материалом.
- Дети, рожденные от ВИЧ-инфицированных матерей.
- Доноры крови, спермы и других биологических жидкостей и тканей (перед каждым получением материала).
- Беременные при постановке на учет.

## 2. Клинические критерии диагностики ВИЧ-инфекции

- Недавно перенесенное заболевание с гриппо- или мунонуклеозоподобным синдромом.

Лихорадка длительностью более 1 месяца.

Увеличение лимфатических узлов двух или более групп дольше 1 месяца.

- Необъяснимое снижение массы тела более, чем на 10%.
- Затяжные, не поддающиеся обычному лечению пневмонии.
- Затяжные и рецидивирующие гнойно-бактериальные, паразитарные заболевания, сепсис.

- Подострый энцефалит с развитием слабоумия у ранее здоровых лиц.

- Ворсистая лейкоплакия на языке.

- Рецидивирующие пиодермии.

- Хронические воспалительные заболевания половой сферы неясной этиологии у женщин.

- Признаки ряда заболеваний (саркома Капоши, лимфома, Т-клеточный лейкоз, туберкулез, гепатиты В и С, Нве – носительство, анемии различного генеза, кандидоз пищевода, глубокие микозы, заболевания, передающиеся половым путем).

### 3. Критерии лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции

#### Обязательные маркеры ВИЧ:

- Определение анти-ВИЧ антител
- Выявление методом ИФА антител к gp 120, gp 41, gp 120/160 и др.;
- Определение методом иммуноблота антител к двум или более антигенам ВИЧ.

#### Дополнительные критерии:

- Определение ВИЧ в лимфоцитах методом ПЦР
- Определение p24-антигена методом ИФА
- Выделение ВИЧ в культуре *in vitro*

#### Неспецифические лабораторные тесты:

- Снижение числа CD4+ лимфоцитов, значение иммунорегуляторного индекса CD4+ /CD8+ менее 1, гипергаммаглобулинемия.
- Увеличение уровня циркулирующих иммунных комплексов
- Снижение продукции цитокинов
- Лейкопения, лимфопения, тромбоцитопения, анемия.

# «Диагностическое окно» для определения антител к ВИЧ

- Антитела к ВИЧ у 90-95% зараженных ВИЧ появляются в крови в течение первых трех месяцев после заражения,
- у 5-9% -через 6 месяцев,
- у 0.5-1% -в более поздние сроки.

- Наиболее ранний срок обнаружения антител к ВИЧ – через 2 недели после заражения (бывает крайне редко).

# Лечение ВИЧ-инфекции

Основа лечения - проведение специфической антиретровирусной терапии, направленной на снижение смертности больных, сокращения числа СПИД-связанных заболеваний, восстановления иммунитета, достижения максимального снижения репликации вируса.

Основные препараты этой группы –ингибиторы обратной транскриптазы.

ВААРТ-высокоактивная антиретровирусная терапия включает :

Комбивир  
(зидовудин+ламивудин),  
Калетра  
(лопинавир+ритонавир),  
Тризивир  
(абакавир+ламивудин+зидовудин).

Перед назначением терапии проводится психосоциальное консультирование.


# Критерии назначения антиретровирусной терапии:

- число CD 4+ клеток в крови менее 350/мкл,
- наличие клинических симптомов, свидетельствующих об иммунодефиците,
- уровень вирусной нагрузки, превышающей 100 000 копий/мл.

Дополнительный критерий:  
снижение числа лимфоцитов в периферической крови ниже 1000-1200/мкл.

# Антиретровирусная терапия больных ВИЧ-инфекцией

Антиретровирусная терапия направлена на прекращение репликации (размножения) вируса иммунодефицита человека, являющегося возбудителем ВИЧ-инфекции



# Рукописный отчет Э. Дженнера о проведенной им вакцинации

13 Cases.

Miss Smith

The man accordingly to whom the progress of the infection, I selected a healthy boy about eight years old for the purpose of inoculation for the Cow-pox. The matter was taken from a suppurated sore on the hand of a young Black. She was infected by her mother's Cow-pox and inoculated on the 14th of May 1796, into the arm of the Boy, by one of the superficial incisions, each about three quarters of an inch long. On the 7th day he complained of uneasiness in the armpits, on the 9th he became a little chilly, lost his appetite, and had a slight head-ach. During the whole of this day he was perfectly indisposed, & had rather a restless night; but on Monday following he was perfectly well. The appearance, and progress of the incisions to a state of maturation, were pretty much the same as observed in a similar manner by a virulent matter. The only difference, I perceived, was, that the edges appeared rather a darker hue, and that the inflammation spreading round the incisions, took on rather more of an erysipelatous look, than as commonly happens when virulent matter has been made use of for the same purpose.

# ВИЧ-1: вакцинация пока не принесла успехов

Table 1. Completed phase II and III human HIV-1 vaccine trials

Category	Study protocol	Candidate vaccine	Phase	Volunteers	Location	Year published	Result
Ex-protein	RV144	AIDAC-HIV vCP1521/AIDS VAX MN-CM244 rgp120 (CRF01_AE, B)	III	16,403	Thailand	2009	31% efficacy
Ex-protein	HVTN203	AIDAC vCP1452/MN-GNE8 rgp120 (B)	II	330	US	2007	Interferon- $\gamma$ ELISpot in 16% of volunteers
Ex-protein	HIVNET 026	AIDAC vCP1452/MN rgp120 (B)	II	200	Multinational	2007	Not immunogenic
Ex-protein	AVEG 202/ HIVNET 014	AIDAC-HIV vCP205/SF2 rgp120 (B)	II	420	US	2001	CD8 <sup>+</sup> T cells in 33% of volunteers
NA-pox	IAVI 010	DNA-HIVA/MVA-HIVA (A)	IIa	115	East Africa	2007	Rare interferon- $\gamma$ ELISpot responses
NA-pox	HVTN 205	GeoVax JS7 DNA/MVA HIV62 (B)	II	225	US, Peru, RSA	–	Ongoing
NA-Ad5	RV 172	DNA (VRC-HIVDNA016-00-VP)/ rAd5(VRC-HIVADV014-00-VP (A, B, and C)	I/IIa	324	East Africa	2010	Interferon- $\gamma$ ELISpot in 63% of volunteers
NA-Ad5	HVTN 204	DNA (VRC-HIVDNA016-00-VP)/ rAd5(VRC-HIVADV014-00-VP (A, B, and C)	IIa	480	Americas, RSA	–	Interferon- $\gamma$ ELISpot in >60% of volunteers
NA-Ad5	HVTN 505	DNA (VRC-HIVDNA016-00-VP)/ rAd5(VRC-HIVADV014-00-VP (A, B, and C)	IIb	1350	US	–	Ongoing
NA-Ad5	HVTN 502/ Merck 023	MRKAd5 HIV-1 gag/pol/nef (B)	IIb	3000	US	2008	No efficacy; transient infection risk
NA-Ad5	HVTN 503	MRKAd5 HIV-1 gag/pol/nef	IIb	3000	RSA	–	No efficacy
Ex-protein	ACTG 326; PACTG 326	AIDAC vCP1452/AIDS VAX B/B	I/II	48	US	2005	Safe, poorly immunogenic
Peptide	ANRS VAC 18	LIPO-5	II	156	France	2010	CD8 <sup>+</sup> responses in >60%
Protein-protein	AVEG 201	rgp120/HIV-1 SF-2/MN rgp120	II	296	US	2000	NAb in 87%, DTH to gp120 in 59% of volunteers
AV	IAVI A002	tgAAC09	II	84	RSA, Uganda, Zambia	2010	Interferon- $\gamma$ ELISpot in 25% of volunteers
Protein	VAX 003	AIDS VAX B/E	III	2500	Thailand	2006	No efficacy
Protein	VAX 004	AIDS VAX B/B	III	5400	US	2005	No efficacy




# Генная терапия ВИЧ

Основанием нового метода лечения послужил случай выздоровления американского ВИЧ-инфицированного пациента после пересадки костного мозга.

Донор костного мозга был носителем мутации гена **CCR5**, эта мутация приводит к отсутствию экспрессии молекул **CCR5**, это затрудняет проникновение вируса иммунодефицита в Т-лимфоциты.

# Длительный контроль ВИЧ инфекции с помощью трансплантации стволовых клеток костного мозга донора с мутацией $\Delta 32/\Delta 32$ CCR5




# Дельта-32 CCR5

Мутацию  
"дельта -32  
CCR5"  
открыли  
более 20  
лет назад.

Счастливики,  
унаследовавшие  
мутацию  
«дельта-32 CCR5»  
от обоих родителей  
(гомозигота)  
- являются неуязвимыми  
для большинства  
разновидностей ВИЧ.

# Частота встречаемости CCR5- Δ32 аллели в мире (самая высокая – в Европе- 9%)



# Генная терапия ВИЧ

В ходе эксперимента, проведенного в США, американские ученые решили отредактировать гены клеток иммунной системы добровольцев с ВИЧ-инфекцией.

Для этого исследователи удалили ген CCR5 из Т-лимфоцитов, выделенных из крови пациентов.

После этого модифицированные клетки были размножены в лаборатории, а затем введены в организм испытуемых.

# Генная терапия ВИЧ

Трое участников исследования получили приблизительно по **2,5 миллиарда** модифицированных лимфоцитов, еще трое - в два раза больше клеток.

Спустя три месяца после процедуры численность модифицированных клеток существенно увеличилась в крови 5 из 6 испытуемых.

В результате невосприимчивыми к ВИЧ-инфекции оказались приблизительно **6 % Т-клеток** пациентов.


# Генная терапия ВИЧ: перспективы

Теоретически в будущем это может привести к замедлению развития СПИДа у носителей ВИЧ-инфекции



Однако предстоит выяснить, как скажется примененная ими методика удаления гена CCR5 на функциях модифицированных клеток (сейчас известно, что врожденное отсутствие этого гена практически не влияет на здоровье человека).

# Стратегии блокирования инфекции ВИЧ с помощью снижения экспрессии CCR5

(Andrea Rubbert, Georg Behrens and Mario Ostrowski, 2011)




# Примеры генной терапии ВИЧ-инфекции



**Barton et al., 2012**

# Генные подходы к терапии ВИЧ -инфицированных



# ВОПРОСЫ

1. Что такое приобретенный иммунодефицит?
2. Каковы основные отличия приобретенных ИД от первичных ИД?
3. Охарактеризуйте основные цели и задачи иммунологического анамнеза.
4. Перечислите «болезни-маски» нарушений адаптивного иммунитета (гуморального и клеточного) и врожденного иммунитета.
5. Каковы отличия «физиологических» ИД от индуцированных или спонтанно приобретенных?
6. Каковы основные причины возникновения ВИД?
7. Перечислите клинические и иммунологические признаки ВИД.
8. Чем отличается иммунологический анамнез от других видов анамнеза?
9. Какие формы ВИД выделяют в настоящее время?
0. Какие инструментальные методы можно использовать при обследовании органов иммунной системы?

# Тестовые вопросы

Причины приобретенных (вторичных) иммунодефицитов:

- .Ионизирующая радиация.
- .Применение цитостатиков.
- .Стрессы.
- .Операции и наркоз.
- .Белковое голодание.

К приобретенным (вторичным) иммунодефицитам относятся:

- .Индукцированные иммунодефициты.
- .Спонтанные иммунодефициты.
- .Транзиторная младенческая гипогаммаглобулинемия.
- .Селективный дефицит IgA.
- .СПИД.

# Тестовые вопросы

- Основными признаками вторичных иммунодефицитов являются:
- .Отсутствие генетического дефекта развития иммунной системы.
  - .Развитие ИД на фоне ранее нормально функционировавшей иммунной системы.
  - .Наличие в иммунограмме изменений в нескольких звеньях иммунитета.
  - .При мониторинге в иммунограмме изменения являются не транзиторными, а носят стойкий характер и затрагивают один и тот же показатель.
  - .Согласно семейному анамнезу отсутствуют больные с ВИД.
- К «болезням-маскам» ИД с преимущественным поражением гуморального звена относятся:
- .Грибковые поражения кожи и слизистых оболочек.
  - .Сепсис.
  - .Повторные бактериальные пневмонии.
  - .Гнойный менингит.
  - .Бактериальные риниты, отиты, синуситы.

# Тестовые вопросы

К «болезням-маскам» ИД с преимущественным поражением клеточного звена не относятся:

- .Частые ОРВИ (более 6 раз в год).
- .Грибковые поражения кожи и слизистых оболочек.
- .Хронические вирусные инфекции.
- .Паразитарные инвазии.
- .Частые ангины.

Перечень каких «болезней-масок» позволяет заподозрить у больного ВИД с преимущественным поражением фагоцитарной активности нейтрофилов:

- .Длительно не заживающие раны
- .Частые ОРВИ.
- .Рецидивирующие фурункулезы.
- .Абсцессы.
- .Пиодермия.

# Тестовые вопросы

Каковы основные характеристики индуцированной формы ВИД:

- . Возникают у клинически здоровых людей и выявляются как случайная находка.
- . Имеет конкретную причину (рентгенооблучение, цитостатики, гормоны, травмы).
- . Выявляется у больных с хроническими заболеваниями.
- . Выявляется у лиц, перенесших операции.
- . Отмечаются иммунологические нарушения в разных звеньях иммунной системы.

В каких случаях нельзя говорить о «физиологическом иммунодефиците»?

- . При изменении в иммунограмме у детей в первые месяцы жизни.
- . У женщин в первом триместре беременности.
- . У женщин в третьем триместре беременности.
- . У пациентов в пожилом и старческом возрасте.
- . У ВИЧ-инфицированных пациентов в бессимптомной стадии.

# Тестовые вопросы

Какие формы ВИД выделяют в настоящее время?

- .Индукцированную.
- .Спонтанную.
- .Физиологическую.
- .СПИД.
- .Генетически обусловленную.

Основными критериями постановки диагноза ВИД не являются:

- .Данные иммунологического анамнеза.
- .Наличие клинических симптомов (изменение размеров ЛУ, селезенки, тимуса).
- .Наличие хронических бактериальных, вирусных, грибковых инфекций, трудно поддающихся традиционной терапии.
- .Обязательное наличие гипохромной анемии.
- .Наличие хронической гранулематозной болезни (ХГБ).

# Ситуационная задача №1

## Больной М., 13 лет.

В раннем детском возрасте болел редко. После начала учебы в школе стали беспокоить рецидивирующие отиты, риносинуситы, повторные ангины, бронхиты. Вирусными инфекциями болел редко.

При физикальном обследовании гипоплазии лимфоузлов не выявлено. При исследовании иммунограммы показатели CD3+ CD4+CD8+ - в пределах возрастной нормы.

Выявлены изменения в уровне иммуноглобулинов:

IgA-5, 12 г/л, IgM -1,4 г/л, IgG-4,5г/л.

Вопросы:

1. Можно ли рассматривать клинико-иммунологические данные как проявления ВИД?
2. Каковы возможные причины ВИД?
3. С какого возраста появились симптомы ВИД?
4. В каком звене иммунной системы имеются нарушения?
5. Перечислите «болезни-маски» ВИД у данного пациента.

## Ситуационная задача №2

Больной С., 34 года.

Поступил в клинику с диагнозом «острая левосторонняя нижнедолевая пневмония» средней степени тяжести. Из иммунологического анамнеза известно. Что пациент болеет в среднем 1-2 раза в год. Хронических заболеваний не имеет.

В клинике получал стандартную терапию. Выписан спустя 14 дней с выздоровлением.

При иммунологическом обследовании:

- в день поступления: ЦИК -10 г/л , IgA-1,5 г/л, IgM -4,5 г/л, IgG-9,3 г/л.
- при выписке: ЦИК -4,5 г/л , IgA-2,3 г/л, IgM -1,1 г/л, IgG-11,3 г/л. Вопросы:

1. Имеются ли клиничко-иммунологические основания предположить у пациента ПИД до поступления в стационар?
2. Имеются ли основания для постановки ПИД при выписке?
3. Нуждается ли пациент после выписки из стационара в иммунологическом мониторинге?

Тетрадь (альбом) Занятие № 4

Дата

Тема занятия: «Приобретенные (вторичные)  
иммунодефициты»

1. Краткие ответы на развернутые вопросы (1 -10)

**Дополнительные задания к занятию № 4:**

2. Нарисуйте схему взаимодействия молекул gp 41, gp120, CD4  
,CCR5.

3. Каковы особенности иммунодефицита при беременности.?

4. Каковы особенности иммунодефицита в пожилом возрасте?

5. Каковы особенности иммунодефицита в раннем детском возрасте?

## Домашнее задание к занятию № 5

Повторение заданий к занятиям №1, №2, №3, №4.

Занятие №5 –зачет 1 модуля 2 цикла «Клиническая иммунология».

Билет состоит из 3 открытиях вопросов и 10 тестовых вопросов – по пройденным темам занятий №1, №2, №3, №4.

За каждый открытый вопрос максимум -5 баллов,  
за каждый тестовый вопрос -0,5 балла.

Максимум за зачет 1 модуля 2 цикла составит 12.5 баллов.