

ВНУТРИВЕННЫЕ
НАРКОТИКИ.
ГЕРОИНОВАЯ
НАРКОМАНИЯ.
ЗАМЕНИТЕЛИ ГЕРОИНА.



ГЕРОИН.

- Диацетилморфин – полусинтетический препарат морфина, относится к наркотикам опийного природы,.





ОПИЙНАЯ НАРКОМАНИЯ [F11.2]

- Известно, что для развития психической зависимости от героина, то есть до развития I стадии заболевания, достаточно 2 -3 инъекций вещества. Для присоединения физической зависимости, то есть абстинентного синдрома, достаточно 1 - 2 недель систематического потребления того или иного деривата опия.



- Это наркотическое вещество не зря считается самым сильнодействующим. При внутривенном введении в человеческий организм уже спустя 10—20 секунд он достигает рецепторов головного мозга (при курении это время сокращается до 5—7 секунд).
- Ощущения от героина наиболее ярко выражены именно при введении его в организм посредством уколов. При данном способе использования наркотика (инъекции) героин, оказавшись в мозговых отделах, преобразуется в морфин и активно влияет на все эндорфиновые рецепторы, расположенные в головном/спинном мозге и ЖКТ.



СТАДИИ РАЗВИТИЯ ЗАВИСИМОСТИ.

НАЧАЛЬНАЯ СТАДИЯ

- Дисфория
- Растет
толерантность



□ Абстиненция начинается через 12-24 ч после перерыва, характеризуется тяжестью проявлений.

□ Рост толерантности во второй стадии настолько высок, что дозы достигают величины нескольких десятков смертельных доз в сутки. После перенесенной абстиненции толерантность резко падает и прежняя доза, которая была привычной, может привести к смерти.

ВТОРАЯ СТАДИЯ.



ТРЕТЬЯ СТАДИЯ.

- Истощение, астения
- толерантность к наркотику снижается





ФАЗЫ НАРКОТИЧЕСКОГО ОПЬЯНЕНИЯ.


НАРКОТИЧЕСКОЕ ОДУРМАНИВАНИЕ.

- Всем доволен
- Нет жалоб
- Зрачки сужены



ФАЗА ПЕРЕХОДА В АБСТИНЕНЦИЮ

- Раздражительная
слабость
- Зрачки нормальные



- Выраженная дисфория
- Многочисленные вегетативные расстройства
- Зрачки расширены.
- дебютные признаки абстинентного синдрома наиболее часто появляются спустя 8-12 часов после последнего введения наркотика в организм.

РАЗГАР АБСТИНЕНЦИИ.



ВНЕ НАРКОТИЧЕСКОГО ЭКЦЕССА.


- Ярких признаков выявить не удастся
- Гедоническая направленность
- Оживление при ожидании наркотиков





ПСИХИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

- Эгоцентризм
- Неумение контролировать эмоции
- Быстрое развитие слабоумия



Эгоцентризм



• Существует два основных метода лечения опиоидной зависимости: медикаментозная терапия и психотерапия. Медикаментозная терапия включает:

- • заместительную терапию агонистами опиоидных рецепторов - метадон или левометадиллом внутрь;
- • заместительную терапию частичным агонистом опиоидных рецепторов бупренорфином сублингвально или комбинированной формы сублингвального бупренорфина с налоксоном;
- • терапию антагонистом опиоидных рецепторов налтрексоном перорально;
- • проведение коротких курсов детоксикации и антиабстинентной терапии (метадон, бупренорфин и / или клонидин) для облегчения перехода к лечению антагонистами опиоидных рецепторов или воздержанию от наркотиков.

ЛЕЧЕНИЕ.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!