

**Заболевания,
передающиеся половым
путем (зппп)**

Выполнила Виссарова Мария
(116)

- Зппп- это группа болезней, заразиться которыми можно при сексуальном контакте. Возбудителями могут быть вирусы, бактерии, грибки или паразиты.
- Зппп поражают не только половые органы, но и весь организм, и нередко приводят к серьезным последствиям.
- Современная медицина насчитывает около 30 инфекций, которые можно отнести к ИППП. Большая часть из них может протекать бессимптомно, и это делает их весьма опасными для здоровья разных органов и систем.

Наиболее распространенные инфекции и заболевания:

1. Сифилис.
2. Гонорея.
3. Донованоз.
4. Мягкий шанкр.
5. Венерический лимфатоз.
6. ВИЧ (вирус иммунодефицита человека).

Заболелвания «нового» поколения:


1. Трихомониаз.
2. Генитальный герпес.
3. Гепатит С и В.
4. Бактериальный вагиноз

Если эти болезни будут прогрессировать у женщин, то это может привести к тому, что начнутся необратимые изменения органов в малом тазу. Также могут начаться серьезные воспалительные процессы, что приведет к бесплодию.

Сифилис

- **Сифилис** — одно из самых древних заболеваний, передающихся половым путем, его возбудителем является бледная спирохета. Выделяют три стадии сифилиса, и каждую из них сопровождают свои симптомы. Инфекция может пребывать в организме долгое время (иногда — несколько лет) и никак не проявляться внешне.

Один из первых симптомов болезни — появление твердого шанкра. Он возникает в области половых органов или анального отверстия. Реже — на пальцах рук. Со временем высыпания распространяются по всему телу. Больного беспокоит ломота в костях, лихорадка, головная боль. На поздних стадиях ухудшается зрение, появляется слабость, понижается иммунитет. При отсутствии лечения сифилис приводит к поражению всех органов и систем.




Первичный сифилис

Вторичный сифилис



Третичный сифилис

Superficial Syphilitic Lesions




Гонорея

- **Гонорея** — классическое венерическое заболевание, которое относится к ЗППП. Его возбудитель — гонококк - поражает уретру, шейку матки, органы малого таза, прямую кишку, глотку и даже глаза. Инкубационный период составляет несколько суток. Заболевание проявляется острыми симптомами — больных беспокоят гнойные выделения из половых органов, боль внизу живота, жжение при мочеиспускании и дискомфорт во время секса.

У женщин наблюдаются кровянистые выделения после полового контакта. При поражении прямой кишки гонорея вызывает локализованную боль и выделения из ануса. Среди осложнений гонореи — воспалительные заболевания органов малого таза, яичек и предстательной железы, мужское и женское бесплодие, прерывание беременности. При хроническом течении болезни поражаются все органы и системы организма.


Гонококк



Боль в животе
или боль при
половом акте

Выделения из
влагалища

Гонорея



У женщин

У мужчин


Боль в почках

Дискомфорт при
мочеиспускании

Залипание уретры



Гнойные выделения
из уретры

Гонорея у женщин





Гонорея у мужчин

Мягкий шанкр



- Венерический лимфогранулематоз (паховый лимфогранулематоз) — это хроническое гнойно-воспалительное поражение лимфоузлов и мягких тканей урогенитальной области, вызванное хламидиозной инфекцией.



ВИЧ

- **ВИЧ или вирус иммунодефицита человека.** Самое опасное заболевание, передающееся половым путем. ВИЧ дает о себе знать далеко не сразу — инкубационный период заболевания длится от 21 до 90 дней. Симптомы возникают только на стадии манифестации инфекционного процесса. Пациенты жалуются на воспаление лимфатических узлов, хроническую слабость, головные боли и потерю аппетита. Характерный признак ВИЧ — воспаление небных миндалин (ангина), которое не проходит длительное время. У больных повышается температура тела до 37-37,5 градусов, при этом нормализовать её с помощью жаропонижающих средств не удастся. Отсутствие антиретровирусной терапии крайне негативно сказывается на состоянии больного. Организм атакуют всевозможные вирусные и бактериальные заболевания: пневмония, герпес, туберкулез, кандидоз. Как следствие развивается СПИД.


Трихомониаз

- К особенностям заболевания можно отнести: инкубационный период может длиться до 28 дней. У мужчин происходит поражение уретры, у женщин: уретры и половых губ. Довольно часто протекание болезней, развивающихся в рассматриваемом случае, проходит без проявления симптоматики. Однако у полового партнера могут они проявиться



Генитальный герпес


- **Генитальный герпес.** Вирусное заболевание с крайне высокой восприимчивостью. Передается не только при половом акте, но и при контакте «кожа с кожей». Возбудитель — вирус простого герпеса 2 типа (ВПГ-2). Через сутки после заражения появляются маленькие пузырьки на наружных половых органах. Они сопровождаются зудом и легким пощипыванием. В следующие несколько дней происходит превращение пузырьков в болезненные язвочки, наблюдается лихорадка и увеличение лимфатических узлов. Высыпания — лишь видимая часть болезни. Даже после их исчезновения вирус герпеса остается в организме на всю жизнь. Отсутствие лечения у беременных женщин может привести к серьезным осложнениям, вплоть до смерти плода.



ГЕНИТАЛЬНЫЙ ГЕРПЕС У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

Гепатит В и С

При этих опасных заболеваниях происходит изменение структуры и функционирования печени, что проявляется серией характерных симптомов.




Симптомы гепатита В:

- увеличение печени (в некоторых случаях и селезёнки);
- тяжесть в надчревной области, которая усиливается после приёма пищи или при смене положения тела;
- тошнота, изредка рвота;
- резкое отвращение к запаху любой пищи;
- потемнение мочи;
- кожный зуд;
- постоянное ощущение тяжести в голове;
- нарушение сна, быстрая утомляемость;


Бактериальный вагиноз

- **Бактериальный вагиноз** - полимикробный клинический невоспалительный синдром, возникающий в результате замещения нормальной микрофлоры влагалища.



- **Фтириаз или лобковый педикулез** — паразитарная болезнь, возбудителем которой является лобковая вошь. Передается при половом контакте во время соприкосновения волос партнеров или вследствие общего использования постельного белья, одежды и предметов личной гигиены.

Первые симптомы появляются через сутки. Больного беспокоит зуд в области волосяных покровов, возникают шелушения, дерматиты, папулы и язвочки. При отсутствии лечения вши могут распространиться по всему телу, вызывая сопутствующие



Контактно-бытовые способы передачи половой инфекции

- поцелуй, укусы, полотенца, бритвенные станки, зубные щетки, посуда, особенно столовые приборы. (сифилис)
- использование общего постельного белья или предметов личной гигиены; совместное использование одних и тех же мочалок, губок для тела; попадание вагинальной смазки или мужского секрета на руки здорового человека, которыми он после протёр глаза. (гонорея)
- через средства личной гигиены; при совместном использовании полотенца; использование одной и той же посуды; при посещении бассейна; при присаживании на не обработанный антисептиками ободок унитаза (герпес)

Профилактика ЗППП:

- соблюдение личной гигиены;
- правильная и регулярная контрацепция;
- использование местных бактерицидных средств;
- регулярное посещение гинеколога или уролога;
- своевременное квалифицированное лечение выявленных заболеваний; и
- воздержание от беспорядочных половых связей;
- вакцинирование против некоторых типов вирусов.

Механические (барьерные) средства защиты при половых актах не гарантируют 100-процентную безопасность. Они обеспечивают в основном предохранение от нежелательной беременности, снижая риск заражения ЗППП лишь на 80-85%.