

# Многочлены.

## Делимость многочленов.

Цели:

1. Ввести понятие многочлена, степени многочлена, стандартной записи многочлена.
2. Рассмотреть свойства многочлена (теоремы).
3. Разобрать деление многочлена на многочлен «уголком».
4. Научиться делить многочлен на многочлен.

# Многочлены.

Из курса алгебры основной школы, мы знаем что существуют различные виды многочленов.

1. Одночлен:  $2a^3$ ,  $3a^2b$ ,  $7\dots$
2. Двучлен:  $3x+4$ ,  $2a^3 - 4c^2 \dots$
3. Трёхчлен (включая квадратный трёхчлен):  $3x+4b+c$ ,  $2x^2+3x-7\dots$

И так далее

Особое место занимают многочлены от одной переменной.

# Многочлен от одной переменной.

Многочлен от одной переменной  $P(x)$  представляет собой сумму одночленов. Одночлены располагаются по убывающим степеням переменной  $x$ . Записывается так:

$$P_n(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \dots + a_{n-2}x^2 + a_{n-1}x + a_n$$

Причем, старший коэффициент  $a_0$  отличен от нуля.

Такая запись называется стандартным видом многочлена  $P(x)$ .

# Многочлен от одной переменной

$$P_n(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \dots + a_{n-2}x^2 + a_{n-1}x + a_n$$

Если  $a_0 = 1$ , то многочлен называется приведённым, в противном случае он называется неприведённым.

Член  $a_n$  называют свободным членом многочлена  $P(x)$ .

Число  $n$  — показатель степени старшего члена — называют степенью многочлена.

# Вывод.

Любой многочлен  $P(x)$ , содержащий только переменную  $x$  и её натуральные степени, можно записать в стандартном виде

$$P(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_{n-1} x + a_n$$

где  $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}, a_n$  – некоторые действительные числа.

Если  $a_0 \neq 0$ , то многочлен  $P(x)$  называют многочленом  $n$  – ой степени, член  $a_0 x^n$  старшим членом,  $a_n$  – свободным членом.

Если  $P(x) = a_0$ , где  $a_0 \neq 0$ , называют многочленом нулевой степени. Число  $0$  называют нулевым многочленом.

# Способы разложения многочленов на множители от одной переменной

1. Вынесение общего множителя за скобки.
2. Способ группировки
3. Использование формул сокращенного умножения
4. Разложение квадратного трехчлена на множители.

# Свойства многочленов от одной переменной

Теорема 1.

Два многочлена  $P(x)$  и  $S(x)$  тождественны тогда и только тогда, когда они имеют одинаковую степень и коэффициенты при одноименных степенях переменной в обоих многочленах равны.

# Свойства многочленов от одной переменной.

Теорема 2.

Для любых двух многочленов ненулевой степени  $p(x)$  и  $s(x)$  существует пара многочленов  $q(x)$  и  $r(x)$  такая, что степень многочлена  $r(x)$  меньше степени многочлена  $s(x)$  и выполняется тождество

$$p(x) \equiv s(x)q(x) + r(x)$$



В результате сложения, вычитания и умножения  
многочленов получаются многочлены.

Особое место в теории многочленов занимает  
деление многочленов.

Но прежде рассмотрим ещё несколько теорем.

# Свойства многочленов от одной переменной.

## Теорема 3.

Остаток от деления многочлена  $p(x)$  ненулевой степени на двучлен  $x - a$  равен  $p(a)$   
(т.е. значению многочлена  $p(x)$  при  $x = a$ ).

Эту теорему обычно называют *теоремой Безу* в честь французского математика Этьена Безу (1730 – 1783).

# Свойства многочленов от одной переменной.

## Теорема 4.

Пусть все коэффициенты многочлена  $p(x)$  - целые числа. Если целое число  $a$  является корнем многочлена  $p(x)$ , то  $a$  — делитель свободного члена многочлена  $p(x)$ .

# Свойства многочленов от одной переменной.

## Теорема 5.

Любой многочлен  $p(x)$  степени  $\geq 3$  разлагается в произведение многочленов первой и второй степени.

# Многочлены от нескольких переменных

Кроме одночленов от одной переменной выделяются ещё многочлены от двух и более переменных.

Среди многочленов от двух переменных выделяют *однородные* и *симметрические* многочлены.

# Многочлены от нескольких переменных

Многочлен  $p(x; y)$  называют **однородным** многочленом  $n$ -ой степени, если сумма показателей степеней переменных в каждом члене многочлена равна  $n$ .

Если  $p(x; y)$  – однородный многочлен, то уравнение  $p(x; y) = 0$  называют однородным уравнением.

# Многочлены от нескольких переменных

Систему уравнений  $\begin{cases} p(x; y) = a, \\ q(x; y) = b \end{cases}$  называют **однородной**, если

$p(x; y)$ ,  $q(x; y)$  — однородные многочлены одной и той же степени, а  $a$  и  $b$  — действительные числа.

# Многочлены от нескольких переменных

Многочлен  $p(x; y)$  называют **симметрическим**, если он сохраняет свой вид при одновременной замене  $x$  на  $y$  и  $y$  на  $x$ .

Теорема. Любой симметрический многочлен  $p(x; y)$  можно представить в виде многочлена от  $xy$  и  $x+y$ .



# Многочлены от нескольких переменных

Если  $p(x;y)$  – симметрический многочлен, то уравнение  $p(x;y) = 0$  называют симметрическим уравнением.

Систему двух уравнений с двумя переменными называют симметрической системой, если оба ее уравнения – симметрические.

**Деление многочленов с одной  
переменной «уголком».**

**Пример 1 :** Разделить уголком многочлен  $P(x) = 10x^2 - 7x - 12$  на многочлен  $Q(x) = 5x + 4$ .

<b>ДЕЛИМОЕ</b>	$10x^2 - 7x - 12$	$5x + 4$	<b>ДЕЛИТЕЛЬ</b>
	$-$	<hr/>	
	$10x^2 + 8x - 12$	$2x - 3$	<b>ЧАСТНОЕ</b>
<b>ПЕРВЫЙ ОСТАТОК</b>	$-15x -$	$3$	
	$-$		
	$15x - 12$		
	<hr/>		
	$0$		<b>ОСТАТОК</b>

Остаток равен нулю, поэтому многочлен  $P(x)$  делиться на многочлен  $Q(x)$

**Пример 2 :** Разделить многочлен  $P(x) = 3x^4 + 2x^2 - 1$  на многочлен  $Q(x) = x^2 + x$ .

$$\begin{array}{r}
 \underline{\phantom{0} 3x^4 + 0x^3 + 2x^2 + 0x - 1} \\
 \underline{3x^4 + 3x^3} \\
 \phantom{0} - 3x^3 + 2x^2 + 0x - 1 \\
 \phantom{0} \underline{- 3x^3 - 3x^2} \\
 \phantom{0} \phantom{0} 5x^2 + 0x - 1 \\
 \phantom{0} \phantom{0} \underline{- 5x^2 + 5x} \\
 \phantom{0} \phantom{0} \phantom{0} - 5x - 1
 \end{array}
 \left| \begin{array}{l}
 x^2 + x \\
 \hline
 3x^2 - 3x + 5
 \end{array} \right.$$

Степень остатка  $-5x - 1$  меньше степени делителя  $x^2 + x$ , деление закончено.

Ответ:  $3x^2 - 3x + 5$  — частное,  $-5x - 1$  — остаток.

# Формула деления многочленов с остатком

Если многочлен  $P(x)$  степени  $n > 1$  делит на многочлен  $Q(x)$  степени  $k \geq 1, k \leq n$  то справедливо равенство:

$$P(x) = S(x) \cdot Q(x) + R(x)$$

где  $S(x)$  – частное, степень которого  $m = n - k$ ,  $R(x)$  – остаток, степень которого  $l < k$ .

## Чтобы разделить многочлен $P(x)$ на многочлен $Q(x)$

### нужно:

1. Расположить делимое и делитель по убывающим степеням  $x$ ;
2. Разделить старший член делимого на старший член делителя; полученный одночлен сделать первым членом частного;
3. Первый член частного умножить на делитель; результат вычесть из делимого; полученная разность является первым остатком;
4. Чтобы получить следующий член частного, нужно с первым остатком поступить так, как поступали с делимым и делителем в пунктах 2 и 3.

**Пример 3 :** Разделить многочлен  $3x + 4x^4 + 1 - 15x^3 + 2x^5 - 9x^2$  на  
многочлен  $2x^2 - x^3$

$$\begin{array}{r|l} 2x^5 + 4x^4 - 15x^3 - 9x^2 + 3x + 1 & -x^3 + 2x^2 \\ \underline{2x^5 - 4x^4} & \hline 8x^4 - 15x^3 - 9x^2 + 3x + 1 & -2x^2 - 8x - 1 \\ \underline{8x^4 - 16x^3} & \\ & \hline & x^3 - 9x^2 + 3x + 1 \\ & \underline{x^3 - 2x^2} \\ & -7x^2 + 3x + 1 \end{array}$$

Ответ:  $-2x^2 - 8x - 1$  — частное,  $-7x^2 + 3x + 1$  — остаток.

# Свойства делимости многочленов

1. Если многочлен  $P(x)$  делится на многочлен  $Q(x)$ , а многочлен  $Q(x)$  делится на многочлен  $M(x)$ , то многочлен  $P(x)$  делится на многочлен  $M(x)$ .

2. Если многочлены  $P(x)$  и  $Q(x)$  делятся на многочлен  $M(x)$ , то многочлены  $P(x) + Q(x)$  и  $P(x) - Q(x)$  делятся на многочлен  $M(x)$ , а многочлен  $P(x) \cdot Q(x)$  делится на многочлен  $M^2(x)$ .



Найдите частное:

ОТВЕТЫ:

1)  $(x^2 + 3x - 4):(x + 4)$

1)  $x - 1$

2)  $(x^2 - 7x + 10):(x - 5)$

2)  $x - 2$

3)  $(6x^3 + 7x^2 - 6x + 1):(3x - 1)$

3)  $2x^2 + 3x - 1$

4)  $(4x^3 - 5x^2 + 6x + 9):(4x + 3)$

4)  $x^2 - 2x + 3$

5)  $(15x^3 - x^2 + 8x - 4):(3x^2 + x + 2)$

5)  $5x - 2$

6)  $(9x^4 - 9x^3 - x^2 + 3x - 2):(3x^2 - 2x + 1)$

6)  $3x^2 - x - 2$

# Домашняя работа.

Глава 3. § 1 стр. 92 – 96,

Упражнения №№ 1, 4 (всем), № 7 (по желанию) стр. 96 – 97.

# Использованная литература.

1. Ю.М.Колягин и др. «Алгебра и начала математического анализа». 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни. Под редакцией А.Б.Жижченко. 4-е издание. Москва. Просвещение, 2011.
2. Ю.М.Колягин и др. «Алгебра и начала математического анализа». 11 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. Профильный уровень. 8-е издание стереотипное. Москва. Мнемозина, 2010.
3. М.И.Шабунин и др. «Алгебра и начала математического анализа». Дидактические материалы. 10 класс. Профильный уровень. 3-е издание. Москва. Просвещение, 2011.
4. С.Н.Олехник и др. «Алгебра и начала анализа. Уравнения и неравенства». Учебно-методическое пособие для учащихся 10 – 11 классов. Москва. Экзамен. 1998.
5. С.М.Никольский и др. «Алгебра и начала математического анализа». 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни. 10-е издание. Москва. Просвещение. 2011.
6. М.И.Шабунин и др. «Математика. Алгебра. Начала математического анализа». Профильный уровень. Учебник для 10 класса. Москва. БИНОМ. Лаборатория знаний. 2009.
7. Н.Я.Виленкин и др. «Алгебра и начала математического анализа». Углубленный уровень. Учебник для учащихся 10 класса общеобразовательных организаций. 18-е издание стереотипное. Москва. Мнемозина, 2014.