

Кір. Краснуха



**Kip** – гостра вірусна хвороба, що характеризується вираженою інтоксикацією, катаром слизових оболонок дихальних шляхів, появою плямисто-папульозного висипу.



## Етіологія.

Збудник кору – вірус, нестійкий в зовнішньому середовищі, чутливий до впливу високих температур, УФО і дезинфікуючих засобів.

Джерело інфекцій – хвора людина.

Заразний період – з початку захворювання до 5 дня з моменту висипу.

Механізм передачі – повітряно-краплинний.

Сприйнятливість – висока, до 100%.



## Клініка.

### 4 періоди:

---

- інкубаційний;
- катаральний (початковий);
- висипання;
- пігментації (реконвалесценції).



**Інкубаційний період** – 9-11 днів, іноді, до 17.

**Катаральний період** – 3-6 днів.

**Симптоми:**

---

- підвищення температури ( $38^{\circ}\text{C}$  -  $39^{\circ}\text{C}$ , ранкова вище);
- тріада – кашель, нежить, кон'юнктивіт;
- одутлість обличчя, світлобоязнь;
- загальне нездужання (головний біль, дратівливість, зниження апетиту, порушення сну.
- поява плям Бельського-Філатова-Копліка (на слизовій щік);
- енантема (на твердому піднебінні, дужках, мигдаликах).







# Плями Бельського-Філатова- Копліка



# Енантема





## Період висипання

- підвищення температури 39°C-40°C;
- плямисто-папульозний висип, місцями зливається;
- етапність висипу:

1-й день – висип на обличчі, за вухами, на шиї.

2-й день – тулуб, проксимальні відділи кінцівок (стегна, плечі, руки).

3-й день – дистальні відділи кінцівок (гомілки, підошви, кісті).

Елементи висипки “цвітуть” 3 дні, з 4-го згасають, в тому ж порядку, що і з'являлись.




# 1-й день висипань

---





## 2-й день висипань





# 3-й день висипань





# Період пігментації

---

Елементи висипів згасають протягом 2-3 днів, перетворюються в бурувато-коричневі плями, переходять у дрібне висівкоподібне лущення.







# Ускладнення

---

- пневмонія;
- ларингіт;
- трахеїт;
- стоматит;
- бронхіт;
- коровий круп;
- менінгіти, енцефаліти.



# Діагностика

По клінічним проявам

## Лікування:

- ліжковий режим;
- часте вживання рідини;
- симптоматичне лікування.

## Профілактика:

- ізоляція хворого до 5-го дня з моменту висипань;
- карантин на 17 днів, при введенні імуноглобуліну – на 21 день;
- вакцинація: вакцина КПК (кір, паротит, краснуха) “пріорікс”, “трімовакс” 0,5 мл підшкірно в плече в 12 місяців, ревакцинація – в 6 років.



**Краснуха (червона висипка)** – гостра інфекційна хвороба, характеризується незначною інтоксикацією, дрібним плямисто-папульозним висипом та збільшенням лімфотичних вузлів, особливо, потиличних.

**Етіологія:** вірус, нестійкий, тропний до ембріональної тканини.

**Джерело інфекції:** хвора людина, з початку захворювання до 5-го дня з моменту висипу.

**Механізм передачі:** повітряно-краплинний



## Клініка.

Інкубаційний період – 14-21 день.

Симптоми:

---

- підвищення температури;
- нежить, кашель;
- поява плямисто-папульозного висипу по всій шкірі (за декілька годин), який не зливається, триває 1-3 дні і зникає безслідно;
- збільшення шийних і потиличних лімфатичних вузлів.















## Ускладнення:

- пневмонія;
- ларінгіт;
- отіт;
- артропатія;
- енцефаліт.

## Профілактика.

Ізоляція хворого на 5 днів з моменту висипу.

Карантин на 21 день.

Вакцинація: вакцина КПК (кір, паротит, краснуха),  
0,5 мл підшкірно в плече в 12 місяців,  
ревакцинація – в 6 років.