

С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ



КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

Биттеу (Pediculosis)

Жоспар

- **Кіріспе**
- **Биттеу**
- **Негізгі бөлім**
- **Биттеудің түрлері**
- **Анықтамалары**
- **Берілу жолдары**
- **Емі**
- **Қорытынды бөлім**
- **Пайдаланылған әдебиеттер**

Педикулез немесе биттеу

- **Педикулез** – адам денесінде биттердің, арнайы паразиттік жолмен тіршілік етіп, оның қанымен қоректенуін айтамыз. Педикулез – ауру адаммен қатынаста болған жағдайда, тіпті әлеуметтік жағдайы жақсы, жеке бас тазалығына көңіл бөлетін адамдарда да кездеседі.

Берілу жолдары

- **Қарым-қатынас кезінде:** биттеген адаммен қарым-қатынас кезінде, ұжымда, балалар мекемесінде, толық қоғамдық көлік ішінде, қарапайым жеке бас тазалығын сақтамаған жағдайда, яғни киім-кешек пен төсек орындарын, тарақты ортақ пайдаланған жағдайда жұғады.

Түрлері

- 1. Бастың биті (*Pediculi capitus*)
- 2. Киім-кешек биті (*Pediculi vestimenti*)
- 3. Қасаға биті (*Pediculi pubis*)



Головная вошь



Платяная вошь



Лобковая вошь



Бастың биті

- Сұр түсті, атасы 2-3мм, анасы 2,4-4мм. Бастың шашына түскенде ұзындығы 0,75-0,8мм ақшыл-сұр түсті сірке қалдырады, олар хитин затымен шашта мықты ұсталады. Бит шаққанда қышыма басталады. Қасығаннан болатын экскорациялар жиі пиококктық инфекциямен, көбінесе кәдімгі импетигомен асқынады



Обнаружение вшей



Воша



Яйца вшей (гниды)

Емі

- Асқынусыз биттеуде шашқа керосинді өсімдік майымен араластырып жағады да, қағаз салып байлап қояды. 8-10 сағат өткен соң шашты сабын қосып ыстық сумен жуады. Сіркені алу үшін шашты бірнеше күн мүсәтірмен сулап, содан кейін мақта салып ірі таракпен тарайды. Импетигомен асқынғанда 2-5% ақ сынап майын жағады

Киім-кешек биті

- Бастың битіне қарағанда атасы ірілеу : атасы 2,1-3,75мм, анасы 2,2-4,75мм ақшыл сұр түсті . Киім-кешектен, көйлектен бит денеге өтеді. Көбінесе киімнің теріге тиіп тұратын жерінде орналасуы мүмкін (бел, жауырын, балтыр, мойын) және қатты шаққаннан қышиды. Қасығаннан сызықша эксскориациялар түзіледі. Олар жиі пиогендік инфекциямен вульгарлы эктима немесе сыздауықпен асқынады. Созылмалы биттегенде тері өзгеріп, пигменттер және лихенификация пайда болады.



ЕМІ

- Жалпы гигиеналық шаралар жүргізіледі: киімді дезинфекциялау (қайнату, үтіктеу), көйлектерді камерада дезинфекциялау, моншада шомылу

Қасаға биті

- Оның көлемі өте кішкене- атасы 1мм, анасы- 0,5мм шамасындай. Ұмада, бұтаралықта, шапта, артқы тесіктің айналасында, сиректеу- кірпікте, сақалда орналасады. Жүн басқан кісілерде денесінің барлық жерінде болуы мүмкін. Биттер озіне тән қысқаш тәріздес құрылыммен жақсы ұсталынады. Шашта майда сіркелер табылады. Қарынның, кеуденің екі бүйірінің терісінде қасыған ізі, көкшіл дақ пайда болады және қышыма сезімі болуы биттеу бар екенін көрсетеді. Жыныстық қатынаста, бір төсекте жатқанда және киім арқылы жұғуы мүмкін.



Емі

- Шашты қырып, 5-10 –тік ақ сынап майымен немесе сынаппен күкірт қоспасын жағу, теріні алмас спиртінің ерітіндісімен сүрту керек.

Пайдаланылған әдебиеттер

- Тері және венерология аурулары. Есенгараева З.Б.
- Малдыбаева Н.М., Кешилева З.Б., Кубанова А.А.
- Google.kz.