

# «Разложение квадратного трёхчлена на множители»

Подготовила:

*Кичигина Надия Хамзеевна*

МБОУ СОШ №16

Хабаровск, 2014

Сократить дробь:

$$\frac{4}{12}; \frac{17}{51}; \frac{9}{27}; \frac{a^2}{a^4}; \frac{ax}{a^2 - x^2}; \frac{b + x}{b^2 - x^2}$$

Назовите коэффициенты квадратного уравнения:

а  $2x^2 - 7x + \frac{3}{4} = 0$

б  $-\frac{3}{7}x^2 - \frac{1}{3}x + 5 = 0$

в  $2x^2 - 7x + 3 = 0$

Преобразуйте в приведённое квадратное уравнение

$$2x^2 - 7x + 3 = 0$$

# Квадратный трёхчлен

- \* Квадратным трёхчленом называется многочлен вида

$$ax^2 + bx + c, \text{ где } x \text{ — переменная,}$$

$a, b$  и  $c$  — некоторые числа,

причем,  $a \neq 0$

Определите, какие из следующих выражений являются квадратным трёхчленом; ответ объясните.

а)  $3x^2 - 7x + \frac{1}{2}$

б)  $2x^3 + 5x - 1$

в)  $-4x^2 + \frac{1}{3}$

г)  $2x^2 + 5x$

\* Корнем квадратного трёхчлена  $ax^2 + bx + c$  называется значение переменной, при котором значение этого трёхчлена равно нулю.

\* Дискриминантом квадратного трёхчлена называется значение выражения  $D = b^2 - 4ac$

# Разложение квадратного трёхчлена на множители

Если  $x_1$  и  $x_2$  — корни квадратного трёхчлена

$$ax^2 + bx + c, \quad \text{то}$$

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$$



- \* Если квадратный трёхчлен имеет корни, то он раскладывается на множители.
- \* Если квадратный трёхчлен раскладывается на линейные множители, то он имеет корни.
- \* Если квадратный трёхчлен не имеет корней, то его нельзя разложить на линейные множители.

# Проверочная самостоятельная работа

- \* 1в. № 533(б), № 535(а), № 538(в)
- \* 2в. № 533(в), № 535(б), № 538(б)
- \* Оценочная таблица.

«3»	«4»	«5»
1 задание	2 задания	3 задания

# Домашнее задание.

\* П.3.7, №531(б,г), №533(д,е) , №538(г)



\*Спасибо за урок, дети.