



Апендицит

(його класифікація , симптоми захворювання, ускладнення і надання першої допомоги)

*ВИКОНАЛА СТУДЕНТКА 1 КУРСУ З ГРУПИ
ПОДЛЕСЕЦЬКА НАТАЛЯ*

Апендицит — захворювання, що зумовлюється запаленням апендикса — червоподібного відростка сліпої кишки; спричиняється мікроорганізмами (найчастіше — кишковою паличкою, стафілококом, стрептококом), які проникають у стінку відростка здебільшого з порожнини кишечника (рідше потрапляють з крові або лімфи).



ЩО ТАКЕ АПЕНДИКС?

- ◎ Апендикс - це орган, функцію якого наука так остаточно і не з'ясувала.
- ◎ Є теорія, що там міститься велика кількість корисних для нас бактерій.
- ◎ Інші вважають, що це відросток, який втратив свої функції у процесі еволюції.
- ◎ Ми мало замислюємось про апендикс, але всі бояться його запалення - апендициту.



Класифікація:

- *За перебігом* апендецит буває :
 - Гострий (характеризується швидким перебігом і виникненням серйозних ускладнень у перші дні (а то й години) захворювання),
 - Хронічний.
- *За ускладненнями*:
 - ✓ Неускладнений,
 - ✓ З ускладненнями.



Симптоми апендициту

- ◆ біль у верхній частині черева або в районі пупка;
- ◆ біль у нижній правій частині черева;
- ◆ втрата апетиту;
- ◆ нудота;
- ◆ блювання;
- ◆ діарея;
- ◆ закрепи;
- ◆ здуття живота;
- ◆ неможливість випустити газів;
- ◆ помірна лихоманка.



Спочатку біль може бути невеликим й ставати інтенсивнішим з часом.

Він може розпочатись спочатку зверху або в районі пупка і поступово перейти у нижню праву частину черева.

УСКЛАДНЕННЯ АПЕНДИЦИТУ (ГОСТРИЙ АППЕНДИЦИТ)

Гострий апендицит починається раптово; з'являється більш або менш різкий біль у правій половині живота, більше внизу. Інколи, напад болю починається у верхній ділянці живота або біля пупка. Нерідко виникають нудота і одноразове блювання. Легке натискування на стінку живота рукою і швидке відняття її спричиняє різкий біль. Загальна температура тіла підвищується до 38°C , пульс частішає.



ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ АПЕНДИЦИТІ

При підозрі на наявність симптомів апендициту, хворому потрібно:

1. Створити спокій,
2. Вкласти у постіль, 3. Прикласти холод (міхур з льодом, холодну воду) на живіт,
4. Негайно викликати лікаря або відправити на носилках до хірургічного лікувального закладу.





Хворим з підозрою на
аппендицит до огляду
лікаря забороняється:

1. Давати пити або вживати їжу;
2. Уводити знеболювальні речовини або давати інші ліки;
3. Промивати шлунок; застосовувати очисні клізми,
4. Зігрівати живіт грілками, компресами, приймати гарячу ванну.

ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ ПЕРІОД

У післяопераційний період основну увагу слід зосередити на профілактиці запалення легень, утворення пролежнів, випорожненні кишечника і відходженні газів, виділенні сечі.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ

