



# СПИД, синдром приобретенного иммунодефицита




□ СПИД — это стадия ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) инфекции, при которой иммунная система человека отказывается защищать своего хозяина.



ВИЧ заражает прежде всего клетки иммунной системы, а также некоторые другие виды клеток.





Вирус ВИЧ обнаруживается в  
следующих жидкостях организма:

- Сперма
- Кровь
- Лимфа
- Предсеменная жидкость
- Грудное молоко
- Влагалищный секрет

□ Изначально болезнь получила неофициальное название "болезни четырех Г" - так как была обнаружена у жителей или гостей Гаити, употреблявших героин. Схожими симптомами обладают два вируса иммунодефицита, которыми болеют два вида африканских обезьян: обыкновенные шимпанзе и дымчатые мангобеи. Вполне возможно, что вирус мутировал и преодолел межвидовой барьер.

- ▣ Ученые доказали, что ВИЧ образовался в Западно-Центральной Африке в конце девятнадцатого или в начале двадцатого века. СПИД был впервые описан Центрами по контролю и профилактике заболеваний США в 1981 году, а его возбудитель, ВИЧ, был описан в начале 1980-х.

- До настоящего времени не создано вакцины против ВИЧ, лечение ВИЧ-инфекции значительно замедляет течение болезни, однако известен только единичный случай полного излечения болезни в результате пересадки модифицированных стволовых клеток. Интересно, что за тридцать с лишним лет с того момента, как ученые открыли этот вирус, у некоторых наблюдаемых больных признаки и симптомы ВИЧ (СПИДа) до сих пор не проявились.



- ▣ В мире уже есть большое количество ученых, называемых СПИД-диссидентами, которые не разделяют навязываемую всему миру вирусную теорию смертельного СПИДа. Одним из доказательств их гипотезы является то что, обследованные жены 15 000 «ВИЧ-положительных» американцев почему-то не заразились вирусом, продолжая жить половой жизнью со своими мужьями.



- По данным Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу с 1996 по 2009 год мировые расходы на борьбу с этой болезнью возросли с \$300 млн до \$15,9 млрд в год.




**1 ДЕКАБРЯ**


**ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ  
БОРЬБЫ СО СПИДОМ**

▣ Африка к югу от Сахары остаётся наиболее затронутым регионом: здесь проживает 67 % всех людей, живущих с ВИЧ, и зарегистрирован 91 % всех новых случаев инфекции среди детей. В результате эпидемии более 14 миллионов детей в Африке к югу от Сахары стали сиротами. Эпидемия ВИЧ-инфекции привела к резкому снижению средней продолжительности жизни во многих африканских странах


Поширеність ВІЛ - інфекції серед вагітних у 2007 р.




Смертність від СНІД у 2007 р.  
на 100 тис. населення



Поширеність СНІД за даними диспансерного обліку на 01.01.2008  
на 100 тис. населення



Поширеність ВІЛ за даними диспансерного обліку на 01.01.2008  
на 100 тис. населення



# Різниця між ВІЛ і СНІД.

- Образець текста
  - Второй уровень
  - Третий уровень
  - Четвертый уровень
    - Пятый уровень

- СНІД є синдромом. Іншими словами, це сполучення захворювань та симптомів. Людина, заражена ВІЛ, може прожити довгі роки, перш ніж цей вірус призведе до СНІДУ. Ця схема ілюструє різницю між ВІЛ і СНІД. **В даний час не існує можливості лікування від СНІДУ.**





- Передача ВИЧ может происходить при сексе, переливании крови, использовании зараженных игл и шприцев; между матерью и ребёнком во время беременности, родов или при грудном вскармливании.

# ВІЛ/СНІД. ЦЕ ПОТРІБНО ЗНАТИ КОЖНОМУ!

## ЗНАННЯ – НАЙКРАЩИЙ ЗАХИСТ ВІД СНІДУ!

**ВІЛ** – вірус імунодефіциту людини. **СНІД** – синдром набутого імунодефіциту.

Це інфекційне захворювання, яке викликане ВІЛ та руйнує клітини захисної (імунної) системи організму людини. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я у світі зареєстровано понад 50 млн. людей, які живуть з ВІЛ-інфекцією. З них щороку помирає 3 млн. і ще 5 млн. стають носіями хвороби. В Україні носіями ВІЛ-інфекції є понад 150 тис. людей.

### ЩО ПОВИННО НАСТОРОЖИТИ?

- прогресуюча втрата ваги (при незмінному харчуванні);
- пітливість, неочікувана втома, тривалі проноси;
- незначне підвищення температури тіла понад 1 місяць без будь-якої причини;
- збільшення лімфатичних вузлів на шиї, в пахах, під пахвами.

**Знайте, що хвороба може себе не проявляти від 5-ти до 10-ти років!**

### ХТО МОЖЕ БУТИ ІНФІКОВАНИМ?

Жінка ти чи чоловік, незалежно від того скільки тобі років, де живеш, з ким спілкуєшся, ти не захищений від ВІЛ-інфекції. Кожен може заразитися. Але ти можеш і повинен захистити себе та інших від ВІЛ-інфекції. Для цього потрібно дотримуватись правил безпечної поведінки.

### ЯК ВБЕРЕГТИ СЕБЕ ВІД ВІЛ/СНІДУ?

- Уникати ситуацій, які несуть можливість інфікування, а саме:
- відмовитись від нерозбірливих статевих зв'язків з багаторазовою зміною партнерів;
- використання тільки стерильних одноразових шприців, голочок, медичного інструментарію;
- в побуті відмовитись від користування чужими предметами особистої гігієни (зубні щітки, бритви, манікюрні набори);
- обов'язково користуватись якісними презервативами;
- не вживати наркотики та алкоголь. Вони збільшують ймовірність ризикованої поведінки.

**Не можна ігнорувати проблемою ВІЛ і вважати, що вона нас не торкнеться. ЯК ПЕРЕДАЄТЬСЯ**

### ВІЛ-ІНФЕКЦІЯ?

- при використанні нестерильних шприців, голочок (після ін'єкцій, пірсингу, татуювання);
- при користуванні нестерильним медичним інструментарієм;
- переливання неперевіреної на ВІЛ-інфекцію крові;
- при статевих контактах з ВІЛ-інфікованою людиною без використання презервативів;
- від інфікованої матері до дитини під час вагітності та материнське молоко;
- передається вірус через кров, сперму, піхвові виділення, грудне молоко.

### ВІЛ/СНІД НЕ ПЕРЕДАЄТЬСЯ:

- повітряно-крапельним шляхом (чхання, кашель, перебування в одному приміщенні);
- через: укуси комах, домашніх тварин;
- спільне користування з ВІЛ-інфікованою людиною посудом, постільною білизною, рушником, ванною, басейном, туалетом, телефоном, комп'ютером, спортивним та гімнастичним інвентарем;
- поцілунок, піт, сльози, потиск руки, споживання їжі, ложки, виделки, ножі.



- В СССР первый случай СПИДа был зарегистрирован в 1982 году у ВИЧ-инфицированной девочки и ее матери, которая в 1978 году была невестой студента из Африки (тот через несколько лет умер от СПИДа).



- ▣ Отсутствие антиретровирусной терапии средняя продолжительность жизни с ВИЧ-инфекцией составляет от девяти до десяти лет, средняя продолжительность жизни на стадии СПИД составляет около девяти месяцев.



- ❑ Вирусы СПИДа при кипячении погибают через 1 мин, но при этом стойки к солнечным лучам и замораживанию.



- На сегодня вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) — самый изучаемый из всех вирусов. О ВИЧ опубликовано более 200 тыс. научных статей.

- ▣ За заражение другого человека ВИЧ-инфекцией или поставление его в опасность заражения ВИЧ-инфекцией в значительном числе государств предусматривается уголовная ответственность.

□ В Киеве, возле Киево-Печерской Лавры, в Канадской провинции Квебек и столице Латвии Риге были установлены памятники жертвам СПИДа.



- ▣ Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается ежегодно 1 декабря. Впервые он был провозглашён ВОЗ в 1988 году.

