


***СПАЗМОФИЛИЯ***

сәбидің алғашқы 6-18 айларында құрысу және түйілу халіне бейімділігімен сипатталатын этиопатогенезі мешел ауруына ұқсас сырқат. Көбінесе ер балаларда, көктем кезінде, күннің көзінде артығырақ болғанда кездеседі. Ауру айқын және жасырын түрлерге бөлінеді.



# Клиникалық айқындалуының 2 формасы бар:



## **ЛАРИНГОСПАЗМ**

*дауыс желбезектерінің тырысып дыбыс саңлауының тарылуы. Бала қиналып, шумен дем алады, реңінде қорқыныш, терлеп кетеді, есінен танып бірнеше секундтан соң шумен дем алады.*



## **ЭКЛАМПСИЯ**

*баланың барлық бұлшықеттерінің құрысып-тырысуы, аузынан көбік шығып, бала есінен айрылады.*





# *Ларингозпазм кезінде*



*Таза ауа жеткізу*



*Салқын су шашу*



*Құйрығынан ұру*



*Ылғалды оттегі беру*



# *Экларсия кезінде*



*Сабырлы жағдай жасау.*



*Баланы жұмсақ жерге жатқызып басын, қол-аяғын жарақаттанудан сақтау, басын бұру.*



*Ылғалды оттегі беру.*



*Құрысып-тырысуға қарсы дәрілерді егу: реланиум, валиум, седуксен, ГОМК, дроперидол.*



*Спазмофилияның алдын-алуы рахиттың алдын-алуымен қатар өткізіледі.*

# Емі

❖ Ауыр түрдегі жалпылама, клонико-тоникалық құрысулар, ларингоспазм және тыныс бітіп, ес жоғалту ұстамасы тез жандандыру шараларын керек етеді:

❖ жасанды дем алдыру

❖ 100% оттегі,

❖ құрысуды тарататын дәрі-дәрмектер беру.

**Әсіресе тәуір әсер беретін 0,5% седуксен:**

❖ 3 айлық сәбиге - 0,3-0,5 мл, бір жасқа дейінгіге - 0,5-1,0 мл

❖ 5 жасқа дейінгіге - 1,0-1,5 мл

❖ 10 жасқа дейінгіге- 1,5-2,0 мл (бұлшық етке не көктамырға) егіледі. Осы мақсатпен 20% ГОМК орташа мөлшері 100 мг/кг (әр кг дене салмағына 0,5 мл) беріледі. Осы екі дәріні қатар салуға болады, оның әсері тез және ұзағырақ.

❖ 2%-дық хлоралгидрат ерітіндісін 38-40°C-ге дейін жылытып, клизма жасауға, 25%-дық магний сульфатын бұлшық етке (0,2 мл/кг + 2,0 мл 0,5-1% новокаин) енгізуге болады.

❖ Қандағы кальций деңгейін тездетіп анықтаған соң 10% кальций хлоридін не глюконатын 0,05-0,5-1,0 мл (айына, жасына қарай) көктамырға енгізеді. Кейін оны ішкізуге болады (5-10% ерітіндінің 1 шай қасықпен 3 рет). Емдеу және нақтама қою мақсатымен жұлын пункциясын жасайды.

