

Обзор медицинских критериев приемлемости ВОЗ

Вера М. Злидар

*Консультант по планированию семьи,
Региональный проект по планированию семьи в
Европе и Евразии*

*Душанбе, Таджикистан, 2 июня
2008 г.*




USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

Europe and Eurasia Regional
Family Planning Activity




Четыре краеугольных камня - руководства ВОЗ по планированию семьи


Медицинские критерии приемлемости использования контрацептивов



Избранные практические рекомендации по использованию контрацептивов




Руководство для политиков и менеджеров программ



Инструмент принятия решения по планированию семьи для клиентов

Руководство для медработников и клиентов



Планирование семьи: общее руководство для медработников

Обоснование разработки клинического руководства

- Необходимость последовательности
- Рекомендации доказательной медицины
- Мнение эксперта в отсутствие доказательства
- Прозрачный процесс
- Консенсус

Медицинские критерии приемлемости - Процесс разработки

- Систематические обзоры литературы
- Синтез доказательств, представленных экспертам перед заседанием
- Заседание в ВОЗ для достижения консенсуса
- Участие врачей, ученых, исследователей со всего мира
- Встречи в 1994, 1995, 2000, 2003 гг. и в апреле 2008 г.

Как разрабатывались критерии

- Рабочая экспертная группа определила характеристики и состояния здоровья для включения
- Состояния классифицировались по четырем категориям для каждого метода
- Категория определяет, насколько безопасен или небезопасен метод для клиента с особым состоянием или признаком

Категории: временные и долгосрочные методы

Категория	Описание	При возможности клинического заключения
1	Нет ограничений в использовании	Использовать данный метод при любых обстоятельствах
2	Польза в целом превосходит риски	В целом, использовать данный метод
3	Риски в целом превосходят пользу	Использовать метод, который не всегда рекомендуется до тех пор, пока другие методы не будут доступны/приемлемы
4	Неприемлемый риск для здоровья при использовании метода	Не использовать данный метод

Source: WHO, 2004

Категории: временные и долгосрочные методы (2)

Категория	При ограниченности клинического обследования
1	Использовать метод
2	
3	Не использовать метод
4	

Source: WHO, 2004

Примеры

Состояние/ Характеристика	Метод	Категория
Эктопия	ВМС	1
Поверхностный тромбофлебит	КОК	2
Грудное вскармливание < 6 недель после родов	Депо-Провера	3
Рак груди в настоящее время	Гормональные имплантаты	4

Source: WHO, 2004

Категории: стерилизация

Метод допустим	Нет медицинской причины для отказа от стерилизации
Осторожно	Проводить в условиях обычной клиники, но с соблюдением дополнительных мер предосторожности
Отсрочка	Отложить до оценки и/или коррекции состояния. Предоставить временный альтернативный метод.
Специальные условия	Проводится опытным хирургом и персоналом; оборудование для обеспечения общей анестезии; другая дублирующая медицинская поддержка. Необходима возможность выбора соответствующей процедуры/режима анестезии. Предоставить временный альтернативный метод.

Source: WHO, 2004

Примеры: вазэктомия

Состояние/ Характеристика	Категория
ВИЧ-инфицирование	Допустим
Диабет	Осторожно
ИППП в настоящее время	Отсрочка
Паховая грыжа	Специальные условия

Source: WHO, 2004