

Причины женского бесплодия



Подготовила: студентка лечебного факультета 5 курса
24 группы
Кислая Ирина Михайловна

Актуальность

Бесплодие-отсутствие беременности при регулярной половой жизни без применения контрацептивов в течении одного года. В Беларуси не могут зачать ребенка около 15% супружеских пар. Соотношение женского и мужского бесплодия 40% и 30% соответственно. Еще в 30% случаях «виноваты» оба. Выделяют бесплодие **первичное**-при отсутствии в анамнезе женщины беременностей и **вторичное**-невозможность наступления повторной беременности.



Ведущими причинами женского бесплодия является:

- трубно-перитонеальный фактор (нарушение проходимости маточных труб);
- эндокринное нарушение;
- эндометриоз;
- анатомические нарушения (например, отсутствие матки);
- мужской фактор.



Цель исследования

Изучить наиболее частые причины женского бесплодия.




Методы исследования

Изучены 98 амбулаторных карт женщин с диагнозом бесплодие, наблюдающихся в поликлинике УЗ «Гродненского Областного Клинического перинатального центра».




Результаты

Средний возраст женщин составил 31 год (от 19 до 47 лет)






Бесплодие




Акушерско-гинекологический анамнез




Из анамнестических данных позднее наступление менархе (15 лет и старше) у 9(9,1%).

Причины бесплодия




Гинекологические операции перенесла
каждая вторая женщина.
На яичниках (20,5%)



- Двусторонняя цисэктомия
- Лактороскопическая декапсуляция яичников




На трубах (13,2%)




- Сальпингэктомия
- Сальпингоовариолизис



На матке (8,1%)




- лапараскопическая миомэктомия
- ампутация шейки матки



Гинекологические заболевания диагностированы у 53 женщин.



Экстрагенитальные заболевания диагностированы у
43 женщин.



Выводы

1. Наиболее часто причиной первичного бесплодия являются эндокринные нарушения.
2. Причины вторичного бесплодия - перенесенные воспалительные процессы придатков матки (41%), из них перенесли ИППП-(29,4%) и гинекологические операции(28%)
3. Эндокринные причины бесплодия в обеих группах выявляются у каждой пятой пациентки(21%).



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

