

Инфекционная заболеваемость в РФ за 2015 год

- К сожалению статистика неутешительная. За указанный период отмечился бурный рост следующих заболеваний
- Коклюш на 23%
- Клещевой вирусный энцефалит на 14,7%
- Иксодовые клещевые боррелиозы на 13,6 %

Заболеваемость (предварительная выборка)

Сибирская язва 5 случаев

Ботулизм 2

- При чем около 12 процентов пациентов госпитализированы в непрофильные стационары с последующим переводом

Лихорадочный синдром

- Глистные инвазии- (описторхоз, трихинеллез, шистосомоз)
- Тропические лихорадки
- Малярия
- Крымская, Омская геморрагические лихорадки
- Лептоспироз
- Брюшной тиф
- Бруцеллез
- Клещевой боррелиоз, Лайм боррелиоз

Вирусные инфекции

- Цитомегаловирусная инфекция
- Эпштейн-Барр вирусная инфекция
- ВИЧ инфекция
- Вирус гепатита

Эпидемиологическая настороженность

- Выезд в тропические страны
- Уточнение поездок по РФ
- Выезд на Алтай, Забайкалье, Сибирь, Дальний Восток, территории Южного Урала –эндемичны по клещевым инфекциям
- Ивановская область, Калужская область, Тверская область-Лайм боррелиоз

Контроль за лихорадящими больными

- Регламентируется нормативами, согласно приложению 8 все пациенты с лихорадкой неуточненного генеза должны быть проконсультированы не позднее 3-5 дня обращения в ЛПУ совместно с зав терапевтического отделения и инфекционистом, с регистрацией больного в Журнале лихорадящих больных Ф060

Катарально-респираторный синдром

- Гемофильная палочка
- Микоплазменная инфекция
- Хламидийная инфекция (респираторный хламидиоз)
- Туберкулез
- Атипичные микобактериозы
- Риккетсиоз
- Кокксиолез
- Пневмоцистозы
- Орнитоз
- Настораживающие критерии
- малоэффективный ответ на антибактериальную терапию, длительное течение заболевания, особенно волнообразного характера
- Длительное сохранение лихорадки от субфебрилитета до гектической
- Похудение, длительная

Катарально респираторный синдром (продолжение)

- Вирусные инфекции
- ЭБВ
- ЦМВ
- Орнитоз
- Легинеоллез
- Гельминтное поражение респираторного тракта
- Грибковое поражение респираторного тракта на фоне иммунодефицитных состояний
- Присоединение одышки, особенно при скудной рентгенологической картине
- Лимфоаденопатия (в том числе и ВГЛУ)
- Присоединение экзантем (сыпи различного характера)
- Присоединение кишечных расстройств

Поражение опорно-двигательного аппарата

- Хламидийные артриты
- Иерсиниозная инфекция
- Псевдотуберкулез
- Как осложнение сальмонеллеза
- Бруцеллез
- Лайм боррелиоз
- Наследуются
- остро возникшие артриты, особенно на фоне полного здоровья.
- Сочетание суставного синдрома с конъюнктивитом, сыпью

Поражение желудочно-кишечного тракта

Инфекционный мононуклеоз

- Эшерихиоз
- Гастроинтестинальная форма иерсиниоза
- Ботулизм
- Брюшной тиф
- Сальмонеллез
- Гепатиты вирусной этиологии

- Настораживающие факторы
- Нарастание интоксикации, эксикоза
- Желтухи
- Снижение диуреза
- Появление судорог в конечностях

Кишечные инфекции

продолжение

- Лептоспироз
- Туберкулезное поражение кишечника
- Грибковое поражение кишечника
- Аспергиллез,
- Бластомикоз
- Криптококкоз
- Последние поражения наиболее часты при иммунодефицитах , и сейчас наблюдается неутешительная тенденция-"туберкулез с социально благополучным лицом"
- И на фоне иммунодефицитов заболевание вызывает условно-патогенная флора.

Здесь приведены наиболее распространенные возбудители

- Но на самом деле нельзя сказать, какой именно штамм , в том числе из условно-патогенной флоры" взбунтуется против организма-хозяина ЧЕЛОВЕКА.
- Полезные бактерии становятся врагами и убийцами

Гепатоспленомегалия

- Цитомегаловирусная инфекция
- Эпштейн-Барр вирусная инфекция
- Гепатиты
- Малярия
- Бруцеллез
- Паратифы, брюшной тиф
- Длительное время выявляется лишь как случайная находка. И только спустя некоторое время начинается манифестация клинической картины в виде болевого синдрома различной степени интенсивности
- Гематологические проявления

Гепатоспленомегалия (продолжение)

- Лептоспироз
- Геморрагические лихорадки
- ВИЧ инфекция
- Корь
- Краснуха
- Орнитоз
- Псевдотуберкулез
- Сальмонеллез
- Вариабельность изменений на Узи от диффузных изменений до выраженных в динамике
- Высокий рост печеночных маркеров
- Оценка свертываемости крови

Синдром желтухи

- Гепатиты вирусной этиологии
- Цитомегаловирусная инфекция
- Эпштейн-Барр вирусная инфекция
- Вирусные геморрагические лихорадки
- Иерсиниоз
- Лептоспироз
- Малярия
- Токсоплазмоз
- Гельминтозы
- Амебиаз
- Фасциолез

Лимфоаденопатии

Рожа

- Тонзиллит различной этиологии
- Болезнь кошачьих царапин, укуса крыс
- Тактика динамического наблюдения, после исключения острой инфекционной патологии и хронических очагов инфекции

Хламидийная инфекция

Стрептококковая инфекция

Стафилококковая инфекция

Лимфаденопатии продолжение

- Туляремия

Сибирская язва

Риккетсиозы

Токсоплазмоз

Риккетсиоз

Сифилис вторичный

Псевдотуберкулез

Иксодовый клещевой
боррелиоз

- Вирусные инфекции

- ЦМВ

- ЭБВ

- Корь

- Краснуха

- Герпетическая инфекция

- ВИЧ

Мезоаденит

- При выявлении увеличенных внутригрудных лимфатических узлов, внутрибрюшных лимфатических узлов-бактериологическое исследование биоптата
- Диаскин тест с консультацией фтизиатра

