

Диагностика беременности.

Методы диагностики:

- Анамнез.
- Осмотр.
- Наружное акушерское исследование.
- Бимануальное исследование.
- Лабораторные методы.
- УЗИ.

Сомнительные признаки беременности:

- Вкусовые, обонятельные изменения, тошнота, рвота по утрам, диспепсические расстройства.
- Функциональные изменения ЦНС (бессоница, раздражительность, плаксивость, замкнутость).

Сомнительные признаки:

- Изменения обмена веществ (увеличение живота, пигментация).
- Появление рубцов беременности.

Вероятные признаки беременности:

- Отсутствие менструации.
- Изменения во влагалище, матке, молочных железах (синюшность слизистой влагалища, нагрубание, увеличение молочных желез).
- Лабораторные изменения (определение уровня ХГЧ).

Достоверные признаки:

- Определение частей плода в матке.
- Выслушивание сердечных тонов.
- Двигательная активность плода, определяемая рукой акушера.

Определение срока беременности:

- По последней менструации.
- По дате шевеления плода:
 - -у первородящих шевеление плода считают с 20 недель беременности;
 - - у повторнородящих с 18 недель беременности.

Определение срока беременности:

- По 1-ой явке. Наиболее достоверно при ранней явке в женскую консультацию до 12 недель беременности.
- По определению предлежащей части (головка, тазовый конец) определяется в 23 недели.

Продолжение:

- УЗИ.

Признаки беременности при бимануальном исследовании.

- 1. Признак Пискачека. Это куполообразное выпячивание в одном из углов матки, соответственно имплантации плодного яйца. (7-12 нед.)

Признак Гентера 1.

- По передней стенке матки определяется продольный гребневидный выступ, не переходящий на дно и шейку. По консистенции не отличается от других отделов матки. (5-8 недель).

Продолжение.

- Признак Гентера 2. Размягчен перешеек, вследствие чего матка наиболее выражено отклоняется кпереди.

Продолжение:

- Признак Снегирева состоит в уплотнении беременной матки при её пальпации.

Продолжение.

- Признак Горвица- Хегара.
Появляется в ранние сроки беременности. Размягчается перешеек и при бимануальном исследовании кончики пальцев легко сближаются.

Продолжение:

- Признак Гауса. Легкая смещаемость шейки матки во всех направлениях, не передающийся на тело матки.

Определение срока беременности:

- При бимануальном исследовании самый маленький срок, который можно определить, это 5 недель.
- В 8 недель беременности матка размером с гусиное яйцо.

Продолжение:

- В 12 недель матка размером с мужской кулак, тело матки доходит до верхнего края лона.

Определение срока беременности по ВДМ.

- 16 недель дно матки определяется на 6 см выше лона.
- 20 недель дно матки на 4см ниже пупка или на 12см выше лона.

Продолжение:

- 24 недели дно матки на уровне пупка, от лонного сочленения на 18-20см.
- 28 недель дно матки пальпируется на 26-28 см выше лона.

Продолжение.

- В 32 недели дно матки располагается между пупком и мечевидным отростком, стоит на 30-32см выше лона.
- В 36 недель беременности дно матки находится под мечевидным отростком. ВДМ 36см.

Предполагаемый срок родов:

- От даты последней менструации отнимают 3 месяца и прибавляют 7 дней.
- По дородовому отпуску.
- По 1 шевелению плода. У первородящих добавляют 20 недель, у повторнородящих-22 недели.

Продолжение:

- По сроку беременности, диагностируемому при первой явке.
- По УЗИ.