

# Социальные опасности

---

**Социальными** называют **опасности**, получившие широкое распространение в обществе и угрожающие жизни и здоровью людей.

Социальные опасности многочисленны и неоднородны по своему характеру, но существует одна особенность, которая их объединяет: **они несут в себе угрозу для большого количества людей**, даже если с первого взгляда кажется, что направлены они в адрес конкретной личности. Например, человек, принимающий наркотики, обрекает на страдания не только себя, но и своих родных, близких, друзей, вынужденных жить в страхе из-за «порока» небезразличного им человека.

# Социальные опасности

---

Выделяют следующие виды социальных опасностей:

- экономические – нищета, гиперинфляция, безработица, массовая миграция и др.;



# Социальные опасности

---

- политические – сепаратизм, чрезмерное проявление национализма, шовинизм, проблема национальных меньшинств, национальные конфликты, экстремизм, геноцид и др.;



# Социальные опасности

---

- демографические – рост населения планеты, незаконная миграция, перенаселение в одних странах и вымирание наций в других, социальные болезни (туберкулез, гепатит, СПИД);



# Социальные опасности

---

- семейные – алкоголизм, беспризорность, проституция, домашнее насилие, наркомания и др.



# Социальные опасности

Источниками социальных опасностей являются:

- несправедливое распределение собственности, доходов, жизненных благ, власти;



# Социальные опасности

- появление в обществе групп и политических сил, имеющих непримиримо противоположные интересы и цели;
- игнорирование или нежелание властей понять и разрешить сложности, с которыми ежедневно сталкивается население страны;



# Социальные опасности

---

- резкое снижение социальных возможностей государства вследствие падения производства, а также крупные просчеты государства, антисоциальная направленность его политики или принудительный характер его реформ;



# Социальные опасности

---

- недостаток внимания, уважения и любви со стороны близких и родных людей, невозможность самореализации, непризнанность.



# Социальные опасности

---

Самым опасным проявлением отклоняющегося от нормы поведения является преступность.

Преступность представляет собой акт посягательства на общественный порядок; это не стихийно возникшая опасность (как, например, природная), оно не возникает в силу природных явлений, неподвластных человеку, а осознанно исходит от личности и направлены против нее же.

# Социальные опасности

---

Преступность «расцветает» в обществе, в котором преобладают бедные слои населения, распространено бродяжничество, растет число неблагополучных семей, а наркомания, алкоголизм и проституция не воспринимаются большей частью общества как социальные проблемы.

Основными видами социально опасных преступлений являются террор, мошенничество, разбой, шантаж, изнасилование.

# Социальные опасности

1. **Мошенничество** – преступление, заключающееся в завладении чужим имуществом (или в приобретении прав на имущество) посредством обмана или злоупотребления доверием. Очевидно, что человек, ставший жертвой мошенничества, испытывает сильные психофизиологические потрясения.



# Социальные опасности

---

**2. Разбой** – преступление, целью которого является также завладение чужим имуществом, но, в отличие от мошенничества, оно предполагает применение насилия, опасного для здоровья или жизни людей.



# Социальные опасности

**3. Шантаж** – преступление, которое предполагает угрозу разоблачения какого-либо лица с целью получения от него различного рода материальных либо нематериальных благ. Шантаж как опасность оказывает отрицательное воздействие на нервную систему



# Социальные опасности

---

**4. Заложничество** – представляет собой преступление, заключающееся в захвате людей (нередко, женщин и детей) одними лицами с целью заставить выполнить определенные требования другими лицами.



# Социальные опасности

5. Террор – насилие с применением физической силы вплоть до физического уничтожения людей.



# Социальные опасности

---

**6. Наркомания** – сильная зависимость человека от приема наркотических веществ, что ведет к глубокому изменению физических и психических функций. Резкое прекращение приема наркотика вызывает нарушение многих функций организма – абстиненцию.



# Социальные опасности

---

Особенностью наркомании является то, что она **практически не поддается лечению**. Индивид, употребляющий наркотики, в состоянии такого опьянения не отдает отчета в своих действиях; его сознание затуманено. В момент эйфории стирается грань между реальностью и сном, мир кажется прекрасным, а жизнь радужной. Чем сильнее это ощущение, тем быстрее наступает привыкание. Однако наркотики – недешевое «удовольствие». В поисках средств для приобретения очередной дозы **наркоман способен на воровство, вымогательство, разбой с целью наживы, и даже убийство**.

# Социальные опасности

---

**7. Алкоголизм** – хроническое заболевание, обусловленное систематическим употреблением спиртных напитков. Алкоголику свойственна физическая и психическая зависимость от алкоголя, постепенная психическая и социальная деградация, патология внутренних органов, обмена веществ, центральной и периферической нервной системы.

# Социальные опасности

Особенностью алкоголя является то, что он очень быстро всасывается в кровь, через 5 минут он уже достигает головного мозга. Проникая внутрь живых клеток, алкоголь замедляет, ослабляет и даже останавливает их деятельность, нарушает работу органов и тканей.



# Социальные опасности

Кроме высокой подверженности опасностям самого алкоголика, он становится постоянным фактором риска и психического напряжения окружающих его людей.



# Социальные опасности

---

**8. Курение** – это вдыхание дыма некоторых тлеющих растительных продуктов (табак и др.).



# Социальные опасности

---

Рассмотрим действие на организм лишь некоторых веществ:

1. Оксид углерода CO (**угарный газ**) – взаимодействует с гемоглобином крови, который связывает этот газ в 200 раз прочнее, чем кислород. В связи с этим ткани тела получают значительно меньше кислорода. У того, кто выкуривает пачку сигарет в день, 6% гемоглобина связывается CO в карбоксигемоглобин. Если прибавить к этому значению оксид углерода загрязненного воздуха крупных городов, и количество карбоксигемоглобина возрастает до 10%, что серьезно увеличивает опасность смертельных сердечных приступов. Наличие в пище курильщика нитритов (например, в колбасных изделиях) еще более снижает содержание кислорода, превращая гемоглобин в метгемоглобин, неспособный транспортировать кислород.

# Отравление угарным газом

Что происходит в организме человека при воздействии на него угарного газа

## Угарный газ (CO)


Один из наиболее токсичных компонентов продуктов горения, входящих в состав дыма. Выделяется при тлении и горении почти всех горючих веществ и материалов

## Воздействие угарного газа

**2** Попадая в кровеносную систему, угарный газ связывается с гемоглобином, образуя карбоксигемоглобин

Гемоглобин – сложный железосодержащий белок обеспечивающий, перенос кислорода в ткани. Содержится в эритроцитах

**3** Карбоксигемоглобин блокирует передачу кислорода тканевым клеткам. Наступает гипоксия



**1** Угарный газ и кислород попадают в дыхательную систему человека



Карбоксигемоглобин – труднорастворимое соединение гемоглобина и угарного газа

Гипоксия – состояние кислородного голодания как всего организма в целом, так и отдельных органов и тканей

Наиболее чувствительными к гипоксии являются центральная нервная система, сердце, ткани почек, печени

## Симптомы отравления угарным газом

(содержание CO)

### Легкое отравление

**0,08%**

Головная боль, удушье, стук в висках, головокружение, боли в груди, сухой кашель, тошнота, рвота, зрительные и слуховые галлюцинации, повышение артериального давления

### Отравление средней тяжести

**до 0,32%**

Двигательный паралич, потеря сознания

### Тяжелое отравление

**выше 1,2%**

Потеря сознания после 2-3 вдохов, судороги, нарушение дыхания (человек умирает менее чем через 3 мин.)

## Первая помощь



Вызвать врача

## До приезда врачей:



В легких случаях отравления дать пострадавшему понюхать нашатырный спирт на ватке, выпить кофе или крепкий чай



При сильном отравлении, пострадавшего вынести на свежий воздух или надеть изолирующий противогаз, освободить от стесняющей дыхание одежды, придать телу удобное положение, при необходимости сделать искусственное дыхание

# Социальные опасности

---

2. Тяжелые металлы. Мышьяк и свинец являются компонентами пестицидов, используемых при выращивании табака. Растение накапливает эти элементы в тканях непосредственно при контакте с пестицидом или поглощает их из почвы, где они также хорошо депонируются. Содержание свинца в сигарете составляет около 13 мкг. Выкуривая двадцать сигарет в день, человек вдыхает около 300 мкг свинца. И свинец, и мышьяк, всасываясь в кровь, могут накапливаться и постепенно отравлять организм.

# Социальные опасности

---


Исследования показывают, что смертность среди курильщиков вдвое выше, чем среди некурящих того же возраста. Особенно часто подстерегают курильщиков скоропостижные смерти от сердечных приступов и кровоизлияний в мозг. Нередки у них и желудочно-кишечные язвы. Большой вред наносит курение беременным женщинам – у них рождаются мелкие дети, наблюдается больше выкидышей и случаев мертворождения. Все это обусловлено недостатком кислорода в крови матери.

# Социальные опасности

---

В первую очередь курение затрагивает легкие: это одна из главных причин эмфиземы и рака легких (85% случаев). Курильщики часто болеют и раком гортани, пищевода, ротовой полости, мочевого пузыря, почек, поджелудочной железы.

При «пассивном курении» некурящие люди за 1 час вдыхают столько вредных веществ дыми, сколько они могли бы получить, если бы они сами выкурили одну сигарету.



**Легкие некурящего  
человека!!!**



**Легкие курильщика  
с небольшим стажем!!!**




**Легкие заядлого  
курильщика!!!**

# Социальные опасности

---

**9. Венерические заболевания – СПИД, гонорея, сифилис и др.** Социальная опасность венерических болезней определяется их широким и быстрым распространением, тяжелыми последствиями для здоровья самих заболевших и опасностью для общества. Кроме всего прочего, зачастую больные скрывают от окружающих правду относительно состояния своего здоровья, безответственно вступают с ними в половую связь, распространяя тем самым инфекцию огромными темпами.



# Социальные опасности

Венерические болезни при неправильном лечении принимают длительное течение, **приводящее иногда к инвалидности**. Так, гонорея может служить причиной многих женских болезней, мужского и женского бесплодия, сифилис передается потомству, вызывая врожденные уродства, слепоту, глухоту.



# Социальные опасности

---

Современные средства и методы позволяют полностью излечивать большинство венерических заболеваний при своевременном обращении за врачебной помощью и аккуратностью лечения.

По Уголовному кодексу РФ (ст. 121) установлена ответственность за заражение другого лица венерической болезнью лицом, знавшим о наличии у него этой болезни.

# Социальные опасности

---

Однако существуют и неизлечимые венерические заболевания, такие как СПИД. Заболевание СПИДом по масштабам относят к эпидемии. Главной причиной его распространения остаются беспорядочные половые связи.



# Социальные опасности

---

**10. Суицид.** Особенность самоубийства заключается в том, что смерть является делом рук самого потерпевшего и всегда представляет насильственный акт. По данным ВОЗ в мире ежегодно совершается более 500 тысяч самоубийств и примерно 7 миллионов попыток. В России показатель суицидов составляет около 77 случаев на 100 тысяч населения.



# Социальные опасности

---

Существует убеждение, что кончают с собой психически больные люди. На самом деле они составляют лишь 25-27%, еще 19% - это алкоголики. Большая часть самоубийц – это здоровые люди. Специалисты убеждены, что суициды – это результат влияния социальной среды, подрывающей веру человека. Намерение лишиться себя жизни появляется у человека в условиях, когда он оценивает ситуацию как неразрешимый конфликт. Причин самоубийств много. Это – болезни, предательство, тяжелые условия жизни, проблемы отцов и детей, любовные отношения, религиозное влияние и т.п. Покушений на самоубийство больше у женщин (в 8-10 раз), завершенных суицидов – у мужчин (в 4 раза). В настоящее время наблюдается рост самоубийств среди детей и подростков.



# Социальные опасности

---

Профилактика суицидов заключается в психологических, педагогических и социальных мероприятиях, направленных на восстановление утраченного психологического и физиологического равновесия человека.

Защита в целом от социальных опасностей заключается в профилактических мероприятиях, направленных на ликвидацию этих опасностей.