

Природные зоны Северной Америки



Никифорова. А

Зона Арктических пустынь

- Здесь вечные ледники и снега, за короткое лето здесь образуются скудная растительность из мхов и лишайников.



МОХ
→



Зона тундры



- Занимает северное побережье материка и прилегающие к нему острова. Тундрой называют безлесные пространства субарктического пояса, покрытые мохово-лишайниковой и кустарничковой растительностью на скудных тундрово-болотных почвах.

Животные тундры



← овцебык

- У овцебыков густая длинная шерсть, закрывающая ноги почти до копыт, и направленные вниз рога, слившиеся в основании наподобие шлема. Родина мускусных быков — американские материковые тундры и острова от Аляски до Гудзонова залива, включая Гренландию.





- Северный олень — единственный представитель копытных, способный существовать в открытой северной тундре и на островах Ледовитого океана. Питается главным образом лишайниками (ягелем), травой, почками и побегами кустарников.



- Волк — самый крупный представитель семейства волчьих. Они по-прежнему могут приспосабливаться к любым условиям обитания. Этому во многом способствуют развитые формы социального поведения: совместная охота, деление добычи между всеми членами стаи.

На побережьях моржи и тюлени привлекают МНОГО ОХОТНИКОВ



Птичий мир тундры



Тундровая
куропатка



Сокол-сапсан

Белая сова





Белые гуси



Тундровые
лебеди



Тайга




- Тайга- это зона умеренного пояса, в растительности которого преобладают хвойные деревья. Почвы тайги образуются в условиях холодной и снежной зимы и влажного прохладного лета.

Растительность тайги




В тайге растут
черная и белая
ель, пихта,
лиственница и
сосна.



Хищники тайги



- На кончиках ушей у рыси — кисточки. Это некрупное млекопитающее семейства кошачьих-свирепый хищник.



- Куница — гибкий проворный зверек. Преследуя добычу, куница может прыгать с ветки на ветку. Характерная черта куницы — желтое пятно на горле, остальной мех бурый.

Лось




Кабарга



Лось



Медведь гризли



Зона смешанных лесов




- *В районах с умеренным климатом растут смешанные леса. Здесь зима не слишком холодная, а лето теплое. Осадки выпадают в течение всего года. Почвы серые лесные и бурые лесные. Они содержат больше перегноя, чем почвы тайги.*



Собралась прекрасная компания:

- Дубы, орешники,
буки, пихты, осины,
ясени, липы, березы,
ели и сосны



Зона широколиственных лесов





- Зона лесов на склонах Кордильер отличается от лесной зоны на равнинах. Виды растений и животных здесь иные.

Секвойя



- Секвойи - хвойные деревья высотой более 100 метров, диаметром до 9 м. Растут в субтропических горных лесах на побережье Тихого океана.

От малого до великого



- В этом лесу из вечнозеленых секвой человек кажется таким маленьким! Самые высокие секвойи растут в Северной Америке, в Йосемитском национальном парке (США, штат Калифорния).

Зона степей



Степи — огромные ровные пространства, поросшие высокими травами. Деревьев в степи нет, потому что им не хватает влаги. Климат в степях достаточно теплый: жаркое засушливое лето с редкими дождями и умеренно холодная влажная зима. Многие растения начинают цвести ранней весной, как только сойдет снег, пока еще не очень жарко и хватает влаги в почве.

Животные степи

Лиса



Хомяк



**Луговая
собачка**



Суслик малый



Сайгак




Прерии



- Переходную полосу между степями и лесами Северной Америки называют прериями. Они повсеместно изменены человеком – распаханы или превращены в выгоны для скота. Освоение прерий повлияло на их животный мир.

Зона пустынь



- На внутренних плоскогорьях Кордильер лежат пустыни умеренного пояса; основные растения здесь черная полынь и лебеда.
- В субтропических пустынях мексиканского нагорья растут кактусы.