

ОСНОВНЫЕ ВАРИАНТЫ ЗАДЕРЖКИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

(по К.С. Лебединской)



Выполнила:
Гумерова С.
студентка 482 группы
факультета УНК

ЛЕБЕДИНСКАЯ
КЛАРА
САМОЙЛОНА

**Клара Самойловна
выделила четыре
основных варианта
задержки
психического
развития.**



ЗАДЕРЖКИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ.

I. ЗПР конституционного
происхождения.

II. ЗПР соматогенного
происхождения.

III. ЗПР психогенного
происхождения.

IV. ЗПР церебрально-
органического генеза.



I. ЗАДЕРЖКА ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ.

(гармонический, психический и психофизиологический инфантилизм)

Инфантильный тип телосложения с детской пластичностью мимики и моторики. Эмоциональная сфера этих детей находится как бы на более ранней ступени развития, соответствуя психическому складу ребенка более младшего возраста: яркости и живости эмоций, преобладанию эмоциональных реакций поведения, игровых интересов.



- «Гармоничность» психического облика иногда нарушается в школьном и взрослом возрасте, так как незрелость эмоциональной сферы затрудняет социальную адаптацию.



- «Инфантильная» конструкция может быть сформирована в результате негрубых, большей частью обменно-трофических заболеваний, перенесенных на первом году жизни.



II. ЗАДЕРЖКА ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СОМАТОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ.

При соматогенной задержке психического развития эмоциональная незрелость обусловлена длительными, нередко хроническими заболеваниями, пороками развития сердца и т.д.



Хроническая физическая и психическая астения тормозит развитие активных форм деятельности, способствует формированию таких черт личности, как робость, боязливость, неуверенность в своих силах.



Copyright © 2007 Emilie Wood. All right Reserved.



III. ЗАДЕРЖКА ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПСИХОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Связана с неблагоприятными условиями воспитания.



В условиях безнадзорности может формироваться патологическое развитие личности с ЗПР по типу психической неустойчивости: неумение тормозить свои эмоции и желания, импульсивность, отсутствие чувства долга и ответственности.



IV. ЗАДЕРЖКА ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЦЕРЕБРАЛЬНО-ОРГАНИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА.

Причины церебрально-органических форм ЗПР (патология беременности и родов, инфекции, травмы нервной системы в первые годы жизни) в определенной мере сходны с причинами олигофрении. Это сходство определяется органическим поражением ЦНС на ранних этапах онтогенеза.



Признаки замедления темпа созревания часто обнаруживаются уже в раннем развитии и если молодые мамы заметили что-то неладное в своем ребенке, то им следует сразу обратиться к специалистам. Они всегда помогут!

