Функции $y = tgx$ и $y = ctgx$, их свойства и графики

Определение

Тангенсом угла α называют число, равное отношению sin α к cos α, обозначают tg α, т. е.

$$tg\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$$

$$\alpha \neq \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in Z$$

Тангенс определён для всех углов α, кроме тех, для которых косинус равен нулю

Для любого угла α ≠ π/2 + πk, kЄZ существует, и притом единственный tg α

Ось тангенсов

$$tg\frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$$

$$tg\frac{\pi}{4} = 1$$

$$tg(-45°) = -1$$

$$tg120° = -\sqrt{3}$$

$$tg180° = 0$$

$tg90° =$ **не существует**



Тангенс может принимать любые значения от $-\infty$ до $+\infty$

Определение

Котангенсом угла α называют число, равное отношению cos α к sin α, обозначают ctg α, т. е.

$$ctg\alpha = \frac{\cos\alpha}{\sin\alpha}$$

$$\alpha \neq \pi k, k \in Z$$

Котангенс определён для всех углов α, кроме тех, для которых синус равен нулю

Для любого угла α ≠ πk, kЄZ существует, и притом единственный ctg α

Ось котангенсов



$$ctg\frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$ctg\frac{\pi}{4} = 1$$

$$ctg(-45°) = -1$$

$$ctg120° = -\frac{\sqrt{3}}{3}$$

$ctg180° =$ Не существует

$$ctg(-90°) = 0$$

Котангенс может принимать любые значения от $-\infty$ до $+\infty$

Построение графика функции y = tg x, если x Є [− π ⁄2; π ⁄2]



x	y=tg x
0	0
±π ⁄6	≈ ± 0,6
±π ⁄4	± 1
±π ⁄3	≈ ±1,7
±π ⁄2	Не существ.

Построение графика функции y = tg *x*.



Свойства функции y=tg *x*.



Нули функции: **tg *x* = 0 при *x* = πn, nєZ**

y>0 при xє (0; π/2) и при сдвиге на π*n*,*n*єZ.

y<0 при xє (-π/2; 0) и при сдвиге на π*n*, *n*єZ.

Свойства функции y=tg x.



При $x = \pi / 2 + \pi n$, $n \in Z$ **- функция y=tg*x* не определена.**

Точки $x = \pi / 2 + \pi n$, $n \in Z$ **– точки разрыва функции.**

Запишите все свойства функции $y = \mathrm{tg}\, x$.

1. Область определения:
2. Множество значений функции:
3. Периодическая, Т=
4. Нечётная функция
5. Возрастает на всей области определения.
6. Нули функции у = 0 при х =
7. у > 0 при х∊ и при сдвиге на
8. у < 0 при х∊ и при сдвиге на
9. При $x =$ - функция $y = tgx$ не определена.

Имеет точки разрыва графика



y
x
1
-1
0
-2π
-3 π/2
-π
-π/2
π/2
π
3 π/2
2π
y = tgx + a
y = tgx
y = tgx – b



y
x
1
-1
0
- 2π
- 3 π/2
- π
- π/2
π/2
π
3 π/2
2π
y = tgx
y = tg(x – a)



y
x
1
-1
0
-2π
-3π/2
-π
-π/2
π/2
π
3π/2
2π
y = tgx
y = ItgxI

Функция *y* = ctg *x*

y=ctg x

1. **Область определения данной функции – все действительные числа, кроме чисел $x=\pi k$, $k \in Z$.**

2. **Область значений функции – все действительные числа.**
3. **Функция убывает на интервалах**

$$(\pi k;\pi+\pi k), k\in Z$$

4. **Функция нечетная, график ее симметричен относительно начала координат.**
5. **Функция периодическая, ее наименьший положительный период равен π.**



Задача №1.

Найти все корни уравнения $tgx = 1$, принадлежащих промежутку $-\pi \le x \le 3\pi/2$.

<u>Решение.</u>

1. **Построим графики функций $y=\mathrm{tg}x$ и $y=1$**



2. $x_1 = -3\pi/4$
   $x_2 = \pi/4$
   $x_3 = 5\pi/4$

Задача №2.

Найти все решения неравенства *tgx* < − 1, принадлежащие промежутку –π ≤ *x* ≤ 2π .

1. Построим графики функций *y* = tg*x* и *y* = −1



2. $x \in (-\pi/2; -\pi/4)$; $x \in (\pi/2; 3\pi/4)$; $x \in (3\pi/2; 7\pi/4)$