

**Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік
Медицина Университеті**

**Тақырып: Созылмалы тонзиллит емі кезінде « Тонзилор» аппаратын
қолданудың тиімділігін анықтау .**

**Қабылдаған: Қошмағанбетова Г.К
Орындаған: Мусакулов Ибадулла
Резидент-оториноларинголог**

Актобе 2017год

Сұрақ:

7-15 жас аралығындағы созылмалы тонзиллитпен асқынуымен ауыратын балаларда соңғы бай ішінде «тонзилор» аппаратын қолдану, тек кана антибактериальді терапияны қолданатын балалармен салыстырғанда тиімді ме ?

- **Мақсаты:**

7-15 жас аралығындағы балаларда
созылмалы тонзиллит ауруыну
жиілігін жиілігін азайту

- **P**-7-15 жас аралығындағы созылмалы тонзиллиттің жиі асқынуы кездесетін балалар .
 - **I**- “Тонзиллор”аппаратын қолдану .
 - **C**- тек қана антибактериальді терапия қолдану.
 - **O**- созылмалы тонзиллит асқыну жиілігінің томендеуі .
 - **T**- 6 ай.

Тапсырма:

- 7-15 жас аралығындағы созылмалы тонзиллит асқынуымен ауыратын науқастар тобын алу
- Тек қана антибактериальді терапия алған науқастармен салыстыру(цефтриаксон 100мг/кг).
- Бадамша безінен жуғынды алу.
- бай бойы алынған топты бақылау.
- 6 айдан соң асқыну жиілігін бақылау ушін аналарын сурастыру.

- Азжілікті ультрадыбысты тонзиллор аппараты созылмалы тонзиллиттің интенсивті терапиясында қолданылады. Оның негізгі қызметі қысқа толқындар арқылы бадамша безіне препарат сіңімділігін арттыру (0.1 % сутегі ерітіндісі) .

Таңдау:

- Таңдау критерийлері:
- 1-Енгізу критерийі :
- 7-15жасаралығындағы созылмалы тонзиллитпен жиі асқынатын балалар;
- 2-критерии исключений:
- Туберкулезбен ауырған балалар,
- Жедел инфекциялық аурулармен ауыратын балалар,
- Жане де баска да созылмалы ауыратын балалар (созылмалы бронхит, трахеит, и.т.д.)
- Таңдау әдісі: Ұынғайлы.
- Генеральная совокупность: 7-15 жас аралығындағы созылмалы тонзиллиттің жиі оршуімен ауыратын 80 науқас алынды. г.Актобе. КДП №4. 80 бала.
- 80 бала 2 топқа бөлінді.

Дизайн:

- РБЗ. Экспериментальді, .

ЭТИКАЛЫҚ АСПЕКТИЛЕР:

*Ата-анасынан руксат алынуы
Этикалық комитетпен рұқсат етілді.
Зерттеу жүргізуге ақпараттық келісім
алынды,
Кез-келген уақытта зерттеуден бас
тартуға құқылы;
Науқастардың қызығушылығымен болған
әрекет, мәжбүрлеудің болмауы.
Науқастарға қауіп төндірмөу.*

- **Celecoxib Versus Placebo in Tonsillectomy: A Prospective, Randomized, Double-Blind Placebo-Controlled Trial.**
 - [Van Daele DJ](#)¹, [Bodeker KL](#)², [Trask DK](#)³.
 - [Author information](#)
 - **Abstract**
 - **OBJECTIVES:**
 - Celecoxib is a cyclooxygenase-2-specific inhibitor indicated to treat acute pain and pain secondary to osteoarthritis and rheumatoid arthritis. Surgical models of acute pain have demonstrated superior pain relief to placebo. The objective of this study was to test the safety and efficacy of celecoxib for pain relief after tonsillectomy compared to placebo.
 - **METHODS:**
 - Adult subjects were randomized to 200 mg celecoxib versus placebo with a loading dose the night before surgery then twice daily for 10 days. Subjects were instructed to supplement the study drug with hydrocodone/acetaminophen liquid or acetaminophen for pain as needed. Subjects completed a daily diary regarding their pain, nausea, vomiting, diet, and activity.
 - **RESULTS:**
 - Seventeen subjects enrolled. Intraoperative blood loss was similar between groups, and no subject had postoperative bleeding. Three patients returned to the emergency department for treatment, and 2 patients could not complete the diaries, all in the placebo group. Subjects in the placebo group required statistically significant ($P < .05$) higher doses of narcotic and acetaminophen to control pain. Pain and diet rating scores were slightly better in the celecoxib group compared to placebo.
 - **CONCLUSIONS:**
 - In this small cohort, celecoxib reduced postoperative narcotic and acetaminophen requirements compared to placebo without complications.

- **Сұрак** : Тонзилоэктомия операциясынан кейін целекоксибті қолдану ауырсынуды басатын препараттарға қарағанда операциядан кейінгі, ауырсынудың жиілігін азайта алады ма?
- **P-** Тонзилоэктомия операциясынан кейінгі науқастар.
I- целекоксибті қолдану
C-ауырсынуды басатын препараттар
O- ауырсынудың азаюы

РБЗ, бақыланған топ, екі жақты жасырын

Пайдаланған әдебиеттер

Тізімі:

- [http://simptomer.ru/bolezni/otolaringologiya
/187-tonzillit-simptomy](http://simptomer.ru/bolezni/otolaringologiya/187-tonzillit-simptomy)
- [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2735
7971](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27357971)
- Википедия

назар аударғаныңызға рахмет!!!