АНКСИОЛИТИКИ или ТРАНКВИЛИЗАТОРЫ

Группы	Препараты
1.Агонисты бензодиазепиновых рецепторов	**Диазепам, Феназепам, Мезапам, Мидазолам, Триазолам**
2. Агонисты серотониновых рецепторов	**Буспирон**
3. Вещества разного типа действия	**Мебикар, Амизил, Оксилидин**

Транквилизаторы

* **Препараты с преимущественно седативным действием:**

Феназепам

Амизил

* **«Дневные»:**

Мезапам

Мебикар

* **Без выраженных седативных свойств, оказывающие стимулирующее действие:**

Триоксазин



Рецептор на постсинаптической мембране - это

БД-ГАМК-Cl^- - ионофорный комплекс

Фармакологические эффекты:

* Анксиолитическое действие (снимают страх, тревогу, устраняют эмоциональную возбудимость)
* Седативное действие
* Снотворное (мало влияют на структуру сна)
* Миорелаксирующее
* Потенцируют действие снотворных, наркозных средств
* Противосудорожное действие
* Амнестическое действие
* Ряд из них оказывает антиаритмическое действие, расширяют коронарные сосуды, улучшают мозговое кровообращение.

ТРАНКВИЛИЗАТОРЫ

виды действия на организм

- Гипно-седативное
- Вегето-корригирующее
- Выраженное **АНКСИОЛИТИЧЕСКОЕ** (противотревожное)
- Миорелаксирующее
- П/судорожное

Применение

* неврозы и психические заболевания с неврозоподобными расстройствами
* ситуационные и тревожные состояния (стоматологическая процедура)
* терапевтические заболевания с психоэмоциональными нарушениями (стенокардия, инфаркт миокарда, язвенная болезнь)

Применение

* бессоница
* купирование эпилептического статуса, абстинентного синдрома
* премедикация

Побочные эффекты:

* **Миорелаксация, вялость, сонливость, атаксия**
* **Изменяется правильная оценка ситуации (т.е. степень опасности)**
* **Нарушается внимание, быстрота реакции, координация движений**
* **Нарушение памяти**
* **Нарушение менструального цикла, снижение половой потенции, кожные высыпания**

ивопоказания

* В первые 3 месяца беременности
* Не рекомендуется их назначение работникам транспорта

Побочные эффекты:

* **При длительном приеме - привыкание и развитие лекарственной зависимости (психическая и физическая)**

* **Синдром отмены протекает в менее тяжелой форме, чем в случае физической зависимости к барбитуратам**

* **Все они тератогенны**

Буспирон

* Влияет на серотонинергическую систему
* Частичный агонист 5-НТ1А-рецепторов
* Не оказывает седативного действия
* Не обладает противосудорожной и миорелаксирующей активностью
* Проявляет эффект через 2 недели
* Не вызывает лекарственную зависимость
* Привыкание выражено слабо