

ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ БАШКИРИИ



За более чем 200-летний период изучения орнитофауны на территории современной Башкирии было отмечено 304 вида птиц. Из них в зимний период было встречено 84 вида птиц.



Полевой воробей

Несколько видов птиц зафиксировано в зимний период всего по одному разу: лебедь-кликун, хохлатая чернеть, сапсан, дербник, зарянка, чомга, краснозобая казарка, моёвка, вяхирь.



Лебедь-кликун



Хохлатая чернеть, самец



Сапсан



Чомга или большая поганка



Вяхирь

По характеру пребывания всех зимующих птиц Башкирии можно разделить на 4 категории: оседлый, залётный, кочующий и случайно зимующий.



Большая синица

Сизый голубь



Оседлые виды, такие как сизый голубь, большая синица, домовый и полевой воробьи, буроголовая гаичка, обыкновенный поползень, черноголовый щегол и другие составляют основу зимней орнитофауны Башкирии.



Белая сова, самка

Белая сова, подорожник, пуночка и некоторые другие являются залётными видами.


Белая куропатка



К кочующим видам относятся, например, белая куропатка и обыкновенный снегирь.



Пуночка

A white swan with a long neck and a bright orange beak is swimming in blue water. The swan is facing right, and its reflection is visible in the water. The background shows some dry reeds or grasses.

Лебедь-шипун

Краснозобую казарку, лебедей (шипунa и кликуна), болотную сову, обыкновенного скворца, зарянку, зяблика, обыкновенную овсянку, обыкновенную зеленушку и некоторых других можно отнести к случайно зимующим птицам.



Болотная сова

Обыкновенный скворец



Зарянка




Зяблик, самец






Обыкновенная зеленушка, самец

Кряква, самец



В последние десятилетия на зимовке в Башкирии стала оставаться кряква.

Сорока



Часть птиц проводит зиму в населённых пунктах и их самых ближайших окрестностях, так как в городе или деревне пернатым легче найти себе пропитание.

К таким птицам принадлежат сорока, серая ворона, свиристель, рябинник, большая синица, полевой воробей.



Серая ворона

Свиристель



Рябинник




К постоянно обитающим на территории городов и деревень (синантропным) видам птиц относятся сизый голубь и домовый воробей.



Домовый воробей

И в лесу, и населённых пунктах можно встретить большого и малого пёстрых, белоспинного и седого дятлов, желну (или чёрного дятла), сойку, обыкновенного снегиря.



Большой пёстрый дятел

Малый пёстрый дятел




Белоспинный дятел





**Желна или
чёрный дятел**




Обыкновенный снегирь, самец

На окраинах городов и на деревенских огородах можно застать стайки черноголовых щеглов, которые питаются семенами сорных трав - репейника, полыни.



Черноголовый щегол

Длиннохвостая синица или ополовник



Также зимой в лесу или населённых пунктах можно встретить длиннохвостую синицу или ополовника (прозвана так за свой длинный хвост и маленький размер тела - всё это в целом делает птичку похожей на миниатюрный половничек, с чёрными глазками-бусинками и чёрным клювиком).

А ещё зимой встречается буроголовая гайчка (другое её название - пухляк; птица и в самом деле частенько, особенно в сильные морозы, распушается и становится похожа на пуховой шарик с хвостом и на тоненьких ножках).



Буроголовая гайчка или пухляк

A small bird with a red forehead and breast, perched on a dry branch. The bird has a yellow beak and is looking to the right. The background is a soft, out-of-focus grey.

Обыкновенная чечётка

В смешанных лесах и в поймах рек зимой обычна обыкновенная чечётка (это – наш гость с севера). Встречается этот вид и в населённых пунктах республики.

Чиж в Башкирии в небольшом количестве гнездится, но зимой стайки чижей становятся заметнее. Зимой чижи часто посещают города, где кормятся семенами берёзы.



Чиж, самец

В отдельные годы, при хорошем урожае семян хвойных деревьев, обычен клёст-еловик.



Клёст-еловик, самец

Ястреб-тетеревятник



Из дневных хищных птиц на зимовку остаются ястреба - тетеревятник и перепелятник.

Из отряда Курообразные зимой встречаются такие виды, как рябчик (в Башкирии встречается 2 подвида рябчиков), глухарь (также 2 подвида - белобрюхий глухарь и таёжный, с тёмным брюхом), тетерев, серая куропатка.



Рябчик, самец

Глухарь, самец





Тетерев, самец

Серая куропатка встречается на безлесных склонах, на лугах, полянах и огородах.

Серая куропатка



Сойка зимой предпочитает держаться поближе к людям, посещает кормушки, промышляет на деревенских дворах.



Сойка

A Long-tailed Nighthawk (Ural Nighthawk) is perched on a tree branch. The bird has a mottled pattern of brown and white feathers, a yellowish-brown beak, and large, dark eyes. The background is a blurred forest scene with green and brown foliage.

Длиннохвостая или уральская неясыть

Не часто можно встретить такие виды, как длиннохвостая неясыть, трёхпалый дятел, черноголовая гаичка, желтоголовый королёк (самая маленькая наша птичка, которая весит всего 6-8 грамм).



Трёхпалый дятел

Желтоголовый королёк





Обыкновенные поползни и обыкновенные пищухи часто в послегнездовой и зимний периоды предпочитают держаться с синицами (большой и длиннохвостой, буроголовой гаичкой, обыкновенной лазоревкой, московкой) в одной компании, образуя с ними общие стайки, к которым иногда присоединяются одиночные большие пёстрые дятлы.

Обыкновенная пищуха

Обыкновенный поползень





Оляпка

Есть в Башкирии зимой ряд редких видов птиц, встреча с которыми может считаться настоящей удачей. Это, например, оляпка (другое, народное её название - водяной воробей). Эту птицу и летом-то не часто можно встретить на горных реках, а зимой она обитает только возле незамерзающих участков рек, где, ныряя в воду и бегая по дну, ловко ищет свою добычу - личинок ручейников (потому и названа она водяным воробьём).

В сосновом или смешанном сосново-берёзовом лесу можно встретить один из самых симпатичных наших видов синиц - хохлатую синицу или гренадёрку.

Хохлатая синица



Также немногочисленны встречи с совами - мохноногим и воробьиным сычами, ястребиной совой, бородатой и серой неясытью.



Мохноногий сыч

Воробьиный сыч



Ястребиная сова





**Серая или
обыкновенная
неясыть**
(*рыжая морфа)

A male chaffinch (Щур) is perched on a branch with several clusters of bright red cherries. The bird has a reddish-pink head and neck, a greyish-blue back, and a white belly. It is looking towards the right, with its beak slightly open as if about to eat one of the cherries. The background is a soft, out-of-focus light blue.

Щур, самец

Если очень повезёт, то можно встретить щура (зимующий в Башкирии вид), обыкновенного дубоноса (остаются зимовать отдельные особи) и пуночку (прилетает с севера России, обычно встречается вдоль дорог и на больших полянах).

Как видите, птиц в наших краях на зиму остаётся не так уж мало. И если быть внимательными, упорными и не бояться морозов, то даже зимой можно увидеть много интересного и красивого.



Седой дятел



**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!**

**Обыкновенный
дубонос**

**Фото: Уколов И., Попов Е., Подмарёв А., Полежанкина П.,
Левашкин А., Коваленко А., Логинов Н., Забугин В., Уткин Д.
Презентацию подготовила Полежанкина П., к.б.н., с.н.с. ФГБУ «БГЗ»,
пред. Бюро Центрального совета Союза охраны птиц России**