

ВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СОБАК



Чума собак

- ✓ Рвота, диарея
- ✓ Пневмония (воспаление легких)
- ✓ Нервные расстройства
- ✓ Высокая смертность (50%)
- ✓ Высокая температура
- ✓ Выделения из носа и глаз
- ✓ Гиперкератоз

Источниками инфекции являются:

- Больные животные
- Недавно переболевшие животные
- Животные в инкубационном (скрытом) периоде

Как происходит заражение:

- Воздушно-капельным путем
- Через предметы ухода
- Через одежду, обувь, на руках
- Через мочу, кал, со слюной

Инкубационный период (скрытый) — от 3 дней до 3 недель.

При сверхостром течении заболевания температура тела собаки может повышаться до 40–41 градуса. Животное отказывается от еды. Наблюдается резкое ухудшение общего состояния, появляется сильный насморк, а также конъюнктивит . После наступления коматозного состояния, когда уже наблюдается сильное поражение нервной системы, животное погибает на 2-3 день.

При подостром и остром течении болезнь длится от 2 до 4 недель. Взрослые собаки с хорошим иммунитетом выздоравливают уже на 3–5-й день, а клинические проявления наблюдаются в виде угнетения состояния и высокой температуры.

Инфекционный гепатит собак

- ✓ Рвота
- ✓ Желтуха
- ✓ Почечная недостаточность
- ✓ Смертность (10%)
- ✓ Отек роговицы глаза (20%)
- ✓ Высокая температура тела
- ✓ Потеря аппетита
- ✓ Жажда

Источником инфекции являются:

- Вирусоносители
- Больные животные
- Вирус выделяется во внешнюю среду с мочой, калом, слюной.

Как происходит заражение:

- Через корм
- Через предметы ухода
- Через подстилку

Инкубационный период продолжается у собак 6 – 10 дней

При молниеносном течении смерть наступает внезапно при явлениях судорог. При остром течении выражены угнетение, потеря аппетита, жажда, рвота, диарея, выделения из носа, конъюнктивит с обильным слезотечением.

На 6 – 10-й день у 20 – 50% больных животных развивается помутнение роговицы одного или обоих глаз.

В ряде случаев отмечают желтушность слизистых оболочек, кровоизлияния и изъязвления десен, судороги, параличи.

Болезнь продолжается обычно 2 – 4 дня, иногда 2 недели. Нервные расстройства иногда могут возникнуть и в период выздоровления.

Парвовироз (парвовирусный энтерит)

- ✓ Обезвоживание
- ✓ Рвота и диарея с кровью
- ✓ Внезапная сердечная недостаточность
- ✓ Высокая температура
- ✓ Высокая смертность среди щенков (70%)
- ✓ Потеря аппетита

Источниками инфекции являются:

- Больные животные
- Недавно переболевшие животные
- Животные в инкубационном (скрытом) периоде

Как происходит заражение:

- Воздушно-капельным путем
- Через предметы ухода
- Через одежду, обувь, на руках
- Через мочу, кал, со слюной

Инкубационный период составляет 3-7 дней.

Вирус-возбудитель

парвовируса поражает лимфоидные ткани (костный мозг, селезенка, лимфатические сосуды) сразу после попадания в организм, затем переносится с кровью **в кишечник, легкие, печень и почки** – с этого момента заболевание начинает проявляться. У щенков, инфицированных в первые 4 недели жизни, возможно поражение сердечной мышцы.

Парагрипп и питомниковый кашель

- ✓ Высокая температура
- ✓ Кашель
- ✓ Респираторные расстройства
- ✓ Высокая контагиозность (заражение)
ПИТОМНИКОВ

Болезнь чаще всего диагностируют в начале весны, осенне-зимний период.

Заражение происходит:

- Воздушно-капельным путем
- При контакте с больным животным
- При контакте с бродячими животными, на выставках, в местах общего выгула собак
- При стрессе – снижение иммунитета
- При транспортировке животного

Инкубационный период у инфицированных парагриппом собак составляет **от нескольких дней до месяца**.

Интенсивность проявления зависит от общего физиологического состояния животного, состояния иммунитета, условий содержания. Продолжительность болезни составляет 7-10 дней и заканчивается выздоровлением, если было своевременно назначено эффективное лечение.

Основным клиническим проявлением парагриппа у собак является затяжной сухой кашель, приступы которого усиливаются во время физических нагрузок.

Лептоспироз

- ✓ Потеря аппетита
- ✓ Желтуха
- ✓ Анемия (бледность слизистых оболочек)
- ✓ Смертность 20%
- ✓ Поражения желудочно-кишечного тракта
- ✓ Повышение температуры
- ✓ **ПЕРЕДАЕТСЯ ЧЕЛОВЕКУ!**

Заражение происходит:

- При контакте с больным животным
- Через корм
- Через укусы клещей и насекомых
- При купании собак в инфицированных водоемах
- При вязке
- Через корм и воду

Инкубационный период при лептоспирозе собак колеблется от 2 до 12 дней.

Источники возбудителя:

- Больные и переболевшие животные, выделяющие лептоспиры из организма во внешнюю среду вместе с мочой, калом, молоком, а также с выделениями из легких и половых органов.

Срок лептоспироносительства у собак составляет от нескольких месяцев до 3-4 лет.

При острой форме лептоспироза продолжительность болезни составляет 1-4 дня, иногда 5-10 дней, летальность может достигать 60-80%.

Подострая форма лептоспироза характеризуется аналогичными симптомами, но они развиваются медленнее и менее выражены. Болезнь продолжается обычно 10-15, иногда до 20 дней, если имеются смешанные или вторичные инфекции. Летальность при подострой форме составляет 30-50%.

Бешенство

- ✓ Неврологические расстройства
- ✓ Параличи
- ✓ Агрессия
- ✓ Укусы
- ✓ Светобоязнь
- ✓ Извращенный аппетит
- ✓ 100% смертность
- ✓ **ПЕРЕДАЕТСЯ ЧЕЛОВЕКУ!**

Инкубационный период при бешенстве составляет 14-60 дней, но иногда достигает 6-12 месяцев.

Клинические признаки заболевания бешенством появляются чаще всего через 3-8 недель после заражения. У собак и кошек клинически различают в основном две формы болезни: буйную (агрессивную) и тихую (паралитическую).

Буйная форма проявляется последовательно сменяющимися тремя стадиями: первая - начальная, вторая – возбуждения и третья – паралитическая.

На первой стадии отмечается изменение в поведении собак: животное становится очень ласковым или же наоборот – настороженно, постоянно разгрызает место укуса. Аппетит снижен или извращен – поедание несъедобных предметов, слюнотечение, рвота. Длительность такого состояния 1-4 дня.

Во второй стадии отмечается сильное возбуждение, агрессия, извращенный аппетит, старается спрятаться или убежать. Появляются конвульсии, высокая температура, рвота, параличи – глотки, гортани, конечностей, нижняя челюсть отвисает, из пасти вытекает слюна. Лай становится хриплым, заглушенным. Длительность такого состояния 2-3 дня.

Третья стадия характерна резким истощением животного, параличом конечностей, гибелью животного.

Длительность такого состояния 2 -4 дня.

Общая продолжительность клинических признаков при буйной форме болезни составляет 6-11 дней.

Тихая форма бешенства у собак и кошек клинически характеризуется общей депрессией, без стадии возбуждения. Быстро наступают параличи мышц конечностей и туловища. Болезнь длится всего 2-4 дня, и животное погибает.

Источником возбудителя инфекции являются зараженные животные.

Заболевания возникают в основном в осенне-зимний и зимне-весенний периоды.

Профилактикой данных заболеваний
является своевременная вакцинация
животного!

Вакцинировать животных начинают с 3-х
месячного возраста – ДВУКРАТНО!