



ВИЧ/СПИД

Лукашик Ярослав

9 "А"



ВИЧ

- Вирус иммунодефицита человека
- Размножается в клетках иммунной системы
- Передается через кровь, сперму, вагинальный секрет и материнское молоко
- Вне организма жить не может



Пути передачи ВИЧ

- Незащищенный половой контакт
- Переливание крови
- Применение нестерильных медицинских инструментов
- Ребенку от ВИЧ-инфицированной матери



Группа риска

- Раньше – преимущественно наркоманы, проститутки, гомосексуалисты
- Сегодня – любой человек, практикующий опасное поведение

ВИЧ-инфекция

- В момент заражения человек не испытывает необычных ощущений
- С момента заражения может заражать других людей
- Долго текущее заболевание с длительным периодом бессимптомного течения
- ВИЧ-инфекция неизлечима
- Конечная стадия - СПИД



Тест на ВИЧ

- Выявляет антитела к ВИЧ через 3-6 месяцев после заражения
- С момента заражения и до 3 месяцев – период серонегативного окна – человек заражен, но анализ этого не показывает



СПИД

- СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита
- Длится от нескольких месяцев до 2-3 лет
- Характеризуется возникновением различных оппортунистических инфекций
- Летальность 100%



ВИЧ/СПИД в цифрах

- В мире сейчас примерно 50 млн. ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом
- Ежедневно инфицируются ВИЧ 16 тыс. человек
- 70-80% заразились половым путем

ВИЧ/СПИД в цифрах

- В России около 300 тыс. ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом
- Темпы развития эпидемии самые высокие в мире
- Раньше 90% заражались путем внутривенного введения наркотиков
- Сейчас до 50% заражается половым путем
- Становится все больше детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей



Способы борьбы с эпидемией

- Профилактика ВИЧ
- Лечение ВИЧ-инфицированных матерей
- Помощь ЛЖВС