

ҚАРАҒАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
Медициналық психология және коммуникативті дағдылар
кафедрасы

Тақырыбы: ЖИТС-пен ауыратын науқастардағы комплаенс

Орындаған: Мұртазаева М.С

6-086 топ ЖТД

Тексерген: Халмуратова С.Е

Қарағанды 2018

Жүре пайда болған (ЖИТС, СПИД ағылш. AIDS) иммундық дефицитінің синдромы - Вич фоньнда дамьтын күй - лимфоциттердің құлау сипаттайтын CD4+нің саны, көптік оппортунистік инфекциялар, инфекция емес және ісік ауруларымен (Human immunodeficiency virus, HIV ағылшынша) инфекция.



Ғалымдардың есептеуі бойынша ЖИТС (СПИД) ең алғаш 20 ғасырдың 70 жылдары АҚШ, Гаити, Африкада тіркелген, 1979-81 жылдары Нью-Йорк пен Лос-Анжелес дәрігерлері адамдардан иммунитеттің нашарлығын байқаған. Олар қан тамырының ісігі (саркома Капоши) және пневманияның сирек формасымен ауыратын адамдар. 1982 жылы ауруларды бақылау орталығы жаңа ауру ЖИТС-ты тіркеді. 1983 жылы француз Люком Монтанье мен американдық Роберт Галло ауру қоздырғышы туралы алғашқы мәлімет айтты.

1981 жылы Америкада (Атланта) ауруды бақылау комитетінің баяндауы бойынша гомосексуалистер арасында өкпе қабынуынан және сирек болатын жаңа түзінді /денеде/ сияқты бұрын таралмаған түсініксіз аурулардың көбеюі үреймен баяндалған. Бұл аурудағы иммундық жүйені толық жоятындығынан бұл вирус АИВ (адамның иммунитет тапшылық вирусы) деп белгіленеді.

ЖИТС – бірте-бірте дамитын, кейде 5 жылға созылып, адамды ақыры өлімге жеткізетін кесел. ЖИТС-пен ауру-өлім жазасына кесілгенмен бірдей. Себебі дүние жүзінде осы уақытқа дейін әлі оны толық жазатын ем жоқ. Тек қана бірақ жол-ол сақтану, алдын алу.



р, жігіт пен
ауырған адамдар
Инфекция көзі

жұқтыру көзі
болып табылады.

Ешқандай ауру

белгілері

байқалмайтынды

қтан әсіресе

вирус

тасымалдаушыла

р өте қауіпті.

Вирус көп

мөлшерде қанда,

спермада, қынап

кілегейінде,

емшек сүтінде

болады. Көз

жасында, жұлын

сұйығында,

сілекейде өте аз

мөлшерде болуы

мүмкін (ЖИТС

- Жұғу жолдары
- жыныстық қатынас;
 - вирустың бірден қанға түсуі (әртүрлі инъекциялар жасаған кезде т. б. жағдайларда);
 - анасынан нәрестеге жұғу арқылы.

Пути передачи ВИЧ



секс без
презерватива



от ВИЧ+
матери
к ребенку




нестерильные
шприцы



переливание
крови

Основные пути передачи ВИЧ-инфекции



PODROBNOSTI.UA

Әртүрлі инфекциялардан сақтанудың ең тиімді тәсілі — вакцина егу. Алайда вакцина дайындау бағытында тыңғылықты зерттеулер жүргізіліп жатса да, ондай профилактикалық препарат алу әзірше қолдан келмей отыр.



ЖИТС-пен науқастанудан сақтанудың маңызды шаралары:

әлеуметтік, шаралар

Халықаралық шаралар

мемлекеттік шаралар

жеке басты қорғауға бағытталған шаралар.

Оларға мыналар жатады:

- салауатты, әдепті өмір сүру;
- кездейсоқ жыныстық қатынастан және гомосексуалист, жезөкшелермен жақындасудан сақ болу (жыныстық партнер көп болған сайын ЖИТС жұқтыру қаупі арта түседі. Г. В. Сколубовичтің. (1989) айтуы бойынша, «Жыныстық тәртіпсіздік, нашақорлық және жезөкшелік — ЖИТС вирусын жұқтыру кепілі»);
- стерильденбеген немесе кездейсоқ біреудің шприцін, қайшысын, сақал алғышын және басқа да құрал-жабдықтарын пайдаланбау;
- әсіресе терісі, шырышты қабаттары зақымданған жағдайда бөтен біреудің қанымен, бөлінділерімен жанасудан абай болу;

— қан құйғанда немесе донор қанынан дайындалған препараттар қабылданғанда олардың АИВ-ке тексерілгеніне көз жеткізу (ол үшін қолданылған қанның сериялық нөмерін жазып алыңыз);

— маникюр, педикюр жасайтын құралдардың стерильдігіне көңіл аудару;

— ЖИТС вирусын жұқтырып алдым-ау деген күмәнді жағдайда міндетті түрде дәрігерге көріну.

Кез-келген азамат АИВ-инфекциясының жұққан-жұқпағандығын анықтау үшін Алматыда, Астанада, еліміздің басқа да ірі қалалары мен облыс орталықтарында ашылған лабораторияларға барып тексерілуіне болады.

АИТВ келесі жағдайларда жұқтырылмайды:

ВИЧ не меняет человека, не делает его опасным.

ВИЧ **не** передаётся, **когда вы**

пользуетесь
общей посудой



плаваете
в бассейне



принимаете душ



пользуетесь
общим туалетом



разговариваете
друг с другом



обнимаете
друг друга



пожимаете руки



целуете



В мире не зарегистрировано ни одного случая
передачи ВИЧ-инфекции бытовым путем.

Толерантность



www.livehiv.ru

ДӘРІГЕР ЖАСАУ КЕРЕК

Комуникативті дағдыларды ұстану

Жақсылап тыңдау

Анамнез жинау

Комплаенс



Компаенсті жоғарылататын факторлар

5

Принято считать, что^[1]:



MyShared

1. Pheul W, J. (1987) 180 1997, 241 (4): 317-28

Дәрігерге тұрақты қаралу
Емді жүргізуді қалау
Асқыныстар дамуынан қорқу
Қосымша аурулардың болуы
Отбасы мен достарының қолдауы
Емнің қолжетімділігі

Комплаенске қатысты мәселелерді шешу жолдары

- ✓ Науқасты ауруы мен емі жөнінде ақпаратандыру
- ✓ Терапияның жеке режимін таңдау
- ✓ Әлеуметтік көмекпен қамтамасыздандыру (отбасы, достары, ұқсас науқастар көмегі)
- ✓ Басқа мамандармен бірігіп жұмыс атқару

