


ІРІҢДІ ҚАБЫНУ АУРУЛАРЫНЫҢ ҚОЗДЫРҒЫШТАРЫ

Бактериялар пішінінде қарай бөлінеді:

◦коккалар (шар тәрізді);

бациллалар (таяқша пішінді);

спириллалар (оралма тәрізді);

вибриондар (үтір пішінді).

Кокки

диплококк



стафилококк



стрептококк



сарцина



стрептококк



сарцина



стафилококк



Кокктар –
микроорганизмдер
дің үлкен тобы.
Олар патогенді,
шартты –
патогенді,
патогенді емес
болады. Кокктар –
микроорганизмдер
дің үлкен тобы.
Олар патогенді,
шартты –
патогенді,
патогенді емес
болады.

Берджи жіктеуі бойынша патогенді кокктар 3 тұқымдастыққа біріктіріледі:

1) Micrococcaceae-Staphylococcus туыстағына стафилококктар жатады.

2) Streptococcaceae-Streptococcus туыстағына стрептококктар мен пневмококктар жатқызылады.

3) Neisseriaceae-Neisseria туыстағына менингококктар мен гонококктар жатқызылады.

- Патогенді кокктардың жалпы белгісі іріңді – процесі ауруларды тудырады. Барлық патогенді кокктар қозғалмайды, спора түзбейді, ал пневмококктар капсула түзуі мүмкін. Тинкториальдық (боялуы) қабілетіне қарай : Грам “оң” және “теріс” болады. Патогенді кокктар бір – бірінен қоректік орталарда өсуі және биохимиялық қасиеттері бойынша ажыратылады.

- Стафилококктар 1897 жылы Луи Пастер анықтаған

- Аурулары: Пиодермия, шиқан, көршиқан, іріңдіктер, баспа және т.б.

- Стрептококктар 1897 жылы Бильрот, 1879 жылы Л.Пастер ашқан, 1884 жылы Э. Розенбах зерттеген.

- Аурулары: Жайылмалы іріңдік, жараның іріңдеуі, тыныс жолдарының қабынауы, тілме, ревматизм

- Пневмококктар 1874 жылы Р. Кох анықтаған

- Аурулары: Өкпенің қабынуы, ортаңғы құлақтың қабынуы, көздің мөлдір қабығының жарасы

- Менингококктар 1887 жылы Вексильбаум ашқан

- Аурулары: Назофорингит, менингококкцемия, эпидемиялық менингит

- Гонококктар 1879 жылы Нейсер ашқан. Оның құрметіне туыстастықтың аты аталған

- Аурулары: Соз (гонорея), көз былшықтануы (бленорея)

