


Дагестанская государственная медицинская академия  
Кафедра инфекционных болезней им. академика Г. П. Руднева

**ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  
ХРОНИЧЕСКИМИ ВИРУСНЫМИ  
ГЕПАТИТАМИ В И С  
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН  
ЗА 2009-2014 гг**

*Маммаева Н.З.  
студ. 510 гр. леч. фак*



**Вирусные гепатиты (ВГ) – группа инфекционных заболеваний человека, вызываемая вирусами, различными по своей природе, путям их передачи от больного человека к здоровому и имеющими один общий признак – поражение печени.**

**На сегодняшний день известно 10 вирусов:**

**А, В, С, D, E, G, F, TTV, SEN, NEV, вызывающие соответствующие гепатиты.**

**Гепатиты, вызываемые вирусами В, С, D, помимо острой формы болезни могут переходить в хроническую форму заболевания.**

**Количество инфицированных вирусом гепатита В (HBV) в мире достигает более 400 млн. человек. Частота развития хронизации при HBV составляет около 30%.**

**Количество инфицированных вирусом гепатита С (HCV) в мире достигает более 170 млн. человек. Частота развития хронизации составляет 70-80 %.**

## **Цель работы:**

**Провести анализ заболеваемости хроническими вирусными гепатитами В и С в РФ и РД за 2009-2014гг.**

## **Материалы и методы исследования:**

**эпидемиологический анализ статистических данных ГБУ РД «Республиканский центр инфекционных болезней» г. Махачкала по заболеваемости населения Республики Дагестан хроническими вирусными гепатитами В и С за 2009-2014 гг.**

**Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости хроническими вирусными гепатитами в республике сложная, во-первых в связи с вариабельностью показателей не только по отдельным административным территориям, но и по республике в целом, и во-вторых, по причине достаточно большой группы «неактивных» носителей HBsAg, одномоментное обследование которых по стандарту затруднительно на многих территориях из-за недоступности лабораторной диагностики.**

# Результаты

- За 2014 год проведено более 217 тыс. исследований на маркеры ВГВ и более 236 тыс. исследований на маркеры ВГС среди контингентов групп риска.
- Охват обследованием составил 82,4% и 89,7% соответственно.

# Сравнительная заболеваемость вирусными гепатитами В и С в РД и РФ в 2009-2014 гг.

Год		ХГВ	ХГС
2009	Абс.	55	85
	РД	2,07	3,2
	РФ	14,36	40,79
2010	Абс.	66	83
	РД	2,41	3,03
	РФ	13,26	40,18
2011	Абс.	65	108
	РД	2,37	3,95
	РФ	13,04	40,18
2012	Абс.	121	163
	РД	4,13	5,56
	РФ	12,64	39,14
2013	Абс.	164	193
	РД	5,60	6,59
	РФ	11,71	39,26
2014	Абс.	164	249
	РД	5,52	8,38
	РФ	11,26	39,94

**В 2014 году в сравнении с 2013 годом показатель заболеваемости ХГВ в республике снизился на 0,4%, а заболеваемость ХГС в 2014 году выросла на 27,2%, при этом было зарегистрировано 249 случаев против 193 случаев - в 2013 г.**

**Уровень заболеваемости ХГВ в 2014г ниже среднефедеративного в 2 раза, а уровень заболеваемости ХГС в РД ниже среднефедеративного в 4,8 раз.**

■ По данным ГБУ РД «РЦИБ»:  
на диспансерном учете по поводу ХГВ в РД  
состоит 1462 больных, в т.ч. 7 детей, а по  
поводу ХГС - 2041 больной, в т.ч. 14  
детей.

В структуре заболеваемости по-прежнему  
высокий удельный вес составляет  
городское население - 66,3% (в 2013 г.-  
64,7%), сельское - 33,7% (в 2013 г.- 35,3%).

**В настоящее время в республике на диспансерном учете состоит более 8 тыс. «неактивных» носителей HBsAg, которые нуждаются в лабораторном обследовании с целью установления диагноза, но недостаточно эффективно поставлена диагностика ХГВ у этой группы лиц.**

**Отмечается рост числа носителей, нет активного диспансерного наблюдения за ними с целью своевременного выявления больного на ранних стадиях заболевания.**

**Для того, чтобы наблюдать за этим контингентом лиц, необходимо ежегодное их обследование с целью своевременного выявления репликации вируса и признаков циррозования.**

**Об определенных проблемах в организации диагностики ВГВ свидетельствует низкая доля лиц, обследованных на вирусную нагрузку среди «неактивных» носителей HB<sub>s</sub>Ag.**

**Так, из числа «носителей» на вирусную нагрузку обследованы в 2014 году 39 чел. (0,4 % от общего кол-ва, в 2013г - 17 чел. - 0,2%).**

**Таким образом, проведенный анализ по заболеваемости хроническими вирусными гепатитами В и С в Республике Дагестан за 2009-2014гг, показал о неблагоприятной эпидемиологической ситуации и необходимости повышения качества диспансерного наблюдения больных ХГВ и ХГС и носителей HBsAg, полноты лабораторной диагностики для раннего выявления больных хроническими вирусными гепатитами из числа носителей и групп риска.**

**Б  
Л  
А  
Г  
О  
Д  
А  
Р  
Ю**



**З  
А  
В  
Н  
И  
М  
А  
Н  
И  
Е!**